

بررسی پراکنش گروههای عمدۀ فیتوپلانکتونی حوضه جنوبی دریای خزر با تأکید بر کریزووفیتا (دیاتومه‌ها) و پیروفیتا (دوتاژکداران) (۱۳۷۵)

علی گنجیان^(۱) و آسیه مخلوق^(۲)

aganjian2002@yahoo.com

موسسه تحقیقات شیلات ایران

بخش بوم‌شناسی، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری صندوق پستی: ۹۶۱

تاریخ پذیرش: آبان ۱۳۷۹ تاریخ پذیرش: بهمن ۱۳۸۱

خلاصه

طی این تحقیق، در چهار نمونه برداری فصلی در سال ۱۳۷۵ از حوضه جنوبی دریای خزر، از مجموع ۹۳ گونه شناسایی شده از دو شاخه غالب فیتوپلانکتونهای حوضه جنوبی دریای خزر شامل شاخه کریزووفیتا (عدم تا دیاتومه‌ها) Chrysophyta و شاخه پیروفیتا Pyrrrophyta بترتیب ۷۳ و ۲۰ گونه شناسایی گردید. دیاتومه‌ها ضمن آنکه جایگاه اصلی را از نظر تنوع گونه‌ای در دریا دارا می‌باشند در کل حوضه جنوبی دریای خزر و کلیه فصول سال، حداقل تراکم (جمعیت) و زی توده را بخود اختصاص داده‌اند. گونه غالب شاخه کریزووفیتا Rhizosolenia calcaravis و گونه غالب شاخه پیروفیتا Exuviealla cordata بودند که از تراکم و زی توده بیشتری برخوردار بوده‌اند. حداقل تراکم و زی توده فیتوپلانکتون بترتیب مریوط به شاخه کریزووفیتا (بیش از ۷۵ درصد) و شاخه پیروفیتا (نزدیک به ۱۷ درصد) و بقیه شاخه‌ها کمتر از ۱۰ درصد می‌باشد.

لغات کلیدی: پراکنش، فیتوپلانکتون، کریزووفیتا، پیروفیتا، دریای خزر

فیتوپلانکتونهای دریای خزر همانند سایر محیط‌های آبی، اولین حلقة زنجیره غذایی را تشکیل می‌دهند، بنابراین از اهمیت فراوانی بخوردارند. تحقیقات اولیه‌ای که توسط پژوهشگران شوروی سابق انجام گرفته است نشان می‌دهد که دو شاخه کریزوفیتا (عمدتاً دیاتومه‌ها) Chrysophyta و پیروفیتا Pyrrhophyta بیشترین تراکم، زیستوده و ترکیب گونه‌ای را در اغلب فصول سال دارا بوده و در بهره‌دهی دریا و تغذیه بی‌مهرگان آبزی نقش اساسی ایفاء می‌کنند (سلمانوف، ۱۹۸۷؛ قاسم‌اف و باقراف، ۱۹۸۳؛ گنجیان و همکاران، ۱۳۷۷)

مرکز تحقیقات شیلاتی استان مازندران با همکاری مرکز تحقیقات شیلاتی استان گیلان و انسیتو تحقیقات شیلات روسیه (کاسپرینیخ)، در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷ پژوهش‌های تحت عنوان «هیدرولوژی و هیدروبیولوژی حوضه جنوبی دریای خزر» اجرا نموده‌اند که مقاله حاضر به بررسی بخشی از نتایج این پژوهش که به تراکم و زیستوده شاخه‌های مذکور می‌پردازد اشاره می‌نماید.

دیاتومه‌ها در مقایسه با سایر گروهها اولاً از نظر ترکیب گونه‌ای و رشد و نمو جایگاه خاصی را دارا هستند و ثانیاً رشد و نمو آنها تقریباً در کلیه فصول سال ادامه دارد و همچنین تراکم قابل توجهی از آنها در طول سال مشاهده می‌گردد (سلمانوف، ۱۹۸۷؛ گنجیان و همکاران، ۱۳۷۷).

نقش و اهمیت فیتوپلانکتونها در زنجیره غذایی و هرم اکولوژیک اکوسیستمهای منجمله دریای خزر و نبود اطلاعات جامع و کافی از این اکوسیستم خصوصاً حوضه جنوبی دریای خزر ضرورت بررسی و شناسایی ترکیب گونه‌ای، تراکم و زیستوده آنها و همچنین نوسانات فصلی این دو گروه عمده را بصورت مقایسه‌ای ایجاد می‌کند که یکی از اهداف این تحقیق می‌باشد.

مواد و روشها

برای بررسی فیتوپلانکتونهای حوضه جنوبی دریای خزر ۱۸ ترانسکت عمود بر ساحل انتخاب گردید که روی هر ترانسکت در اعمق ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ متری از لایه‌های سطح، ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ متری نمونه برداری گردید (شکل ۱). برای جمع‌آوری فیتوپلانکتونها از روتتر (Rutner

Archive of SID

استفاده شد (Vollenweider, 1974). منطقه به چهار قسمت غرب از (خطوط ۷-۱)، میانی (خطوط ۸-۱۳)، شرق (۱۴-۱۸) و آبهای آزاد با عمق بیش از ۲۰۰ متر (ایستگاههای I, E, F, G, H) مطابق نقشه شکل ۱ تقسیم گردید^(۱).

در این روش ۵۰ سی سی آب از لایه های فوق جمع آوری و با فرمالین چهار درصد تشییت شدند و در ظروف شیشه ای به آزمایشگاه منتقل گردیدند (سلمانوف، ۱۹۸۷ و ۱۹۷۸). نمونه برداری بصورت فصلی در چهار فصل از سال ۱۳۷۵ انجام شد. پس از نمونه برداری، مطالعه کمی و کیفی نمونه ها در آزمایشگاه (مطابق روش کیسیلوف، ۱۹۶۵ برگرفته از: سلمانوف، ۱۹۸۷) صورت گرفت. در این روش نمونه ها به مدت ۱۰ روز در تاریکی نگهداری گردیدند تا کاملاً تهشیش شوند. سپس با سیفون مخصوص، آب رویی را تخلیه و مابقی نمونه در چند مرحله به مدت ۵ دقیقه با ۳۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شد تا حجم آن به ۲۰ تا ۲۵ میلی لیتر رسید. نمونه ها در دو مرحله کیفی و یک مرحله کمی با لامهای خط کشی شده و لامل 24×24 میلی متر بوسیله میکروسکوپ با بزرگنمایی X_{10} و X_{40} شمارش و بررسی شدند (Clesceri *et al.*, 1989 ; Clesceri *et al.*, 1989 ; Newell, 1977

برای شناسایی ترکیب گونه ای فیتوپلانکتونها از کلید شناسایی Prescott, 1962 ; Habit & Pankow, 1976 ; 1971 ; 1976, Ffany & Britton, 1968 و زالبینا و همکاران، ۱۹۵۱ استفاده گردید.

تعداد فیتوپلانکتونهای شمارش شده در ضریب حجمی (نسبت به حجم آب بررسی شده) ضرب می گردد. بدین ترتیب جمعیت فیتوپلانکتون بدست می آید. سپس حجم تقریبی در پلانکتون با توجه به شکل هندسی که داراست از طریق اندازه گیری ابعاد حاصل می گردد. نهایتاً از حاصل ضرب جمعیت و حجم های بدست آمده بیوماس محاسبه می گردد (مالوزوا و ادیانسیتکا، ۱۹۵۴ برگرفته شده از: سلمانوف، ۱۹۸۷). از برنامه های Foxpro 97 و Excel برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.



شکل ۱: موقعیت ایستگاههای نمونه برداری

نتایج

بطورکلی فیتوپلانکتونهای حوضه جنوبی دریای خزر عمدتاً به دو شاخه کریزووفیتا (زرد طلای و دیاتومه‌ها) Chrysophyta و پیروفیتا Pyrrrophyta تعلق داشتند، لذا تنوع گونه‌ای، تراکم (جمعیت) و زیستوده فصلی در این موجودات به صورتی بود که در اغلب فصول سال در نواحی مختلف نسبت به بقیه شاخه‌ها، این دو شاخه از تراکم و زیستوده بیشتری برخوردار بودند (جداول ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵). مجموعاً ۹۳ گونه از این دو شاخه در حوضه جنوبی دریای خزر در بررسی سال ۱۳۷۵ مشاهده شد.

طبق نتایج بدست آمده در بررسی ترانسکت‌ها (نمودارهای ۱، ۲، ۳ و ۴) حداکثر تراکم کل

Archive of SID

فیتوپلانکتون در ترانسکت ۱ به میزان $10^6 \times 23/6$ نمونه در متر مکعب و حداکثر زی توده فیتوپلانکتون کل در ترانسکت ۵ به مقدار $306/6$ میلی گرم در متر مکعب مشاهده شد. حداکثر جمعیت شاخه کریزووفیتا در ترانسکت ۱ با تراکم $10^6 \times 22$ نمونه در متر مکعب و حداکثر زی توده این شاخه در ترانسکت ۵ به مقدار $298/2$ میلی گرم در متر مکعب بود و در نهایت شاخه پیروفیتا دارای حداکثر جمعیت به میزان $10^6 \times 3/79$ نمونه در متر مکعب در ترانسکت ۱۶ و حداکثر زی توده در ترانسکت ۸ به مقدار $12/2$ میلی گرم در متر مکعب بوده است.

چگونگی تغییرات فصلی شاخه کریزووفیتا و پیروفیتا (جداول ۱ و ۲) نشان می دهد که حداکثر کل جمعیت فیتوپلانکتون در فصل زمستان به میزان $10^6 \times 12/2$ نمونه در متر مکعب است در حالیکه حداکثر زی توده در فصل تابستان به مقدار $185/3$ میلی گرم در متر مکعب دیده شده که بیشترین میزان مربوط به شاخه کریزووفیتا بوده است. حداکثر جمعیت شاخه کریزووفیتا (دیاتومه ها) در فصل پائیز $10^6 \times 10/3$ نمونه در متر مکعب بود که بیش از ۹۰ درصد فیتوپلانکتون کل را بخود اختصاص داد. حداکثر زی توده در فصل تابستان به مقدار 178 میلی گرم در متر مکعب بود که بیش از ۹۶ درصد را دارا بوده است. حداکثر جمعیت و زی توده پیروفیتا در فصل بهار $10^6 \times 3/8$ نمونه در متر مکعب بیش از 34 درصد از فیتوپلانکتون کل و $10/8$ میلی گرم در متر مکعب و بیش از ۷ درصد از زی توده کل فیتوپلانکتون را دارا بوده است.

نتایج مطالعه ناحیه ای (نمودارهای ۵ و ۶) بیانگر این است که حداکثر جمعیت و زی توده فیتوپلانکتون کل در ناحیه غربی بوده که مقادیر $10^6 \times 13$ نمونه در متر مکعب و $172/7$ میلی گرم در متر مکعب بوده و به همین ترتیب شاخه کریزووفیتا (دیاتومه ها) نیز حداکثر جمعیت و زی توده را در ناحیه غربی دارا بوده ($10/9 \times 10^6$ نمونه در متر مکعب و 165 میلی گرم در متر مکعب) ولی حداکثر جمعیت و زی توده شاخه پیروفیتا در منطقه میانی به میزان $(2/2 \times 10^6$ نمونه در متر مکعب و زی توده $7/4$ میلی گرم در متر مکعب) مشاهده شده است. در این بررسی حداکثر تراکم و زی توده شاخه کریزووفیتا (دیاتومه ها) در منطقه غرب در فصل زمستان بیش از ۹۳ درصد $10^6 \times 19$ نمونه در متر مکعب و بیشترین زی توده در منطقه شرق در فصل بهار 96 درصد ($33/6$ میلی گرم در متر مکعب) بوده است. شاخه پیروفیتا بیشترین تراکم و زی توده در منطقه میانی در

Archive of SID

فصل بهار با ۴۱ درصد (5×10^6 نمونه در مترمکعب) و ۱۸/۵ درصد (۱۲/۹ میلی‌گرم در مترمکعب) را دارا بوده است (جداول ۱، ۲، ۳ و ۴).

جدول ۱: مقایسه تغییرات فصلی فیتوپلانکتونهای حوضه جنوبی دریای خزر سال ۱۳۷۵

فصل	تراکم در مترمکعب	شاخه	بقیه شاخه‌ها	فیتوپلانکتون	کل
میلی‌گرم در لیتر	کریزووفیتا	پیروفیتا	بیروفیتا	$10/98 \times 10^6$	$0/52 \times 10^6$
بهار	جمعیت	$6/6 \times 10^6$	$3/8 \times 10^6$	$0/52 \times 10^6$	$10/98 \times 10^6$
در صد	جمعیت	$60/5$	$34/7$	$4/7$	$4/7$
تابستان	جمعیت	$2/40 \times 10^6$	$1/42 \times 10^6$	$0/87 \times 10^6$	$4/88 \times 10^6$
در صد	جمعیت	$51/2$	$30/2$	$18/0$	$18/0$
پاییز	جمعیت	$10/3 \times 10^6$	$0/80 \times 10^6$	$0/28 \times 10^6$	$11/4 \times 10^6$
در صد	جمعیت	$90/1$	$7/4$	$2/0$	$2/0$
زمستان	جمعیت	$10/1 \times 10^6$	$1/48 \times 10^6$	$0/50 \times 10^6$	$12/2 \times 10^6$
در صد	جمعیت	$82/2$	$12/2$	$4/6$	$4/6$

جدول ۲: تغییرات فصلی زی توده فیتوپلانکتونهای حوضه جنوبی دریای خزر در فصول مختلف سال ۱۳۷۵

فصل	میلی‌گرم در مترمکعب	شاخه	بقیه شاخه‌ها	فیتوپلانکتون	کل
بهار	زی توده	۱۳۴	$10/8$	پیروفیتا	۱۴۶
در صد	زی توده	$91/8$	$7/4$	$0/8$	$0/8$
تابستان	زی توده	$178/2$	$5/6$	$1/1$	$185/3$
در صد	زی توده	$96/2$	$3/2$	$0/6$	$182/8$
پاییز	زی توده	$176/7$	$4/7$	$1/4$	$182/8$
در صد	زی توده	$96/7$	$2/6$	$0/7$	$182/8$
زمستان	زی توده	$30/7$	$6/1$	$2/6$	$29/4$
در صد	زی توده	$77/9$	$10/0$	$6/8$	$29/4$

Archive of SID

جدول ۳: مقایسه تغییرات فصلی فیتوپلانکتونها در نواحی مختلف حوضه جنوبی دریای خزر سال ۱۳۷۵

فصل	ناحیه نمونه برداری	تعداد در متر مکعب	شاخه کریزوفیتا	شاخه پیروفیتا	شاخه فیتوپلانکتون	بقیه شاخه ها	کل
بهار	غربی	7×10^6	0.52×10^6	2.58×10^6	7.86×10^6	۴/۸	11×10^6
	در صد					۲۳/۵	
	میانی	6×10^6	5×10^6			۷۱/۷	12×10^6
	در صد					۴۱	$5/5$
تابستان	شرقی	6×10^6	4×10^6	6×10^6		۴۲/۷	10×10^6
	در صد					۰۳/۶	$3/7$
	غربی	3×10^6	2×10^6	3×10^6		۳۹/۴	6×10^6
	در صد					۶۰/۴	$0/2$
پاییز	میانی	1×10^6	0.01×10^6	1×10^6		۰۴/۱	2×10^6
	در صد					۴۰/۳	$0/8$
	شرقی	3×10^6	1×10^6	0.05×10^6		۱۰/۲	$32/9$
	در صد					۰۶/۹	
زمستان	غربی	12×10^6	$0/4 \times 10^6$	$0/2 \times 10^6$		۳/۵	$1/3$
	در صد					۹۵/۶	
	میانی	10×10^6	$0/7 \times 10^6$	$0/005 \times 10^6$		۶/۸	$0/0$
	در صد					۹۲/۷	
	شرقی	7×10^6	2×10^6	$0/7 \times 10^6$		۱۶/۷	$7/4$
	در صد					۷۰/۹	
	غربی	19×10^6	$0/8 \times 10^6$	$0/6 \times 10^6$		۳/۹	$2/8$
	در صد					۹۳/۳	
	میانی	3×10^6	2×10^6	$0/3 \times 10^6$		۳۷/۹	$5/7$
	در صد					۰۶/۴	
	شرقی	6×10^6	2×10^6	$0/8 \times 10^6$		۲۰/۳	$9/7$
	در صد					۷۰	


Archive of SID جدول ۴: مقایسه تغییرات فصلی فیتوپلانکتونها در نواحی مختلف حوضه جنوبی دریای خزر سال ۱۳۷۵

فصل	ناحیه نمونه برداری	تعداد در متر مکعب	شاخه کریزوفیتا	شاخه پیروفیتا	شاخه پیروفیتا	شاخه کل	بقیه شاخه ها	فیتوپلانکتون
بهار	غربی	زی توده	۶۸/۵	۸/۵	۱/۳	۷۸/۳	۷۸/۳	فیتوپلانکتون
	در صد	۸۷/۵	۱۰/۸	۱/۷	۷/۷			
تابستان	میانی	زی توده	۵۵/۸	۱۲/۹	۰/۹	۶۹/۶	۶۹/۶	فیتوپلانکتون
	در صد	۸۰/۲	۱۸/۵	۱/۳	۷/۷			
شرقی	زی توده	۳۱۹/۷	۱۱/۶	۱/۲	۷/۷	۲۳۲/۶	۲۳۲/۶	فیتوپلانکتون
	در صد	۹۶	۳/۰	۰/۴	۷/۷			
پاییز	غربی	۲۹۵/۲	۹/۵	۱/۹	۷/۷	۳۰۶/۶	۳۰۶/۶	فیتوپلانکتون
	در صد	۹۶/۳	۳/۱	۰/۶	۷/۷			
زمستان	میانی	زی توده	۶۱/۶	۵/۲	۰/۲	۶۷	۶۷	فیتوپلانکتون
	در صد	۹۱/۹	۷/۸	۰/۳	۷/۷			
شرقی	زی توده	۱۰۴/۴	۲	۱/۲	۷/۷	۱۵۷/۶	۱۵۷/۶	فیتوپلانکتون
	در صد	۹۸	۱/۲	۰/۷	۷/۷			
پاییز	غربی	۲۵۳/۲	۳/۷	۱/۹	۷/۷	۲۵۸/۸	۲۵۸/۸	فیتوپلانکتون
	در صد	۹۷/۸	۱/۵	۰/۷	۷/۷			
زمستان	میانی	زی توده	۱۷۶/۲	۴/۲	۰/۳	۱۸۰/۷	۱۸۰/۷	فیتوپلانکتون
	در صد	۹۷/۰	۲/۳	۰/۲	۷/۷			
شرقی	زی توده	۷۰/۲	۶/۸	۲/۱	۷/۷	۷۹/۱	۷۹/۱	فیتوپلانکتون
	در صد	۸۸/۷	۸/۸	۲/۷	۷/۷			
زمستان	غربی	۴۳/۶	۳/۸	۰/۲	۷/۷	۴۷/۶	۴۷/۶	فیتوپلانکتون
	در صد	۹۱/۶	۸	۰/۴	۷/۷			
شرقی	میانی	زی توده	۲۰/۰	۷/۴	۰/۴	۲۸/۲	۲۸/۲	فیتوپلانکتون
	در صد	۷۲/۴	۲۶/۲	۱/۴	۷/۷			
شرقی	زی توده	۲۰/۴	۷/۷	۸/۸	۸/۸	۴۱/۷	۴۱/۷	فیتوپلانکتون
	در صد	۹۰/۹	۱۸/۰	۲۰/۹	۲۰/۹			


Archive of SID

جدول ۵: تعداد گونه‌های موجود فیتوپلانکتونها در فصول مختلف سال حوضه جنوبی دریای خزر سال ۱۳۷۵


فصل	ناحیه نمونه برداری	شاخص کریزووفینا	شاخص پیروفینا	بقیه شاخه ها
		۲۵	۱۱	۱۷
		۲۳	۱۵	۱۱
		۱۹	۱۴	۷
		۲۳	۱۴	۱۴
		۱۶	۱۱	۱۱
		۱۸	۱۱	۱۱
		۲۶	۹	۱۱
		۳۱	۱۱	۱۱
		۲۰	۱۱	۱۱
		۲۰	۸	۱۱
		۲۴	۱۲	۱۱
		۱۹	۱۳	۱۱




نمودار ۱: جمعیت شاخه‌های مختلف و فیتوپلانکتون کل حوضه جنوبی دریای خزر (سال ۱۳۷۵)



نمودار ۲: زی توده شاخه های مختلف و فیتوپلانکتون کل حوضه جنوبی دریای خزر (سال ۱۳۷۵)



نمودار ۳: مقایسه جمعیت فیتوپلانکتون کل و شاخه های عمدۀ آن در حوضه جنوبی دریای خزر (سال ۱۳۷۵)



نمودار ۴: مقایسه زی توده فیتوپلانکتون کل و شاخه های عمدۀ آن در حوضه جنوبی دریای خزر (سال ۱۳۷۵)

بحث

از مجموع ۹۳ گونه شناسایی شده از دو شاخه غالب فیتوپلانکتونهای حوضه جنوبی دریای خزر شاخه کریزوفیتا (عمدتاً گروه دیاتومه‌ها) Chrysophyta و شاخه پیروفیتا Pyrrophyta بترتیب ۷۳ و ۲۰ گونه را شامل شدند که این مطلب نشان دهنده برتری تنوع گونه‌ای در شاخه کریزوفیتا (دیاتومه‌ها) نسبت به شاخه پیروفیتا می‌باشد (سلمانوف، ۱۹۸۷، گنجیان و همکاران، ۱۳۷۷). دیاتومه‌ها ضمن آنکه جایگاه اصلی را از نظر تنوع گونه‌ای در دریا دارا می‌باشند، در کل سطح دریا در تمام طول سال حداکثر تراکم و زی توده را دارا بوده‌اند و از میان گونه‌های متنوع مشاهده شده فیتوپلانکتونهای حوضه جنوبی دریای خزر، گونه‌های متمایزی که انتشار وسیعی داشته و نیز زی توده و تراکم زیادی را دارا هستند باید به گونه شاخص *Rhizosolenia calcaravis* از شاخه کریزوفیتا

Archive of SID

(دیاتومه‌ها) و گونه *Exuviealla cordata* از شاخه پیروفیتا اشاره نمود (سلمانوف، ۱۹۸۷؛

گنجیان و همکاران، ۱۳۷۷؛ مائی سیووفیلا تواو، ۱۹۸۵).

دیاتومه‌ها در تمام طول سال مشاهده شده‌اند و ماکریزم تراکم آنها در فصل پائیز و زمستان بوده است ولی بیشترین زی‌توده آنها در فصل تابستان مشاهده شده و این به دلیل حضور گونه‌های با اندازه بزرگتر از جمله گونه *Rhizosolenia calcoravis* در فصل تابستان بوده است که وزن و اندازه آن نسبت به گونه‌های دیگر بیشتر است. افزایش جمعیت و زی‌توده این شاخه در منطقه غربی بیش از مناطق میانی و شرقی بوده است و به نظر می‌رسد شرایط و فاکتورهای زیستی مناسبی جهت رشد و شکوفایی این شاخه در منطقه غربی ایجاد شده است.

شاخه پیروفیتا از نظر جمعیت و زی‌توده در فصل بهار به حداقل رسیده که به دلیل رشد و شکوفایی گونه *Exuviealla cordata* می‌باشد. بیشترین جمعیت و زی‌توده پیروفیتا برخلاف شاخه کریزوفیتا (دیاتومه‌ها) در منطقه میانی بوده است و به نظر می‌رسد که منطقه فوق شرایط لازم برای رشد و نمو این شاخه را دارا بوده است. از مجموع اطلاعات بدست آمده می‌توان نتیجه گرفت که حداقل تراکم و زی‌توده فیتوپلانکتون کل چه از نظر پراکنش و چه در بررسی ترانسکت‌ها، فصلی و ناحیه‌ای در درجه اول مربوط به حضور شاخه کریزوفیتا (دیاتومه‌ها) با بیش از ۷۵ درصد و در درجه دوم مربوط به شاخه پیروفیتا نزدیک به ۱۷ درصد می‌باشد.

تشکر و قدردانی

از مسئول محترم گروه پلانکتون آفای مهندس ابوالقاسم روحی و همکار محترم آفای مهندس ابوالفضل مهدوی و همچنین از همکاران بخش بوم‌شناسی مراکز مازندران و گیلان که در این امر سهم بسزایی داشته‌اند و از خانم احترام‌السادات علوی جهت نوشتار رایانه‌ای کمال سپاسگزاری و تشکر را داریم.

پیروشکینا، آ.ای؛ لاورینکو، آ.ای و ماکارووا، ۱۹۶۸. جلبکهای پلانکتونی لینینگراد. ۲۹۰ صفحه.
زابلینا، ام. ام.؛ کیلف، آ.آ. پیروشکینا، آ.ای؛ لاورینکو، و شیشوکوما، اس.، ۱۹۵۱. جلبکهای
دیاتومهای، مسکو انتشارات دولتی علوم شوروی. چاپ چهارم. ۶۵۰ صفحه.

سلمانوف، ام. آ.، ۱۹۸۷. نقش میکروفلورها و فیتوپلانکتونها در پروسه‌های تولیدی دریای خزر. ترجمه: ابوالقاسم شریعتی، مرکز علوم و صنایع شیلاتی میرزا کوچک خان، رشت.
۳۴۹ صفحه.

قاسم اف، ع.ح. و باقراف، ر.م.، ۱۹۸۳. بیولوژی کنونی دریای خزر. ترجمه: فتح‌الهی پور، مرکز تحقیقات شیلات استان گیلان. ۱۸۴ صفحه.

گنجیان، ع.؛ حسینی، س.ع.؛ خسروی، م. و کیهان ثانی، ع.، ۱۳۷۷. بررسی تراکم و پراکنش گروههای عمدۀ فیتوپلانکتونهای حوضه جنوبی دریای خزر. مرکز تحقیقات شیلاتی استان مازندران. مجله علمی شیلات ایران، شماره ۲، سال هفتم، تابستان ۱۳۷۷
صفحات: ۹۵ تا ۱۰۷.

مائی سیووفیلاتووا، ۱۹۸۵. جانوران و تولیدات زیستی دریای خزر. ترجمه: ابوالقاسم شریعتی، مؤسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران. ۴۰۵ صفحه.

Clesceri, L.S. ; Greenberg, A.E. and Trussell, R.R. , 1989. Standard method. American Public Health Association, Washington, U.S.A. 1444 P.

Ffany, H. and Britton, L.E. , 1971. The Algae of Illinois, New York, USA. 150 P.

Habit, R.N. and Pankow, H. , 1976. Algeno Floraderostsee Vebgusta Fischers Verlagjena 493 P.

Newell, G.E. , 1977. Marine plankton. Hutchinson Co. London, 320 P.

Prescott, G.W. , 1962. Algae of the western Great Lakes area. Michigan, U.S.A. 333 P.

Archive of SID

Sorina, A. , 1978. Phytoplankton Manual. Unesco, Paris, 140 P.

Vollenweider, A.R. , 1974. A manual on methods for measuring primary production in aquatic environmental. Blackwell Scientific Publication. Oxford, London, UK. 423 P.