

بررسی ذخایر ماهیان خاویاری در حوضه جنوبی دریای خزر (آبهای ایران)

محمود توکلی^{(۱)*}؛ فرهاد کیمرام^(۲)؛ محمد رضا بهروز خوشقلب^(۳) و حسین پرندآور^(۴)

M_tavakoli_e@yahoo.com

۱ و ۳ و ۴ - انسستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت صندوق پستی: ۴۱۶۲۵-۳۴۶۴

۲ - موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۱۶

تاریخ پذیرش: اسفند ۱۳۸۵

تاریخ دریافت: اسفند ۱۳۸۴

چکیده

به منظور بررسی ذخایر ماهیان خاویاری با هدف برآورد فراوانی نسبی و تعیین ترکیب گونه‌ای، دو گشت تحقیقاتی در تابستان و زمستان سال ۱۳۸۳ توسط شناور سی سرا ۲ و کشتی گیلان در سواحل جنوبی دریای خزر (آبهای ایران) انجام شد. با توجه به وسعت منطقه، تعداد ۸۵ ایستگاه تراکمی در نظر گرفته شد. تعیین ایستگاهها براساس طرح طبقه‌بندی تصادفی بود و تعداد ایستگاههای هر اشکوب با در نظر گرفتن مساحت هر اشکوب از سطح کل، تعیین گردید. جهت نمونه‌برداری از دو نوع تراکم ۹ متری برای اعمق زیر ۱۰ متر و ۴۴/۷ متری برای اعمق بالای ۱۰ متر استفاده شد. در نمونه‌برداری تابستان، ۱۷۰ عدد ماهی شامل ۱۴۲ عدد تاسماهی ایرانی، ۱۹ عدد ازوون برون، ۴ عدد فیلماهی، ۳ عدد شیپ و ۲ عدد تاسماهی روسی صید شدند. در نمونه‌برداری زمستان، ۱۱۸ عدد ماهی شامل ۷۵ عدد تاسماهی ایرانی، ۴۱ عدد ازوون برون، ۱ عدد شیپ و ۱ عدد تاسماهی روسی صید گردید.

میزان صید در واحد تلاش ماهیان خاویاری در نمونه‌برداری تابستان معادل ۲ عدد در تراکم که تاسماهی ایرانی با ۱/۶۷ عدد، بیشترین مقدار را دارا بود. صید در واحد تلاش سایر گونه‌ها بترتیب، ازوون برون ۰/۲۲، عدد، فیلماهی ۰/۰۵، عدد و شیپ نیز ۰/۰۴ عدد در هر تراکم بود. در نمونه‌برداری زمستان صید در واحد تلاش معادل ۱/۳۸ عدد در تراکم بود که صید در واحد تلاش تاسماهی ایرانی ۰/۸۸، ازوون برون ۰/۴۸، تاسماهی روسی ۰/۰۱ و شیپ ۰/۰۱ عدد در هر تراکم بود.

لغات کلیدی: ماهیان خاویاری، ارزیابی ذخایر، دریای خزر، ایران

* نویسنده مسئول

مقدمه

لغایت ۱۱/۲۸ آگوست ۱۹۸۳) انجام گردید. برای انجام نمونهبرداری از شناور سی سرا ۲ با قدرت ۲۵۰ hp برای اعمق کمتر از ۱۰ متر با تراال ۹ متری و کشتی گیلان با قدرت ۱۰۰۰ hp برای اعمق بالای ۱۰ متر با تراال ۲۴/۷ متری استفاده شد.

تراال کشی در طول روز انجام شد. مدت تراال کشی ۳۰ دقیقه و سرعت تراال کشی ۲/۵ گره دریابی بود. موقعیت جغرافیابی، عمق، زمان تراال کشی، مسافت طی شده، طول کل، طول چنگالی، وزن، جنسیت و مراحل رسیدگی جنسی ماهیان ضید شده به تفکیک گونه (Bagenal, 1987) ثبت گردید (دقت اندازه‌گیری طول ۱ سانتی‌متر و دقت توزین ۱ گرم بود).

فراوانی نسبی ماهیان خاویاری به تفکیک گونه از طریق ارائه میزان صید در واحد تلاش (CPUE) بررسی و واحد تلاش نیم ساعت تراال کشی در نظر گرفته شد (Sparre et al., 1989).

میزان کل وزن توده زنده ماهیان خاویاری براساس سند پژوهه ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر، مصوب کمیسیون منابع زنده دریای خزر به روش مساحت جاروب شده (تراال کف) محاسبه شد، ولی به لحاظ عدم اطمینان و دقت کم محاسبه میزان صیدپذیری گونه‌های ماهیان خاویاری (۰/۱۰-۰/۱۱) تور تراال ۲۴/۷ متری و ۰/۰۷، ۰/۰۴ و ۰/۱ برای تور تراال ۹ متری برتری برای گونه‌های ازوونبرون، فیلماهی و تاسماهی)، مستندات مربوطه در قسمت بحث مورد تجزیه و تحلیل فرار گرفت (Kaymaram, 2003).

محاسبه مساحت جاروب شده توسط فرمول زیر صورت گرفت:

$$a = D * h * X_2$$

که در آن:

a = مساحت جاروب شده

D = مسافت طی شده

h = طول طناب فوچانی

X_2 = ضریب باز شوندگی تراال (برای تراال ۹ متری ۰/۶۴۴ و برای تراال ۲۴/۷ متری ۰/۰۸۸) در نظر گرفته شد.

محاسبه میزان صید در واحد سطح برای یک تراال نیز طبق فرمول زیر انجام شد:

$$(cw/t)/(a/t) = cw/a$$

که در آن:

cw = وزن صید در یک تراال کشی

a = مساحت جاروب شده در یک تراال کشی

t = زمان تور کشی به ساعت

ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری و بدست آوردن آمار و اطلاعات صحیح از میزان ذخایر هر گونه و پراکنش آنها در زمانها و مکانهای مختلف می‌تواند مدیریت شیلاتی را در جهت ارائه روشهای برداشت اصولی از این ماهیان و جلوگیری از انقراض نسل ماهیان خاویاری رهنمون سازد. بنایه ضرورت انجام مطالعات تحقیقاتی و براساس مصوبات کمیسیون منابع زنده دریای خزر و همچنین تاکید CITES، مقرر گردید تمامی کشورهای حاشیه دریای خزر در گشت ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری شرکت نمایند. با توجه به این مصوبه طی نشست مشترک کارشناسان موسسه تحقیقات شیلات ایران و کاسپینیخ روسیه پروپوزال طرح تهیه و با توجه به تجارت کاسپینیخ در زمینه ارزیابی ذخایر با تراال در دریای خزر، مقرر شد از همان روش استفاده شود. بدنبال این توافقات موسسه تحقیقات شیلات ایران از سال ۱۳۸۰ بصورت فعال گشتهای ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر را با همکاری و مشارکت تمام کشورهای حاشیه دریای خزر به مرحله اجرا در آورد (مقیم و ولی نسب، ۱۳۸۰؛ مقیم و بهروز خوشقلب، ۱۳۸۱؛ توکلی اشکلک و مقیم، ۱۳۸۲؛ توکلی اشکلک، ۱۳۸۳؛ بهروز خوشقلب، ۱۳۸۳). در همین راستا در سال ۱۳۸۳ طی دو فصل تابستان و زمستان نسبت به اجرای گشت ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری اقدام شد. اهداف این طرح شامل تعیین ترکیب گونه‌ای، فراوانی نسبی، پراکنش، برآورد ذخایر و فراوانی مطلق گونه‌های مختلف ماهیان خاویاری بود.

مواد و روش کار

سواحل جنوبی دریای خزر (از آستارا تا ترکمن) در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. منطقه مورد بررسی شامل اعمق ۲ تا ۱۰۰ متر دارای سه اشکوب ۲ تا ۱۰، ۱۰ تا ۵۰ و ۵۰ تا ۱۰۰ متر بود. تعیین ایستگاه‌ها براساس طرح طبقه‌بندی تصادفی بوده و تعداد ایستگاه‌های هر اشکوب با در نظر گرفتن مساحت هر اشکوب از سطح کل، تعیین گردید. ایستگاه برای تراال کشی تعیین شد که ۳۴ ایستگاه در اعمق زیر ۱۰ متر و ۵۱ ایستگاه در اعمق بالای ۱۰ متر بودند. این بررسی طی دو فصل تابستان (۸۳/۴/۲۵-۸۳/۴/۲۵) و فصل زمستان (۸۳/۱۱/۳) انجام شد.

از نظر ترکیب گونه‌ای، گونه تاسماهی ایرانی بالاترین درصد صید را نسبت به سایر گونه‌ها در دو نمونه‌برداری تابستان ۱۳۸۳/۵۳ (درصد) و زمستان (۶۳/۵۶ درصد) دارا بود (جدول ۲). صید در واحد تلاش (CPUE) ماهیان خاویاری صید شده با تور تراول در نمونه‌برداری تابستان ۱۳۸۳ معادل ۲ عدد در تراول بود که گونه تاسماهی ایرانی با ۱/۶۷ عدد در تراول بیشترین مقدار را دارا بود. صید در واحد تلاش سایر گونه‌ها برتری، ازون برون ۰/۲۲، فیلماهی ۰/۰۵ و شبیب نیز ۰/۰۴ عدد در تراول بود. در نمونه‌برداری زمستان صید در واحد تلاش معادل ۱/۳۸ عدد در تراول بود. صید در واحد تلاش گونه تاسماهی ایرانی ۰/۸۸، ازون برون ۰/۴۸، تاسماهی روسی ۰/۰۱ و شبیب ۰/۰۱ عدد در تراول بود (جدول ۳). میانگین طول کل و وزن گونه‌های مختلف ماهیان خاویاری در نمونه‌برداری تابستان و زمستان ۱۳۸۳ در جدول ۴ آورده شده است.

فراوانی مطلق برآورد شده در نمونه‌برداری تابستان سال ۱۳۸۳ معادل ۹۵۶۵ هزار عدد شامل ۷۷۰۵ هزار عدد تاسماهی ایرانی، ۱۲۸۶ هزار عدد ازون برون، ۲۹۷ هزار عدد فیلماهی، ۱۷۶ هزار عدد شبیب و ۱۰۱ هزار عدد تاسماهی روسی بود. در نمونه‌برداری زمستان سال ۱۳۸۳ فراوانی کل در حدود ۷۲۷۵ هزار عدد تخمین زده شد. از این تعداد، ۴۶۹۳ هزار عدد تاسماهی ایرانی، ۲۴۵۵ هزار عدد ازون برون، ۶۷ هزار عدد تاسماهی روسی و ۶۰ هزار عدد شبیب بود. در جدول ۵ فراوانی و وزن توده زنده ماهیان خاویاری در آبهای ایران طی دو گشت تابستان و زمستان سال ۱۳۸۳ آورده شده است.

برای محاسبه وزن توده زنده در واحد سطح از فرمول $b = (cw/a)x_1$ استفاده شد که در آن:

b = وزن توده زنده در واحد سطح
 x_1 = ضریب صید (برای تراول ۹ متری فیلماهی ۰/۰۴، تاسماهی ۰/۱ و ازون برون ۰/۰۷ و برای تراول ۲۴/۷ متر برای کلیه گونه‌ها ۰/۱ در نظر گرفته شد).

cw/a = میانگین صید در واحد سطح وزن توده زنده کل منطقه مورد بررسی با فرمول زیر محاسبه گردید:

$B = ((cw/a)*A)/x_1$

B = وزن توده زنده کل منطقه مورد بررسی
 A = کل سطح مورد بررسی (کل سطح آبهای ایران از عمق ۰ تا ۱۰۰ متر، ۱۴۶۷۱ کیلومترمربع محاسبه شده است). برای انجام محاسبات فراوانی و زیست‌سنگی ماهیان و تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS و EXCEL استفاده شد.

نتایج

در گشت تابستان ۱۷۰ عدد ماهی شامل ۱۴۲ عدد تاسماهی ایرانی، ۱۹ عدد ازون برون، ۴ عدد فیلماهی، ۳ عدد شبیب و ۲ عدد تاسماهی روسی صید شد. در گشت زمستان تعداد ماهی صید شده گاهش یافته و ۱۱۸ عدد ماهی صید شد که شامل ۷۵ عدد تاسماهی ایرانی، ۴۱ عدد ازون برون، ۱ عدد شبیب و ۱ عدد تاسماهی روسی بود (جدول ۱).

جدول ۱: فراوانی ماهیان خاویاری صید شده با تور تراول به تفکیک گونه در سال ۱۳۸۳

فصل	فیلماهی	TASMAHİ RUSİ	TASMAHİ İRANİ	ŞİBİP	AZON BİRON	JUM
تابستان	۴	۲	۱۴۲	۳	۱۹	۱۷۰
زمستان	-	۱	۷۵	۱	۴۱	۱۱۸

جدول ۲: ترکیب گونه‌ای (درصد) ماهیان خاویاری صید شده با تور تراول (سال ۱۳۸۳)

فصل	فیلماهی	TASMAHİ RUSİ	TASMAHİ İRANİ	ŞİBİP	AZON BİRON
تابستان	۲/۳۵	۱/۱۸	۸۳/۵۳	۱/۷۶	۱۱/۱۸
زمستان	-	۰/۸۵	۶۳/۵۶	۰/۸۵	۲۴/۷۴

جدول ۳: صید در واحد تلاش (CPUE) ماهیان خاویاری در آبهای ایرانی دریای خزر (تعداد در هر تراو) (سال ۱۳۸۳)

فصل	فيلماхи	تاسماهي روسى	تاسماхи ايراني	شيب	ازون برون	جمع
تابستان	۰/۰۵	۰/۰۲	۱/۶۷	۰/۰۴	۰/۲۲	۲
زمستان	-	۰/۰۱	۰/۸۸	۰/۰۱	۰/۴۸	۱/۳۸

جدول ۴: ميانگين طول و وزن ماهیان خاویاری صید شده توسط تراو (سال ۱۳۸۳)

فصل	گونه	تاسماهي ايراني	تاسماهي روسى	شيب	فيلماهي
تابستان	طول کل (سانتيمتر)	۳۸/۲	۳۶/۸	۳۳/۴	۲۶/۹
وزن (گرم)	۴۱۰۰	۷۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۰۰۰
زمستان	طول کل (سانتيمتر)	۳۶/۹	۶۱/۲	۳۱/۳	۱۰۴
وزن (گرم)	۳۹۵/۹	۱۱۴۶/۲	۹۲	۵۶۰۰	----

جدول ۵: فراوانی و وزن توده زنده ماهیان خاویاری در آبهای ایرانی دریای خزر (سال ۱۳۸۳)

فصل	گونه	تاسماهي ايراني	تاسماهي روسى	شيب	جمع	فيليماهي
تابستان	فراوانی کل (هزار عدد)	۷۷۰۵	۱۲۸۶	۱۷۶	۱۰۱	۹۵۶۵
وزن توده زنده کل (تن)	۴۳۱۶	۱۰۳۶	۵۸۲۴	۲۳	۱۴	۱۱۲۱۳
فرافانی کل (هزار عدد)	۴۶۹۳	۲۴۵۵	-	۶۰	۶۷	۷۲۷۵
وزن توده زنده کل (تن)	۱۷۸۶	۲۸۱۵	-	۳۳۵	۶	۴۹۴۲

بحث

Gunderson (1993) روشاهای مختلف ارزیابی ذخایر و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد. Sinclair و همکاران (1991) دریافتند که بررسیهای انجام شده در خصوص فراوانی دارای ضرب واریانس بالغ بر ۳۰ درصد می‌باشد و دلایل زیادی جهت فقدان دقیق و صحت وجود دارد. بنابراین تعیین وضعیت اولیه ذخایر که اقدامات مدیریتی براساس آن صورت گیرد، گاری دشوار است (Laevastu *et al.*, 1988; Laevastu & Favorite, 1988; *et al.*, 1996).

در خصوص ارزیابی ذخایر به روشن تراو کف بعنوان یک شیوه نمونه‌برداری مشکلات زیر وجود دارد:

- پراکنش جمعیتهای تاسماهیان در دریای خزر با توجه به فصل و منطقه و عوامل مختلف زیستمحیطی متغیر بوده، مثلاً در ناحیه جنوبی خزر بچه ماهیان ازون برون و فيلماهی از آبهای عمیق‌تر برای

مقایسه نتایج حاصل از نمونه‌برداری تابستان و زمستان سال ۱۳۸۳ نشان داد که ترکیب گونه‌ای ماهیان خاویاری در صید تراو در فصول مختلف متغیر بوده است. بطوریکه ترتیب گونه تاسماهی ایرانی در فصل زمستان ۱۳۸۳ با ۶۳/۵۶ درصد نسبت به فصل تابستان ۱۳۸۳ (۸۳/۵۳ درصد) کاهش یافته است. در گونه ازون برون، درصد صید در فصل زمستان ۱۳۸۳ با ۳۴/۷۴ درصد نسبت به تابستان ۱۳۸۳ با ۱۱/۱۸ درصد، افزایش نشان می‌دهد که این تغییرات ناشی از تکثیر مصنوعی و رهاسازی بیشتر تاسماهی ایرانی نسبت به سایر گونه‌ها، چرخه مهاجرت و تاثیر درجه حرارت آب بر حضور این ماهی در اعماق مختلف بوده است. در گونه‌های شیپ، فيلماهی و تاسماهی روسی با توجه به صید اندک، نوسانات در فصول مختلف متفاوت بوده است.

امکان تجزیه و تحلیل و مقایسه روند تغییرات جمعیتی گونه‌های مختلف با توجه به سابقه کم مطالعات فراوانی و پراکنش و چرخه مهاجرت ماهیان خاویاری بوسیله تور ترال در فصول مختلف در آبهای ایران را محدود می‌نماید، مطمئنًا عوامل محدود کننده‌ای در ارزیابی ذخایر با ترال دخیل هستند از جمله عمق آب، تجهیزات مورد استفاده در بررسی تحقیقاتی از قبیل، نوع تور، شناور و غیره.

تغییرات فراوانی صید ماهیان خاویاری در فصول مختلف ناشی تغییرات شرایط زیستی مانند تغذیه، مهاجرت، درجه حرارت آب همچنین رهاسازی و پراکنش بچه ماهیان خاویاری حاصل از تکثیر مصنوعی می‌باشد بطوريکه در فصل بهار بعلت مهاجرت‌های تولید مثلی میزان فراوانی نسبت به سایر فصول متغیر است. همچنین در فصول تابستان و پاییز بعلت تکثیر و تولید میلیونها عدد بچه تاسماهی ایرانی (تکثیر شده در فصل بهار) و استقرار آنها در اعمق کمتر از ۱۰۰ متر جهت تغذیه در نواحی ساحلی باعث افزایش تعداد ماهیان خاویاری بخصوص ماهیان جوان می‌شود در حالیکه در فصل زمستان بعلت کاهش شدید درجه حرارت، مهاجرت ماهیان به اعمق زیادتر، شاهد بالا بودن تعداد ماهیان جوان نسبت به بالغین را می‌توان ناشی از بالا بودن درجه حرارت آب دانست که باعث مهاجرت ماهیان بالغ به اعمق میانی دریا می‌شود. از طرف دیگر کاهش درجه حرارت در فصل زمستان نسبت به سایر فصول، باعث کاهش منابع غذایی کفزی و کاهش ذخیره فیتوپلاتکتونی (کاهش ساعت نوری) می‌گردد. با کاهش فیتوپلاتکتونها، شگ ماهیانی که از آنها تغذیه می‌کنند نیز کاهش می‌یابند. در نتیجه غذای ماهیان خاویاری با کاهش روپرتو می‌گردد که این موضوع باعث کاهش فراوانی ماهیان خاویاری بخصوص تاسماهی ایرانی در آبهای ساحلی ایران می‌شود. با توجه به مطالب فوق، در هر فصل نتایج ترال در برآورده فراواتی ماهیان بالغ با فصل دیگر متفاوت بوده و قابل مقایسه با دیگر فصول نمی‌باشد ولی چیزی که مسلم است در تمامی گشتهای میزان فراواتی تاسماهی ایرانی نسبت به سایر گونه‌ها بسیار بالا بوده که نشانگر تلاش ایران در تکثیر و بازسازی ذخایر این گونه می‌باشد.

یکی دیگر از عوامل مهم در کاهش صید با ترال فعالیت تعداد ۱۴۸ تعاونی پره صیادی می‌باشد که فعالیت آنها از بیست مهر ماه هر سال شروع و تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد ادامه می‌یابد.

تغذیه استفاده می‌کنند که بخصوص در فصل زمستان مشهود است. تاسماهی روس بالغ جهت تغذیه به عمق‌های مختلف بین ۸ تا ۹۰ متر می‌رود (Khodorevskaya & Krasikov, 1999).

- ازونبرون به اعماق میانی مهاجرت نموده و زمانی که طول آن به ۲۰ سانتیمتر رسید ممکن است از موجودات نکتوپنتیک، بنتوپلازیک و ماهیان کفزی خوار برای تغذیه استفاده نماید. فیلماهیان جوان که به قسمت شمالی خزر مهاجرت می‌کنند زمانی که طول آنها ۱۰ سانتیمتر است به آبهای نزدیگ به کف مهاجرت نمی‌کنند و زمانی که طول آنها به ۴۰ سانتیمتر برسد از ماهیان پلازیک از جمله کینتا و گل آذین ماهیان تغذیه می‌کنند (Polyaninova, 1983; Khodorevskaya & Krasikov, 1999).

- ضرب صید بدیری ماهی با توجه به واکنش‌های آن نسبت به ابزار صید متفاوت است. این امر در بعضی گونه‌ها بستگی به عمق و فصل و در بعضی دیگر بستگی به الگوهای پراکنش عمودی (ساختر ستون آب) دارد. قرار گرفتن یک گونه در معرض ابزار صید بستگی به اندازه و اثرات تغییر سن در ویژگیهای رفتاری آن دارد.

- ویژگیهای عملکرد در ماهیان بزرگتر با ماهیان کوچک تفاوت دارد

- - تفاوت‌های فصلی در رفتار مهاجرت در اغلب گونه‌های تاسماهیان از قبیل ازونبرون وجود دارد که در نتیجه آن قابلیت صید ماهی با تور ترال در فصول مختلف، تغییر خواهد کرد. متأسفانه سری‌های زمانی این قبیل اطلاعات قرآنی ماهیان خاویاری دریای خزر وجود ندارد.

- استفاده از روش ترال برای بررسی‌های آزمایشی در نواحی که ماهیگیری توسعه گستری داشته و نمونه‌گیری از صیدها ناقص می‌باشد، استفاده می‌شود و در نواحی که بطور وسیعی مورد بهره‌برداری قرار گرفته، با استفاده از بررسی‌های تور ترال می‌توان به‌آکتدگی گونه‌های خارج از صیدگاه اصلی را مطالعه نمود ولی از نظر کمی شباهات زیادی داشته و نمی‌توان آنرا ارزیابی مطلق ذخایر بهداشت آورده. در مناطقی که صید انجام می‌شود، بررسی‌های تور ترال می‌تواند انواحی از اطلاعات کمکی لازم برای ارزیابی پراکندگی و فراواتی ذخایر را فراهم سازد (Sparre et al., 1989).

- نوع شناور و قدرت آن در نتیجه کار تاثیرگذار می‌باشد.

- قدرت صید ترال‌های مشابه از شناوری به شناور دیگر متفاوت می‌باشد حتی طول طنابهای اتصال به کشته در اعمال مختلف صید می‌تواند در میزان صید موثر باشد.

شده سال ۱۳۸۲ و ماهیان دو و سه ساله می‌باشند، ممکن است مبین عدم توانایی ابزار و امکانات صید در خصوص صید ماهیان بالغ باشد. لذا کلیه عوامل ذکر شده باعث می‌شود تا نتوان تخمین درستی از ذخایر ماهیان خاویاری ارائه نمود و لازم است با ایجاد امکانات، شرایط و روش‌های مناسب، نسبت به بررسی فراوانی و وزن توده زنده ارائه نمود.

تشکر و قدردانی

این تحقیق با حمایت مالی و علمی موسسه تحقیقات شیلات ایران و انتستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان انجام شد. صمیمانه از کلیه همکاران در موسسه تحقیقات شیلات ایران، انتستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و سازمان شیلات ایران بدليل همکاری در اجرای عملی این طرح تقدیر و تشکر می‌نماییم.

منابع

- بهروز خوشقلب، م. ، ۱۳۸۳. گزارش سفر به کشور روسیه جهت شرکت در گشت تحقیقاتی ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر (تایستان ۱۳۸۲). انتستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان. ۲۴ صفحه.
- توكلى اشکلک، م. و مقیم، م. ، ۱۳۸۲. گزارش سفر به روسیه و گشت تحقیقاتی ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (گشت تایستان ۱۳۸۲). ۱۳، ۱۳ صفحه.
- توكلى (اشکلک)، م. ، ۱۳۸۳. ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در حوضه جنوبی دریای خزر (آبهای ایران) (گشت تایستان ۱۳۸۳). انتستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان. ۴۳ صفحه.
- مقیم، م. و بهروز خوشقلب، م. ، ۱۳۸۱. گزارش سفر به روسیه و گشت تحقیقاتی ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری. موسسه تحقیقات شیلات ایران. ۱۶ صفحه.
- مقیم، م. و ولی نسب، ف. ، ۱۳۸۰. گزارش گشت تحقیقاتی در زمینه پرآشن، میزان فراوانی و ساختار کیفی ماهیان خاویاری دریای خزر. مرکز تحقیقات اکولوژی دریای خزر، ۴۹ صفحه.

Bagenal, T. , 1987. Methods for assessments of fish production in fresh water. Blackwell Publishing, London, Edinburgh, Melbourne. 363P.

از طرف دیگر با توجه به اینکه در طرح پیشنهادی کشور روسیه ضرایب صید پذیری کلیه گونه‌های ماهیان خاویاری برای ترال ۲۴/۷ متری ۰/۱ در نظر گرفته شده است، لذا اعداد فراوانی براساس ضرایب فوق محاسبه شده است، بنا براین پیشنهاد می‌شود و لازم است با توجه به اینکه ضرایب صید پذیری براساس منابع مختلف علمی و رفتارهای متفاوت ۵ گونه ماهیان خاویاری نمی‌تواند یکسان و معادل ۰/۱ در نظر گرفته شود باید با استفاده از دوربین‌های زیر آبی و ... ضرایب صید پذیری برای گونه‌های ماهیان خاویاری محاسبه گردد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه عمق محلهای بررسی در خزر شمالی صفر تا ۸ متر است ولی در آبهای ایران از عمق صفر تا ۱۰۰ متری نمونه‌برداری می‌شود. تفاوت عمق محلهای مورد بررسی و استفاده از روش‌های صید و ساختار ترال یکسان از لحاظ علمی قابل قبول نیست و نمی‌توان شاخص و معیار خوبی برای ارزیابی ذخایر باشد. لذا انجام فعالیتهای تحقیقاتی فوق فقط بمنظور انجام بررسی همزمان و مشترک با سایر کشورهای حاشیه دریای خزر می‌باشد.

استفاده از روش ارزیابی ذخایر با ترال در دریای خزر در حال حاضر با توجه به توقیفات انجام گرفته در نشستهای کارشناسی (کارشناسان ایرانی و روسی، CITES و FAO) با در نظر گرفتن سوابق کشور روسیه در برآورد فراوانی و وزن توده زنده با ترال، تا دستیابی به روش مناسب ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر انجام می‌شود. اما استفاده از این روش با توجه به نتایج حاصله بنظر نمی‌رسد توانایی پاسخ گویی کامل در مورد برآورد میزان ذخایر ماهیان خاویاری را داشته باشد زیرا با در نظر گرفتن میزان رهاسازی بچه ماهیان خاویاری بخصوص تاسماهی ایرانی طی سالهای گذشته که در چند ساله اخیر به حدود سالانه ۲۰ میلیون عدد رسیده است و تقریباً ۸۰ درصد آن تاسماهی ایرانی می‌باشد. میزان رهاسازی و وزن توده زنده محاسبه شده در گشتهای ارزیابی ذخایر با تور ترال با توجه به صید تاسماهی ایرانی جوان و عدم صید ماهیان بالغ در صحت نتایج اشکال ایجاد می‌نماید. آمار صید ماهیان بالغ توسط شیلات ایران و از طرف دیگر صید سالانه هزاران عدد بچه عاهی خاویاری تعاونی‌های پره صیادی که بصورت ضمنی صید و رهاسازی می‌شوند، نشانگر میزان بالای تکثیر و رهاسازی بچه ماهیان خاویاری توسط شیلات ایران می‌باشد و تاثیر آن را با صید ماهیان جوان و افزایش فراوانی تاسماهی ایرانی می‌توان مشاهده نمود. صید ماهیان جوان که شامل ماهیان رهاسازی

- Berg, L.S. , 1979.** Freshwater fishes of the USSR and adjacent countries, 4th edition. Jerusalem, Israel.
- Gunderson, D.R. , 1993.** Surveys of fisheries resources. John Wiley & Sons, New York. In: Laevastu, T. ; Alverson, D.T. and Marasco, R.J. 1996. Exploitable Marine Ecosystems: Their Behavior & Management Fishing News Books. 256P.
- Kaymaram, F. , 2003.** Some comments and recommendation of the reports on results of complex interstate all Caspian Sea expedition on the assess of sturgeon species stocks (summer 2001. spring 2002). International Workshop "Methods of Sturgeon stocks assessment and their TAC determination". 52P.
- Khodorevskaya, R.P. and Krasikov, Ye.V. , 1999.** Sturgeon abundance and distribution in the Caspian Sea. Journal of Appl. Ichthol. Vol. 15, pp106-113.
- Laevastu, T. and Favorite, F. , 1988.** Fishing and stock fluctuations. Fishing News Books Ltd., Surrey, 239P.
- Laevastu, T.; Alverson, D.T. and Marasco, R.J. , 1996.** Exploitable Marine Ecosystems: Their Behavior & Management Fishing News Books. 256P.
- Polyninova, A.A. , 1983.** Feeding and food supply of hatchery produced sturgeon fingerlings in the western part of the northern Caspian Sea. In: Biological Principles of Sturgeon Culture. Moscow. NAUKA, pp.200-216.
- Sinclair, A.D.; Gascom, D.O.; Boyle, R.; Rivard, D. and Gavaris, S. , 1991.** Consistency of some northwest Atlantic ground fish stock assessments. NAFO. Sci.Coun. Studies. Vol. 16, pp.59-77. In: (T. Laevastu; D.T. Alverson, and R.J. Marasco, 1996 eds.). Exploitable Marine Ecosystems: Their Behavior & Management Fishing News Books. 256P.
- Sparre, P. ; Ursin, E. and Venema, S.C. , 1989.** Introduction to Tropical Fish stock assessment. Pt. I. Manual. FAO Fisheries Technical Paper. No. 306/1, Rev. 2. Rome, FAO, Italy. 337P.

An investigation on the sturgeon stocks in southern Caspian Sea

Tavakoli M.^{(1)*}; Kaymaram F.⁽²⁾; Behrooz Khooshghalb M.R.⁽³⁾ and
Parandavar H.⁽⁴⁾

M_tavakoli_e@yahoo.com

1,3,4- International Sturgeon Research Institute, P.O.Box: 41635-3464 Rasht, Iran

2- Iranian Fisheries Research Organization, P.O.Box: 14155-6116 Tehran, Iran

Received: February 2006

Accepted: February 2007

Keywords: Sturgeon fish, Stock Assessment, Caspian Sea, Iran

Abstract

We launched a summer and winter cruise using two fishing vessels to assess the stocks of the sturgeon fish in the southern coasts of the Caspian Sea in the year 2004-2005. Eighty five random stations were selected and sampled using a 9 meter trawl in waters less than 10 meters and a 24.7 meter trawl for the depths above 10 meters. We caught 170 sturgeons in the summer cruise which comprised 142 *Acipenser persicus*, 19 *Acipenser stellatus*, 4 *Huso huso*, 3 *Acipenser nudiventris* and 2 *Acipenser gueldenstadtti*. In the winter cruise, 118 sturgeons were caught of which 75 were *Acipenser persicus*, 41 were *Acipenser stellatus*, 1 was *Acipenser nudiventris* and 1 was *Acipenser gueldenstadtti*.

Catch per unit effort (CPUE) was calculated as 2 fish for summer cruise with the *Acipenser persicus* being the most abundant species with 1.67 individuals per trawling while for *Acipenser stellatus* this was 0.22. For *Huso huso*, the CPUE was 0.05 and for *Acipenser nudiventris* it was 0.04. For winter cruise, the CPUE was calculated as 1.38 fish, again with the *Acipenser persicus* as the most abundant with 0.88, while that of the *Acipenser stellatus* was 0.48. The CPUE for *Acipenser gueldenstadtti* and *Acipenser nudiventris* was 0.01 in the winter cruise.

* Corresponding author