

ارزیابی کمی و کیفی روغن بذر دو گونه سورروی به عنوان منبع روغن خوراکی *Halocnemum strobilaceum* و *Salicornia europaea*

آزاده عالمزاده گرجی^۱، غلامعلی حشمتی^۲، احسان زندی اصفهان^{۳*} و جواد معتمدی^۴

- ۱- دانش آموخته دوره دکترای علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
- ۲- استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
- ۳- نویسنده مسئول، استادیار، پخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراعت کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
- ۴- دانشیار، پخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراعت کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

پست الکترونیک: zandiesfahan@gmail.com

تاریخ پذیرش: فروردین ۱۳۹۹

تاریخ اصلاح نهایی: اسفند ۱۳۹۸

تاریخ دریافت: اردیبهشت ۱۳۹۸

چکیده

شناسایی و کشت دانه‌های روغنی جدید گامی مهم در جهت تأمین روغن مورد نیاز در کشور است. با توجه به گستردگی مناطق شور، کشت و بهره‌برداری از گیاهان مقاوم به شوری در شرایطی که هم آب و هم خاک شور است، می‌تواند گزینه‌های مناسب در زمینه تولید و استحصال روغن‌های گیاهی از گیاهان مقاوم به شوری باشد. هدف از این پژوهش، بررسی درصد روغن قابل استحصال و تعیین ترکیب‌های اسیدهای چرب در دو گونه سورروی *Halocnemum strobilaceum* و *Salicornia europaea* در حاشیه دریاچه ارومیه بود. بدین‌منظور، اقدام به جمع آوری بذر گونه‌ها در فصل پاییز ۱۳۹۵ شد. استخراج اسیدهای چرب، توسط حلal انجام شد. مخلوط حلal و روغن، توسط دستگاه تقطیر در خلاً گردشی جدا گردید و بعد از تهیه متیل استر و ترزیق به دستگاه گازکروماتوگرافی (GC)، آنالیز اسیدهای چرب انجام شد. برای شناسایی اسیدهای چرب، از مخلوط استاندارد اسیدهای چرب، ساخت شرکت سیگما با مقایسه زمان‌های بازداری استفاده گردید. اطلاعات حاصل، با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون آماری t مستقل تجزیه و تحلیل شد. میانگین بازده روغن بدست آمده از دو گونه *S. europaea* و *H. strobilaceum* به ترتیب ۱۸/۰۵٪ و ۹/۰٪ محاسبه شد. در مجموع، ۱۲ اسید چرب شامل لوریک اسید (C12:0)، میستوئیک اسید (C14:0)، میریستوئیک اسید (C14:1n5)، پالمیتیک اسید (C16:0)، پالمیتوئیک اسید (C16:1n7)، استاراریک اسید (C18:0)، اوئیک اسید (C18:1n9)، لینولیک اسید (C18:2n6cis)، آلفا-لینولینیک اسید (C18:3n3)، گاما-لینولینیک اسید (C18:3n6)، استاراریک اسید (C18:0) و آراشیدیک اسید (C20:0) در پروفیل این دو گونه ثبت شد. لینولیک اسید به ترتیب با ۵۶٪ و ۵۴٪ در *S. europaea* و *H. strobilaceum* اسید چرب غیراشباع بود. پالمیتیک اسید نیز با ۱۱٪ و ۹٪ درصد به ترتیب در *S. europaea* و *H. strobilaceum* اسید چرب اشباع غالب بود. نتایج نشان داد که با توجه به بازده روغن (۱۸/۰۵٪) و درصد اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع شناسایی شده، بذر گونه *S. europaea* می‌تواند به عنوان یک منبع روغن خوراکی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: استفاده چند منظوره، روغن‌های گیاهی، رویشگاه‌های شور، شورورزی، گونه‌های هالوفیت.

مقدمه

در این راستا، مقدار روغن بذر گونه *Salicornia fruticosa* نیز ۲۸/۹۵٪ و اسید چرب غالب غیراشباع، اسید اولتیک (۵۶/۵۸٪) گزارش گردید (*Elsebaie et al., 2013*).

میزان روغن گونه *Salicornia persica* Akhani با استفاده از روش سوکسله، ۹/۳٪ گزارش شد و با کاربرد آزمون کروماتوگرافی گازی، ۱۰ نوع اسید چرب شناسایی گردید که اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع غالب به ترتیب پالمیتیک اسید و آلفا-لینولنیک اسید بودند. نتایج نشان داد که روغن گونه *S. persica* حاوی ۷۰٪ اسیدهای چرب غیراشباع است که در این میان، اسیدهای چرب آلفا-لینولنیک (امگا-۳) سهم قابل ملاحظه‌ای را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، روغن استحصال شده از نظر پایداری اکسیداتیو، در مقایسه با روغن‌های خوراکی مورد استفاده در صنعت غذا در جایگاه مناسبی قرار دارد (*Ahmadi et al., 2016*).

در بررسی کمی و کیفی اسیدهای چرب در بذر گونه‌های *Salicornia herbacea* و *Suaeda fruticose* روغن به ترتیب ۳۰/۷۶٪ و ۱۳/۸۸٪ و اسید چرب اشباع و غیراشباع غالب به ترتیب پالمیتیک اسید و لینولنیک اسید گزارش شد. نتایج بیانگر آن است که گیاه *Suaeda fruticose* با توجه به بازده بالای روغن و همچنین مقدار و ترکیب اسیدهای چرب غیراشباع، قابل رقابت با دیگر دانه‌های روغنی بوده و قابلیت این را دارد که به عنوان منبع جدید روغن خوراکی مورد استفاده قرار گیرد (*Shahi et al., 2017*).

از این‌رو، در این پژوهش توانمندی گونه‌های *Halocnemum strobilaceum* و *Salicornia europaea* که از عناصر اصلی رویشگاه‌های شور حاشیه دریاچه ارومیه می‌باشند و سهم قابل توجهی را در ترکیب گیاهی این رویشگاه‌ها دارند، به عنوان منبع تولید روغن خوراکی مورد بررسی قرار گرفت.

در سال‌های اخیر، تقاضا برای استفاده از روغن‌های گیاهی رو به افزایش است (*Weber et al., 2007*). از سویی، شاهد افزایش سطح زمین‌های شور در مناطق خشک و نیمه‌خشک هستیم (*FAO, 2005*). اغلب محصولات زراعی روغنی متداول، امکان رشد در چنین شرایطی را نداشتند و تنها تعدادی از گونه‌های هالوفیت (شوررویی)، امکان رشد در این شرایط را دارند. هالوفیت‌ها، دسته‌ای از گیاهان هستند که در شورهزارها، مرداب‌ها، لجن‌زارها، باتلاق‌ها و سواحل دریا پراکنش دارند. این گیاهان، دارای کاربردهای متعددی در تغذیه دام، دانه‌های روغنی، پرورش زنبور عسل، احیاء اراضی بایر، تأمین سوخت، ایجاد فضای سبز، مصارف دارویی و ... هستند (*Khoorsandi et al., 2000*). بنابراین، رویکرد مبتنی بر استفاده از هالوفیت‌ها، می‌تواند راه حلی برای غلبه بر مشکلات اراضی تحت تأثیر شوری باشد.

اگرچه هالوفیت‌ها معمولاً دارای مقادیر زیادی نمک در اندام‌های خود می‌باشند ولی بذر بسیاری از آنها حاوی مقادیر قابل ملاحظه‌ای روغن است (*Ghars et al., 2006*; *Wang et al., 2002*) که قابلیت رقابت با بذرهای روغنی گیاهان زراعی رایج را دارند و مصرف مستقیم بذر بسیاری از آنها توسط انسان یا حیوانات، از نظر میزان نمک محدودیتی ندارد (*Zerai et al., 2010*).

در ارتباط با قابلیت گونه‌های هالوفیت در تولید روغن، پژوهش‌های مختلفی انجام شده است. به طوری که با بررسی *Arthrocnemum* و محتوای روغن پنج گونه *Cressa cretica* *Alhagi maurorum* *indicum* و *Haloxylon stocksii* *Halopyrum mucronatum* گزارش شد که میزان روغن آنها از ۲۲٪ تا ۲۵٪ متغیر است. ضمن اینکه ۱۲ اسید چرب غیراشباع در آنها گزارش شد که میزان آن از ۶۵٪ تا ۷۴٪ متغیر بود. نتایج به طور واضح نشان داد که بذر گونه‌ها، به ویژه بذر گونه *S. fruticose* برای تهیه روغن گیاهی مناسب است (*Weber*

نمونه برداری از هر دو گونه در حاشیه غربی دریاچه ارومیه انجام شد. در این ارتباط، بذر گونه *S. europaeaee* از رویشگاه‌های شور منطقه گلمانخانه با موقعیت جغرافیایی ۳۷ درجه و ۷۵ دقیقه و ۶۸ ثانیه طول شرقی و ۴۵ درجه، ۲۳ دقیقه و ۲۸ ثانیه عرض شمالی جمع‌آوری شد. این منطقه، با وجود پایین رفت سطح آب دریاچه، نسبت به دیگر مکان‌ها عمق رگه آب زیرزمینی شور در آن کم می‌باشد و بیشتر موقع سال حالت باتلاقی دارد.

با توجه به لکه‌ای بودن پراکنش گونه *S. europaeaee* آماربرداری از پوشش گیاهی در داخل سه توده معرف انجام شد. در هر یک از توده‌ها، با استناد به مطالعات قبلی (Motamedi et al., 2018a; Motamedi et al., 2015; Motamedi et al., 2018b) و منابع مرتبط با اندازه‌گیری پوشش گیاهی (Motamedi et al., 2016)، سه ترانسکت ۱۰۰ متری با فاصله ۱۰ متر از هم‌دیگر در امتداد گرادیان شوری بکار برده شد. در روی هر ترانسکت نیز ۱۰ پلات نیم متر مربعی، با فاصله ۱۰ متر از هم‌دیگر مستقر گردید. از تولید جمع‌آوری شده هر یک از پلات‌ها در امتداد هر ترانسکت، مقداری بذر برای اندازه‌گیری روغن و اسیدهای چرب به عنوان نمونه برداشت شد. در مجموع، در هر توده معرف سه نمونه مرکب و برای کل رویشگاه *S. europaeaee* ۹ نمونه برداشت گردید.

بذر گونه *H. strobilaceum* از رویشگاه‌های شور منطقه سبیرغان که در نزدیکی کوه زنبیل و در موقعیت جغرافیایی ۳۷ درجه و ۴۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه طول شرقی و ۴۵ درجه، ۱۵ دقیقه و ۱۵ ثانیه عرض شمالی پراکنش دارد، جمع‌آوری شد.

برای آماربرداری از پوشش گیاهی با توجه به نحوه پراکنش گونه *H. strobilaceum* که تقاضوت بارزی با نحوه پراکنش گونه *S. europaeaee* دارد، با استناد به مطالعات قبلی (Motamedi et al., 2015; Motamedi et al., 2018a; Motamedi et al., 2018b; Motamedi et al., 2016) و منابع مرتبط شرایطی که بذر گونه‌ها رسیده و آماده برداشت بودند، بذر

مواد و روش‌ها

مطالعات میدانی

برای انجام این پژوهش، ابتدا با استناد به مطالعات قبلی (Motamedi et al., 2018a; Motamedi et al., 2015; Motamedi et al., 2019; Motamedi et al., 2018b; Alizadeh et al., 2014) و شناخت از رویشگاه‌های شور حاشیه دریاچه ارومیه، محل‌های معرف پراکنش هر یک از گونه‌های *H. strobilaceum* و *S. europaeaee* مشخص شد. گونه‌های مذکور، به صورت دایره‌های متحدم‌المرکز از مرکز شوری به سمت اراضی حاشیه‌ای پراکنش دارند. به گونه‌ای که در نواره اول، گونه *S. europaeaee* و در نواره بعدی، گونه *H. strobilaceum* پراکنش دارد. گونه *S. europaeaee* نسبت به گونه *H. strobilaceum* بیشتر رویشگاه باتلاقی را ترجیح می‌دهد و به محض اینکه عمق رگه آب زیرزمینی پایین رفت شروع به خشک شدن می‌کند و آثار پژمردگی در آن پدیدار می‌شود. درنتیجه با توجه به عمق رگه آب زیرزمینی، به صورت لکه‌های پراکنده با عرض بعضاً ۲۵ تا ۵۰ متر و طول ۱۵۰ تا ۱۰۰ متر پراکنش دارد. گونه *H. strobilaceum* معمولاً به صورت بوته‌ای و کپه‌ای در رویشگاه خود پراکنش دارد و با توجه به مقدار شوری و فاصله از مرکز شوری، دارای خصوصیات ساختاری و عملکردی متفاوت می‌باشد. آنچه مسلم است نسبت به گونه *S. europaeaee* در سطح نسبتاً وسیع تری و به طور یکنواخت پراکنش دارد.

بعد از انتخاب محل‌های پراکنش هر یک از گونه‌ها، در هر مکان با توجه به نحوه پراکنش گونه‌ها و سطح اشغال شده توسط آنها، یک یا چند توده معرف به‌منظور آماربرداری از پوشش گیاهی و جمع‌آوری بذر انتخاب شد. آماربرداری از پوشش گیاهی و جمع‌آوری بذر انتخاب شد. با توجه به گستردگی عرصه‌های پراکنش و اینکه تقویم مراحل رشد گونه‌ها یکسان نمی‌باشد، آماربرداری از پوشش گیاهی در زمان‌های مختلف از فصل رویش انجام شد و در آنها جمع‌آوری گردید.

آنالیز اسیدهای چرب

برای آنالیز اسیدهای چرب، روغن نمونه‌ها به متیل استر تبدیل گردید. برای این منظور، ابتدا یک گرم از روغن استخراجی، داخل یک اrlen ۵۰۰ میلی‌لیتری ریخته و روی اجاق قرار داده شد. سپس ۲۰ میلی‌لیتر متابول به روغن اضافه و با عمل رفلکس حرارت ایجاد شد تا به جوش آید. پس از آن، از طریق بالای خنک‌کننده ۲۰ میلی‌لیتر محلول تری فلورید بور (BF_3) به نمونه اضافه و به مدت یک ساعت عمل رفلکس انجام شد. سپس نمونه از روی اجاق برداشته شد تا خنک شود. در مرحله بعد، ۲۰ میلی‌لیتر هگزان به آن اضافه شد و به مدت ۱۵ دقیقه نمونه توسط مگنت هم زده شد. سپس محتويات اrlen را در یک قیف دکانتور ریخته و فرصت داده شد تا در دو مرحله از یکدیگر جدا گردد. بخش زیرین تخلیه شد و بخش فوقانی که همان متیل استر بود دو تا سه مرتبه با آب مقطر شستشو داده شد تا اسید موجود در نمونه باعث خرابی دستگاه نشود. pH بخش پایینی جدا شده که آب بود، با اضافه کردن دو تا سه قطره متیل اورانثر بررسی شد. اگر بخش آبی، قرمز شود، نشان‌دهنده این است که نمونه اسیدی است و نیاز است تا نمونه متیل استر شسته شود. این عمل تا زمانی که بخش آبی به رنگ زرد درآید ادامه یافت. پس از این مراحل، نمونه بدست آمده با سدیم سولفات رطوبت‌گیری شد و به دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) تزریق گردید. برای شناسایی اسیدهای چرب، از مخلوط استاندارد اسیدهای چرب، ساخت شرکت سیگما با مقایسه زمان‌های بازداری استفاده گردید (Carvalho & Malcata, 2005; Gunstone, 1996).

دستگاه کروماتوگراف گازی بکار برده شده، از مدل Agilent-6890 ساخت کمپانی آمریکا می‌باشد که مجهز به دریچه تزریق کاپیلاری، ستون کاپیلاری ویژه تجزیه اسیدهای چرب (DB-WAX) به طول ۳۰ متر و قطر داخلی ۰/۰۲۵ میلی‌متر با فاز ساکن پلی‌اتیلن گلیکول به ضخامت ۰/۰۲۵ میکرومتر و آشکارساز یونیزاسیون

داخل ترانسکت‌های نواری 50×20 متری انتخاب شد. آنگاه ترانسکت‌ها در امتداد گرادیان شوری و با فاصله ۱۰۰ متر از همدیگر بکار برده شدند. پس از استقرار ترانسکت‌ها، از ۶۰ پایه گیاهی نمونه‌برداری شد که از این ۶۰ پایه مقداری بذر برای اندازه‌گیری روغن و اسیدهای چرب برداشت شد. در این مورد، بذر حاصل از ۱۰ پایه انتخابی در هر محدوده به عنوان یک نمونه مرکب در نظر گرفته شد که در مجموع ۹ نمونه برای انجام آزمایش لحاظ گردید.

مطالعات آزمایشگاهی

استخراج و تعیین درصد روغن

بعد از جمع آوری بذر گونه‌ها، مقدار روغن و درصد ترکیبات روغن در آزمایشگاه جهاد دانشگاهی ارومیه تعیین گردید. برای این منظور، پس از جداسازی پوسته بذرها و تمیز کردن آنها، نمونه‌ها آسیاب شد و بعد از هموزن نمودن، $2/5$ گرم از نمونه‌های بذر به لوله آزمایش درب پیچ دار منتقل شد. استخراج روغن با هگزان انجام شد که برای تسريع در عمل استخراج، در هر مرحله به مدت ۱۰ دقیقه در داخل دستگاه اولتراسوند قرار داده شد و مخلوط حاصل به مدت پنج دقیقه در ۳۰۰۰ دور بر دقیقه سانتریفیوژ گردید. حلال حاوی روغن، به لوله‌های آزمایش که قبلاً وزن آنها معلوم شده منتقل و حلال با گاز ازت تبخیر و درصد روغن طبق رابطه‌های ۱ و ۲ محاسبه شد (Cravotto, 2008).

رابطه ۱

$$\text{وزن لوله خالی} - (\text{وزن لوله} + \text{وزن روغن}) = \text{روغن استخراج شده}$$

رابطه ۲

$$100 \times \{\text{وزن نمونه (گرم)} / \text{وزن روغن (گرم)}\} = \text{روغن استخراج شده} (\%)$$

نتایج بررسی گونه *H. strobilaceum* نشان داد که میزان روغن بذر این گونه $\frac{9}{28}\%$ است (جدول ۱). در مجموع، ۱۲ اسید چرب در بررسی ترکیب اسیدهای چرب این گونه گزارش شد که حاوی پنج اسید چرب اشباع شامل لوریک اسید، پالمیتیک اسید، استئاریک اسید، میریستیک اسید و آراشیدیک اسید و سه اسید چرب تک غیراشباع شامل پالمیتوئیک اسید، اولئیک اسید و میریستوئیک اسید و چهار اسید چرب چند غیراشباع شامل لینولئیک اسید، گاما-لینولئیک اسید، آلفا-لینولنیک اسید و استئاریک اسید بود. اسیدهای چرب غیراشباع $\frac{54}{76}\%$ و اسید چرب اشباع پالمیتیک اسید با $\frac{9}{32}\%$ بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند (جدول ۱).

نتایج آزمون t مستقل درصد و ترکیب‌های روغن بذر گونه‌های مورد پژوهش، نشان داد که میزان روغن بذر دو گونه دارای اختلاف آماری در سطح ۱٪ می‌باشد. به طوری که میزان روغن در بذر گونه *S. europaeaee* به طور معنی‌داری بیشتر ($\frac{18}{55}\%$) و دو برابر مقدار آن در بذر گونه *H. strobilaceum* ($\frac{9}{25}\%$) بود (جدول ۲). نتایج نشان داد که بین بذر دو گونه از نظر تمامی اسیدهای چرب، بجز میریستوئیک اسید اختلاف معنی‌دار وجود دارد. میزان اسیدهای چرب اشباع لوریک اسید، میریستیک اسید و استئاریک اسید در گونه *H. strobilaceum* بیشتر و مقدار آراشیدیک اسید و پالمیتیک اسید در بذر گونه *S. europaeaee* بیشتر می‌باشد. اسیدهای چرب غیراشباع پالمیتوئیک اسید و اولئیک اسید در بذر گونه *H. strobilaceum* بیشتر و لینولئیک اسید، آلفا-لینولنیک اسید، گاما-لینولئیک اسید و استئاریک اسید در بذر گونه *S. europaeaee* بیشتر است (جدول ۲).

شعله‌ای (FID) است. دمای اولیه آون در ۷۵ درجه سانتی‌گراد به مدت یک دقیقه نگه داشته شد و بعد با سرعت ۲۵ درجه سانتی‌گراد بر دقیقه، تا ۲۴۰ درجه سانتی‌گراد افزایش یافت و هشت دقیقه در همان دما باقی ماند. از گاز نیتروژن به عنوان گاز حامل و آراینده، به ترتیب با سرعت جریان یک و ۴۵ میلی‌لیتر بر دقیقه استفاده گردید. دمای دریچه تزریق در ۲۵۰ درجه سانتی‌گراد و دمای آشکارساز در ۲۸۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم شد.

تجزیه و تحلیل داده‌ها

داده‌های بدست آمده از آزمایش‌ها، با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد. مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون t مستقل در سطح ۱٪ انجام شد. برای بررسی برابری واریانس‌ها از آزمون لیون استفاده گردید.

نتایج

بر مبنای نتایج، میزان روغن بذر گونه *S. europaeaee* برابر $\frac{18}{58}\%$ بود (جدول ۱). در مجموع، ۱۱ اسید چرب در بررسی پروفیل اسیدهای چرب این گونه گزارش شد که حاوی پنج اسید چرب اشباع شامل لوریک اسید، پالمیتیک اسید، استئاریک اسید، میریستیک اسید و آراشیدیک اسید و دو اسید چرب تک غیراشباع شامل پالمیتوئیک اسید، اولئیک اسید و چهار اسید چرب چند غیراشباع شامل لینولئیک اسید، گاما-لینولئیک اسید، آلفا-لینولنیک اسید و استئاریک اسید بود. اسیدهای چرب غیراشباع لینولئیک اسید و اولئیک اسید به ترتیب با $\frac{56}{75}\%$ و $\frac{24}{75}\%$ اسید چرب اشباع پالمیتیک اسید با $\frac{11}{4}\%$ بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند (جدول ۱).

جدول ۱- میانگین درصد و ترکیب‌های روغن بذر گونه‌های *Halocnemum strobilaceum* و *Salicornia europaea*

<i>H. strobilaceum</i>	<i>S. europaea</i>	نماد	متغیر
۹/۲۸b	۱۸/۵۸a	Oil	روغن
۲/۲۲a	۱/۳۵b	C12:0	lauric acid
۰/۳۰a	۰/۱۷a	C14:0	merisitic acid
۰/۱۹a	۰/۰۰b	C14:1n5	myristoleic acid
۹/۳۰b	۱۱/۳۹a	C16:0	palmitic acid
۰/۴۳a	۰/۲۷b	C16:1n7	palmitoleic acid
۲/۳۲a	۱/۴۰b	C18:0	stearic acid
۲۶/۳۰a	۲۴/۷۵b	C18:1n9	oleic acid
۵۴/۷۶b	۵۶/۰۲a	C18:2n6cis	linoleic acid
۲/۰۷b	۳/۰۵a	C18:3n3	α-linolenic acid
۰/۳۹b	۰/۴۷a	C18:3n6	γ-linoleic acid
۰/۱۹b	۰/۳۸a	C20:0	arachidic acid
۱۵/۳۳	۱۴/۶۹	ΣSFA	مجموع اسید چرب اشباع
۲۶/۷۳	۲۵/۰۲	ΣMUFA	اسیدهای چرب تک غیراشباع
۵۷/۷۵	۶۰/۲۹	PUFA	اسیدهای چرب چند غیراشباع

(Saturated Fatty Acids) SFA: اسید چرب اشباع؛ (Mono Unsaturated Fatty Acids) MUFA: اسید چرب تک غیراشباع؛ (Poly Unsaturated Fatty Acids) PUFA: اسید چرب چند غیراشباع؛ حروف لاتین غیر مشابه نشان‌دهنده تفاوت معنی دار ($P < 0.01$) در متغیر است.

درصد مقدار روغن قابل استخراج از یک گونه، عامل مهمی برای ارزش‌گذاری آن بوده و هرچه مقدار روغن قابل استخراج بیشتر باشد، ارزش اقتصادی آن بیشتر خواهد بود. هر چند برای توصیه قابلیت کشت یک گیاه روغنی، تنها داشتن روغن بالا نمی‌تواند صفت قابل توصیه باشد. برای این منظور، باید صفات دیگری از جمله کیفیت روغن، درصد اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع، ماندگاری روغن، عدد یدی، عدد صابونی، خصوصیات زراعی گیاه و مهمتر از همه، عملکرد بذر و عملکرد اقتصادی یک گیاه و قیمت تمام شده آن و سایر خصوصیات زراعی و اقتصادی مانند دوره ماندگاری در زمین، دوره رشد اقتصادی، مزايا و معایب برداشت و هزینه‌های مربوط به استخراج را نیز لحاظ نمود (Ariffin *et al.*, 2009).

بحث

با توجه به وسعت اراضی شور در ایران، کشت و بهره‌برداری از گیاهان هالوفیت و مقاوم به شوری در شرایطی که آب و خاک شور است، می‌تواند گزینه‌ای مناسب در زمینه تولید و استحصال روغن‌های گیاهی از گیاهان هالوفیت و مقاوم به شوری باشد.

نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر وجود اختلاف معنی دار بین محتوای روغن بذر دو گونه بود. به طوری که درصد روغن بذر گونه *S. europaea* دو برابر میزان روغن بذر گونه *H. strobilaceum* می‌باشد که از لحاظ میزان روغن، با گیاه Shahi (با مقدار روغن ۱۸٪ تا ۲۵٪) قابل مقایسه است (Shahi *et al.*, 2017).

جدول ۲- نتایج آزمون t مستقل درصد و ترکیب‌های روغن بذر گونه‌های*Halocnemum strobilaceum* و *Salicornia europaea*

Sig (2-tailed)	درجه آزادی	t	F	میانگین و انحراف از معیار <i>H. strobilaceum</i>	میانگین و انحراف از معیار <i>S. europaea</i>	متغیر
./...***	۱۶	۱۰/۴	.	۹/۲۸±۰/۶۰	۱۸/۵۵±۰/۶۰	روغن
./...***	۱۶	۷/۸	۰/۷	۲/۲۲±۰/۰۹	۱/۳۵±۰/۰۶	lauric acid
./...***	۱۶	۱۶/۸	۱۵/۶	۰/۳۰±۰/۰۱	۰/۱۷±۰/۰۱	merisitic acid
./۶۰ ns	۱۶	۰/۵	۴/۱	۰/۱۹±۰/۰۰۵	-	myristoleic acid
./۰۳*	۱۶	۳/۳	۱/۳	۹/۳۰±۰/۶۰	۱۱/۳۹±۰/۳۰	palmitic acid
./۰۴*	۱۶	۲۱/۰	۰/۲	۰/۴۳±۰/۴۰	۰/۲۷±۰/۴۰	palmitoleic acid
./...***	۱۶	۵/۰	۸/۷	۳/۳۲±۰/۰۴	۱/۴۰±۰/۰۷	stearic acid
./۰۲*	۱۶	۳/۶	۳/۸	۲۶/۳۰±۰/۰۴	۲۴/۷۵±۰/۲۱	oleic acid
./...***	۱۶	۷/۸	۰/۲	۰/۲۰±۵۴/۷۶	۰/۳۰±۵۶/۰۲	linoleic acid
./...***	۱۶	۳/۶	۹/۳	۰/۰۲±۲/۰۷	۰/۱۰±۳/۰۵	α-linolenic acid
./۰۴*	۱۶	۷/۲	۲/۰	۰/۳۹±۰/۰۵	۰/۴۷±۰/۰۱	γ-linoleic acid
./۰۱***	۱۶	۱۰/۵	۱۲/۴	۰/۱۹±۰/۶۰ a	۰/۳۸±۰/۶۰	arachidic acid

**: معنی داری در سطح ۰/۰۱، *: معنی داری در سطح ۰/۰۵، ns: عدم اختلاف معنی دار

رژیم غذایی از نظر نقش عملکرد آن برای بافت‌ها و حفظ و نگهداری بدن ضروری است و مؤثرترین اسید چرب برای کاهش سطح کلسترول خون است. به عنوان مثال، وجود این اسید برای تولید هورمون‌هایی مثل پروستاگلاندین که در پیشگیری از لخته شدن خون در رگ‌ها و تورم شریان‌ها نقش حیاتی دارد، مؤثر است (Franzen-Castle *et al.*, 2010).

مهمنترین اسید چرب اشباع موجود در بذر گونه *S. europaea* پالمیک اسید با مقدار ۱۱/۴٪ بود. این اسید چرب، در روغن بیشتر دانه‌های روغنی وجود دارد ولی بیشترین مقدار آن در روغن پالم می‌باشد. میزان این اسید چرب در روغن زیتون ۷/۵٪ تا ۲۰٪ و در روغن آفتابگردان ۷/۵٪ تا ۱۳٪ است (Ahangar *et al.*, 2015).

مهمنترین شاخص یک روغن خوراکی، محتوای اسید چرب غیراشباع و تنوع این اسیدهای چرب در روغن می‌باشد. زیرا روغن با حجم زیاد اسید چرب غیراشباع روغن سالم‌تری است (Ariffin *et al.*, 2009).

اسید چرب غیراشباع غالب در بذر گونه *S. europaea* به ترتیب لینولئیک اسید و اولئیک اسید با مقدار ۵۶/۲٪ و ۲۴/۹٪ بود. چنین شرایطی را می‌توان با روغن ارقام متداول آفتابگردان و کانولا که دارای مقدار لینولئیک اسید بیشتر، اولئیک اسید متوسط و مقدار کمی اسیدهای چرب اشباع است، مقایسه کرد.

با توجه به ترکیب اسیدهای چرب موجود در بذر گونه *S. europaea* روغن موجود می‌تواند روغن مناسبی برای پخت و پز و خوراکی باشد. لینولئیک اسید موجود در این روغن، اسید چرب ضروری بدن انسان بوده و وجود آن در

و لینولئیک به ترتیب با مقدار ۴۷/۶۳، ۲۴/۳ و ۱۹/۶ درصد، اسیدهای چرب غالب بودند که کاملاً با نتایج این پژوهش متفاوت است. همچنین با بررسی مقدار روغن و ترکیب اسیدهای چرب بذر گونه‌های *Suaeda aegyptiaca* و *H. strobilaceum* در اراضی شور استان یزد، میزان روغن بذر گونه *H. strobilaceum* ۱۷/۱۲٪ گزارش شد که لینولئیک اسید و اولئیک اسید با مقدار ۵۸/۲٪ و ۲۱/۱۶٪ بیشترین میزان را در بین اسیدهای چرب به خود اختصاص دادند (Ghasemi Firouzabadi et al., 2014).

تفاوت در بازده روغن، درصد و نوع اسیدهای چرب آنالیز شده توسط سایر محققان با نتایج این آزمایش را می‌توان به تنوع شرایط اقلیمی، نوع خاک و تفاوت در شرایط جمع‌آوری بذرها و روش‌های آنالیز نسبت داد. به عنوان مثال، دما مهمترین فاکتور محیطی مؤثر بر روغن گیاهان است و هرچه دما پایین‌تر باشد، درصد روغن تولیدی بیشتر است (Asghari et al., 2012).

نتایج اولیه این پژوهش اعتبار فرضیه استفاده از گونه‌های مقاوم به شوری، به عنوان منبع تولید روغن خوارکی مانند سایر گیاهان زراعی را اثبات کرد. با اهمیت به اینکه گیاهان مذکور در مناطقی با خاک و آب شور و لب‌شور رشد می‌کنند ولی با توجه به درصد اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع شناسایی شده در این گونه‌ها، استفاده از گیاهان هالوفیت به عنوان منبع تولید روغن خوارکی، جای بررسی بیشتری دارد. همچنین با توجه به درصد اسیدهای چرب غیراشباع، منع روغنی مناسبی برای اصلاح ترکیبات اسید چرب بسیاری از محصولات روغنی که دچار فقر هستند، می‌باشد.

منابع مورد استفاده

- Ahangar, S., Pirvani, Z., Khodaparast, M.H. and Safavar, H., 2012. Comparison of fatty acid composition of Olive oil in different regions of Iran. Journal of Nutrition Science and Technology, 2(2): 39-49.
- Ahmadi, H., Noroozy, J., Farhoodi, M., Rahimi, M.R. and Rahmatzadeh, B., 2016. Extraction and physicochemical properties of Salicornia (*Salicornia*

در این راستا، با بررسی ویژگی‌های فیزیکی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی بذر گونه *S. herbacea*، اسیدهای چرب غالب در این گونه لینولئیک اسید (۷۳/۴۳٪) و اولئیک اسید (۱۹/۸۱٪) گزارش شد (Choi et al., 2014). همچنین *S. persica* Akhani میزان روغن استخراج شده از گونه آلفا-لینولئیک (۹/۳٪) و اسید چرب غیراشباع غالب، آلفا-لینولئیک (Ahmadi et al., 2016) گزارش شد (امگا-۳). میزان روغن موجود در هر ۱۰۰ گرم بذر گونه *S. brachatei* (Rao et al., 2015) ۲۶/۵٪ تا ۲۴/۵٪ گزارش شد.

در مجموع، ۱۲ آمینو اسید و اسید چرب یافت شد که اسیدهای چرب غیراشباع غالب، اولئیک اسید و لینولئیک اسید بودند. میزان روغن استخراج شده از بذر گونه *S. fruticosa* ۷۸/۰۵٪ گزارش شد که اسیدها به اسیدهای چرب غیراشباع، اولئیک اسید با ۵۶/۵۸٪ لینولئیک اسید با ۴۰/۱۷٪ و لینولئیک اسید با ۹۸/۳٪ نسبت داده شده است (Elsebaie et al., 2013).

اگرچه در این پژوهش روغن استحصالی از بذر *H. strobilaceum* کمتر از ۱۰٪ بود، اما به دلیل داشتن دو اسید چرب غیراشباع (لينولئيک اسید و اولئيک اسید با مقدار ۵۴/۹٪ و ۲۶/۵۳٪)، منبع مناسبی برای تأمین اسیدهای چرب غیراشباع می‌باشد که قابل مقایسه با روغن زیتون و هسته‌انگور است. تولید بذر هر پایه گونه *H. strobilaceum* با میانگین قطر تاج ۱۳۵ در ۹۵ سانتی‌متر، به طور میانگین ۳۰ گرم است که با احتساب ۷۴۱ پایه در هر هکتار، قابلیت تولید بذر رویشگاه مورد بررسی ۲۲/۲ کیلوگرم در هکتار می‌باشد.

ترکیب و میزان اسیدهای چرب موجود در روغن، مهمترین عامل در صنعتی یا خوارکی بودن آن محسوب می‌شود. به طورکلی مطالعات کمی از بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در بذر این گونه از جمله روغن و اسیدهای چرب گزارش شده است. در این ارتباط، میزان اسیدهای چرب اشباع گونه *H. strobilaceum* با ۵۶/۱٪ بیشتر از اسیدهای چرب غیراشباع با ۴۳/۸٪ گزارش شد (Mariem et al., 2018). اسیدهای چرب پالمتیک، اولئیک

- Sustainable use of salt and saline water resources in agriculture. Iranian National Committee on Irrigation and Derange, 333p.
- Mariem, S., Mariam, J. and Riadh, K., 2018. Antioxidant and antimicrobial activities of *Halocnemum strobilaceum* fractions and their related bioactive molecules by GC/MS and HPLC. Research Journal of Recent Science, 7(7): 1-9.
 - Motamedi, J., Abdolslizadeh, Z. and Sheidaei Karkaj, E., 2016. Field and laboratory methods for grassland and animal production research. University of Urmia Press, 529p.
 - Motamedi, J., Alizadeh, A. and Alemzadeh Gorji, A., 2015. Effect of vegetation patches as microhabitat on changing soil properties (Case study: saline rangelands of Tez Kharab in Urmia). Journal of Range and Watershed Management, 68(1): 149-158.
 - Motamedi, J., Alizadeh, A. and Sheidaei Karkaj, E., 2018a. Effect of halophyte patches on some soil properties of a saline rangeland of Urmia lake coast, Iran. Journal of Rangeland Science, 8(4): 363-372.
 - Motamedi, J., Valinejad, F., Alizadeh, A. and Souri, M., 2018b. Investigation the effect of the patches ecological and single basal holofite bases of Urmia Lake as microbial habitat on soil characteristics. Desert Ecosystem Engineering Journal, 7(20): 1-12.
 - Motamedi, J., Jafari, A.A. and Zohdi, M., 2019. Management of the habitat of *Alhagi pseudalhagi* in the saline rangeland of Urmia Lake coast. Journal of Iran Nature, 4(1): 33-42.
 - Rao, G.M.N., Prayaga, M.P. and Kumar, M.M.K., 2015. Seeds of *Salicornia brachiata* as a source of edible oil. Indian Journal of Applied Research, 5(8): 532-533.
 - Shahi, M., Saghari, M., Zandi Esfahan, Z. and Jaimand, K., 2017. Qualitative and quantitative study on the seed oil of *Salicornia herbacea* L. and *Suaeda fruticosa* (L.) Forssk. as a source of edible oil. Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 33(2): 234-242.
 - Wang, R., Dominguez-Espinosa., R.M., Leonard, K., Koutinas, A. and Webb, C., 2002. The application of a generic feedstock from wheat for microbial fermentations. Biotechnol Progress, 18(5): 1033-1038.
 - Weber, D.J.R., Ansar, I. and Gul, R., 2007. Potential of halophytes as source of edible oil. Journal of Arid Environment, 68(14): 315-321.
 - Zerai, D.B., Glenn, E.P., Chatervedi, R.L., Mamood, A.N., Nelson, S.G. and Ray, D.T., 2010. Potential for improvement of *Salicornia bigelovii* through selective breeding. Ecological Engineering, 36: 730-739.
 - persica Akhani sub sp. *Rudshorensis* Akhani) oil. Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 11(1): 67-74.
 - Alizadeh, A., Motamedi, J. and Erfanzadeh, R., 2014. Potential of four halophytes from the Urmia Lacke as soli phytodesalination. Journal of Range and Desert Research, 21(4): 663-675.
 - Ariffin, A.A., Bakar, J., Tan, C.P., Rahman, R.A., Karim, R. and Loi, C.C., 2009. Essential fatty acids of pitaya (dragon fruit) seed oil. Food Chemistry, 114(2): 561-564.
 - Asghari, J., Alimardani, S. and Mazahri, M., 2012. Extraction and determination of essential fatty acid leaves *Portulaca oleracea*. Journal of Herbal Drugs, 3(3): 157-166.
 - Carvalho, A.P. and Malcata, F.X., 2005. Preparation of fatty acid methyl esters for gas-chromatographic analysis of marine lipids. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53: 5049-5059.
 - Choi, D., Lim, G.S., Piao, Y.L., Choi, O.Y., Cho, K.A. and Park, C.B., 2014. Characterization, stability, and antioxidant activity of *Salicornia herbacea* seed oil. Korean Journal of Chemical Engineering, 31(12): 2221-2228.
 - Cravotto, G., 2008. Improved extraction of vegetable oils. Ultrasonic Son chemistry, 15: 898-902.
 - Elsebaie, E.M., Elsanat, S.Y., Gouda, M.S. and Elnemr, K.M., 2013. Oil and fatty acids composition in Glasswort (*Salicornia Fruticosa*) seeds. Journal of Applied Chemistry, 4(5): 6-9.
 - FAO, 2005. Global network on integrated soil management for sustainable use of salt affected soils.
 - Franzen-Castle, L.D., 2010. Omega-3 and Omega-6 Fatty Acids. Neb Guide, University of Nebraska-Linkoln Extension. Institute of Agriculture and Natural Resource, 3p.
 - Ghars, M.A., Debez, A., Smaoui, A., Zarrouk, M., Grignon, C. and Abdelly, C., 2006. Variability of fruit and seed oil characteristics in Tunisian accessions of the halophyte *Cakile maritima* (Brassicaceae): in Ecophysiology of High Salinity Tolerant Plants, Printed in the Netherlands, 55-67.
 - Ghasemi Firouzabadi, A., Jafari, M., Assareh, M.H., Arzani, H. and Javadi, A., 2014. Investigation on the potential of halophytes as a source of edible oil case study: *Suaeda aegyptiaca* and *Halocnemum strobilaceum*. International Journal of Bio-sciences, 5(10): 87-93.
 - Gunstone, F.D., 1996. Fatty Acid and Lipid Chemistry. Blackie Academic and Professional, London, 252p.
 - Khoorsandi, F., Vaziri, Z. and Vaziri, H., 2000.

Quantitative and qualitative evaluation of seed oil of *Salicornia europaea* and *Halocnemum strobilaceum* as a source of edible oil

A. Alemzadeh Gorji¹, Gh.A. Heshmati², E. Zandi Esfahan^{3*} and J. Motamedi⁴

1- Ph.D graduated of Rangelands Science, University of Agricultural Sciences and Natural Resources of Gorgan, Gorgan, Iran

2- University of Agricultural Sciences and Natural Resources of Gorgan, Gorgan, Iran

3*- Corresponding author, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran, E-mail: zandiesfahan@gmail.com

4- Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

Received: May 2019

Revised: March 2020

Accepted: April 2020

Abstract

Identification and cultivation of new oilseeds is an important step in supplying the oil needed in the country. Regarding the vastness of saline areas in the country, the cultivation and exploitation of salinity-resistant plants under saline conditions of both water and soil can be an appropriate option in the field of production and extraction of oils from salinity-resistant plants. The aim of this study was to determine the percentage of extractable oil and the compounds of fatty acids in two halophyte species *Salicornia europaea* and *Halocnemum strobilaceum* on the shores of Lake Urmia. For this purpose, the seeds of the species were collected in autumn of 2016. Fatty acids were extracted by solvent. The solvent-oil mixture was separated by rotary vacuum distiller, and after methyl ester preparation and injection into the gas chromatography (GC), fatty acids were analyzed. To identify the fatty acids, a standard mixture of fatty acids (Sigma Co.) and their inhibition times were used. Data were analyzed by SPSS software using independent t-test. The mean oil yields of two species of *S. europaea* and *H. strobilaceum* was obtained 18.58 and 9.28%, respectively. In total, 12 fatty acids including lauric acid (C12: 0), meristic acid (C14: 0), myristoleic acid (C14: 1n5), palmitic acid (C16: 0), palmitoleic acid (C16: 1n7), stearic acid (C18: 0), oleic acid (C18: 1n9), linoleic acid (C18: 2n6cis), α -linolenic acid (C18: 3n3), γ -linoleic acid (C18: 3n6), and arachidic acid (C20: 0) were recorded in the profiles of these two species. Linoleic acid was the most major unsaturated fatty acid in *S. europaea* and *H. strobilaceum*, at 56 and 54.7%, respectively. Palmitic acid was also predominant saturated fatty acid in *S. europaea* and *H. strobilaceum*, at 11.4 and 9.7%, respectively. The results showed that according to the oil yield (18.58%) and percentage of saturated and unsaturated fatty acids identified, *S. europaea* seeds could be evaluated as a source of edible oil.

Keywords: Multiple use, vegetable oils, saline habitats, salinity, halophyte species.