

تجربه مدیریت تلفیقی آفات خیار گلخانه بر پایه کنترل بیولوژیک با عوامل تولید داخل

شهریار عسگری^۱✉، شهرام فرخی^۲، سیدحسین ملکشی^۲، شهرام نعیمی^۲، مسعود اربابی^۳ و شهرام شاهرخی^۴

بخش تحقیقات کشت گلخانه‌ای، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی تهران، ورامین، ایران؛ ۲- دانشیار، استادیار و دانشیار بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، ۳- استاد، بخش تحقیقات جانورشناسی، ۴- دانشیار، بخش تحقیقات سن گندم، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

در گلخانه‌های خیار حدود ۱۳۰۰ مترمربعی ساختار فلزی منطقه ورامین، مدیریت آفات بر پایه بیولوژیک (تیمار) با مدیریت بر پایه شیمیایی مرسوم کشاورز (شاهد)، در فصل کشت زمستانه-بهاره (۱۴۰۱-۱۴۰۰) مقایسه شد. در گلخانه تیمار، آفات با تقویت جمعیت طبیعی مگس شکارگر سنوزیا (*Coenosia attenuata*) و رهاسازی عوامل بیولوژیک (۳ گونه کنه شکارگر *Neoseiulus californicus*, *Phytoseiulus persimilis*, *Amblyseius swirskii*) تولید داخل و بیماریهای هوازاد و خاکزاد بترتیب با فارچ‌کش‌های شیمیایی و زیستی کنترل شدند. پایش آفات دو گلخانه یک هفته در میان، به روش ۱- مشاهده و پرچم زدن گیاهان آلوده ۲- نمونه‌برداری تصادفی از ۱۵ بوته و ۳- ثبت تعداد آفات در تله‌های کارتی چسبناک انجام شد. درصد آلودگی بوته‌ها به تریپس در هر دو گلخانه تیمار (۶۲٪) و شاهد (۳۱٪) زیاد بود. آلودگی به سفیدبالک و مگس مینوز دیده شد ولی بخوبی توسط مگس شکارگر سنوزیا در هر دو گلخانه کنترل شدند. کنه‌های شکارگر نیز توسعه جمعیت کنه تارتن را در گلخانه تیمار متوقف کردند. عوامل بیولوژیک تا دمای میانگین روزانه ۲۵°C و رطوبت حداقل ۶۰-۵۰٪ کنترل قابل قبولی روی آفات داشتند و می‌توانند جایگزین مناسبی برای کنترل شیمیایی مرسوم باشند.

واژه‌های کلیدی: محصول سالم، شکارگر، پارازیتوئید، غیرشیمیایی، آفت، بیماری

The experience of integrated management of cucumber greenhouse pests based on biological control with indoor produced agents

S.ASGARI¹✉, S.FARROKHI², S.H.MALKESHI², S.NAEIMI², M.ARBABI³, S.SHAHROKHI⁴

1. *Corresponding Author : Assistant Prof. of Greenhouse Cultivation Research Dept., Tehran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Varamin, Iran; 2. Associated, Assistant and Associated Prof. of Biocontrol Research Dept., Prof. of Zoological Research Dept., and Associated Prof. of Sunn Pest Research Dept., Iranian Research Institute of Plant Protection, AREEO, Tehran, Iran

Abstract

In two metal structure cucumber greenhouses (each unit ~1300 m²) in Varamin region, an IPM program based on biological control (treatment) was compared with the conventional pest control method (control) during winter-spring cultivation season (2021-2022). In the treatment greenhouse, pests were controlled by augmenting hunter fly, *Coenosia attenuata*, population and releasing indoor produced biological control agents of 3 predatory mites species, *Neoseiulus californicus*, *Phytoseiulus persimilis*, *Amblyseius swirskii*. Moreover, air-borne and soil-borne diseases were managed with chemicals and bio-fungicides, respectively. Pest monitoring of two greenhouses was done every other week by 3 methods including a) observational survey and flagging the attacked plants, b) random sampling of 15 plants, and c) recording the number of pests on the sticky card traps. Percentage of plants infested with thrips was high in both treatment (62%) and control (31%) greenhouses. Leaf miners and whiteflies infestations were observed, but well controlled by predatory fly, *C. attenuata*, in both greenhouses. Predatory mites also stopped the development of spider mite population in the treatment greenhouse. Biological agents had an acceptable control on pests at average daily temperature up to 25°C and humidity of at least 50-60% and therefore, they can be a suitable alternative to conventional chemical control.

Keywords: Healthy product, predator, parasitoid, non-chemical, pest, disease

مقدمه

با هدف صرفه جویی در مصرف آب و بهره وری تولید در واحد سطح، استفاده از زمین‌های غیرقابل کشت، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، توسعه تولید و افزایش صادرات و کاهش هزینه‌ها، سطح کشت محصولات گلخانه‌ای کشور به سرعت در حال افزایش است. سطح زیرکشت سبزی و صیفی جات گلخانه‌ای کشور در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۲۷۷۷/۷ هکتار بوده و خیار گلخانه‌ای با سطح ۷۵۳۲/۲ هکتار و متوسط عملکرد ۲۵۵/۲ تن در هکتار (۲۵/۵ کیلو در مترمربع)، ۵۹٪ سطح گلخانه‌ها را به خود اختصاص داده است و استان تهران با ۲۵۰۱/۶ هکتار بیشترین سطح زیر کشت خیار گلخانه‌ای را در بین استانهای کشور دارد (Ahmadi et al. 2021). سالانه بیش از ۲ میلیون تن خیار گلخانه‌ای تولید می‌شود که فصل کشت آن برای حصول بیشترین سودآوری، عمدتاً زمستانه-بهاره می‌باشد. حداقل ۵ آفت مهم در گلخانه‌های خیار خسارت می‌زند، شامل شته‌ها، سفیدبالک‌ها، تریپس‌ها، مگس‌های مینوز و کنه‌ها که بیشترین فعالیت و بیشترین خسارت کمی و کیفی در این دوره بر روی محصول خیار گلخانه‌ای مربوط به کنه‌های تارتین است (Arbabi 2019). کنترل این آفات در بیشتر واحدهای تولیدی از جمله در استان تهران عمدتاً شیمیایی است که چون خیار مصرف تازه‌خوری دارد اثرات آن مستقیماً با سلامت مصرف کننده ارتباط دارد. بنابراین ضرورت تحقیق و بکارگیری روش‌های کم خطر، کارآمد، پایدار و اقتصادی به ویژه کنترل بیولوژیک، بیش از پیش مورد تاکید می‌باشد. کنترل بیولوژیک از سالمترین و کارآمدترین روشهای کنترل آفات می‌باشد. کارآمدی انواع شکارگرها و پارازیتوئیدهای آفات محصولات گلخانه‌ای وابسته به شرایط مناسب محیطی (میانگین دمای روزانه کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس و رطوبت بیش از ۵۰ درصد) است، در حالیکه مجهز نبودن گلخانه‌ها به سیستم‌های خنک کننده و

تامین کننده رطوبت کافی، عمدتاً در ماههای گرم بهار و تابستان (میانگین دمای بالای ۲۵ درجه سلسیوس و رطوبت کمتر از ۴۰ درصد) باعث محدودیت فعالیت عوامل مفید و کنه‌های شکارگر می‌باشد. از طرف دیگر بکارگیری آفت‌کش علیه آفات و بیماریهای خیار گلخانه‌ای از دیگر محدودیتهای بهره‌برداری از این عوامل مفید می‌باشد (Arbabi 2019).

تحقیقات متعددی در کاربرد عوامل بیولوژیک علیه آفات گلخانه در کشور انجام شده است (Shirazi et al. 2014, Farrokhi et al. 2013a,b, 2014, Arbabi & Arbabi 2007, Shahrokhi 2013 و Baniameri 2012) ولی به شکل یک بسته مدیریتی شامل تمام عوامل بیماری‌ها و آفات در یک دوره تولید نبوده است؛ تنها گزارش که به شکل بسته کامل مدیریت آفات در گلخانه خیار و گوجه‌فرنگی با عوامل بیولوژیک وارداتی (از شرکت هلندی کوپرت، Koppert) کار کرده‌اند مربوط به Farrokhi et al. (2013c) هست که عملکرد عوامل بیولوژیک را موفق ارزیابی کرده‌اند.

در این پروژه تلاش شد تا با مدیریت تلفیقی آفات، با محوریت کنترل بیولوژیک و بهره‌برداری از عوامل مفید، شامل قارچ‌کش‌های زیستی تجاری داخلی و دشمنان طبیعی ماکرو شامل شکارچیان و پارازیتوئیدهای آفات که توسط مجریان پروژه پرورش داده شدند، تولید محصول سالم در گلخانه‌های خیار بهره‌برداران منطقه جنوب استان تهران تجربه گردد.

مواد و روش‌ها

پرورش و تهیه عوامل بیولوژیک (تولید داخل)

عوامل بیولوژیک مورد نیاز طبق جدول ۱، توسط مجریان پروژه در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان تهران و موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور به میزان مورد نیاز پرورش داده و بهره‌برداری شدند؛ جمعیت طبیعی اولیه مگس شکارگر سنوزیا (*Coenosia attenuata* Stein) در هر دو گلخانه تیمار و شاهد حضور داشتند. برای تقویت جمعیت اولیه، در

گلخانه تیمار اقدام به تدارک توده‌های کمپوست گردید. از چند ماه دیو در فضای باز پوسیده شده بود، اوایل بهمن ماه کمپوست حاصل از پایان کار پرورش قارچ در ورامین که پس ۱۴۰۰ درون کیسه‌های بزرگ پلاستیک (به ابعاد حدود جدول ۱- دشمنان طبیعی آفات گلخانه خیار (Anon 2018) و موارد استفاده شده در این تحقیق*

Table 1. Natural enemies of cucumber greenhouse pests (Anon 2018) and those used in this research*

Biological agent (target pest)	Aim of release	Release amount (Number/m ²)	Replication	Release interval (day)	Considerations
<i>Eretmocerus eremicus</i> (Whiteflies)	Prevention	1½-3	-	7-14	-
	Light control	3-6	min. 3x	7	Releasing until the result
	Heavy control	9	min. 3x	7	Releasing until the result
<i>Encarsia Formosa</i> (Whiteflies)	Prevention	1½-3	-	7-14	-
	Light control	3-6	min. 3x	7	Releasing until the result
	Heavy control	9	min. 3x	7	Releasing until the result
<i>Amblyseius swirskii</i> * (Whiteflies & Thrips)	Prevention	20	1x	-	Only on sweet pepper
	Light control	50	1x	-	Start release when thrips or whitefly appear
	Heavy control	100	1x	-	Only in infected areas and always in combination with other agents
<i>Amblyseius californicus</i> * (Spider mite)	Prevention	2	-	21	-
	Light control	6	1x	-	-
	Heavy control	-	-	-	-
<i>Phytoseiulus persimilis</i> * (Spider mite)	Prevention	2	-	21	-
	Light control	6	1-2x	7	-
	Heavy control	20-50	2x	7	Only in infected areas
<i>Orius laevigatus</i> (Thrips)	Prevention	½	2x	14	Use only in crops that have pollen
	Light control	1	2x	14	-
	Heavy control	10	1x	-	Only in infected areas
<i>Aphidius colemani</i> (Aphids)	Prevention	0.15	-	7	-
	Light control	½	min. 3x	7	-
	Heavy control	½	min. 6x	3	-
<i>Coenosia attenuate</i> * (Whiteflies & Leaf miners)					Population increase by breeding on compost from the beginning of the growing season

اضافی ایجاد شده بود. بدین ترتیب جمعیت مگس‌های پوسیده‌خوار (قارچ خوار) میزبان ازدیاد شد و در پی آن جمعیت خود مگس شکارگر افزایش قابل توجهی داشت.

شکل ۱- کیسه‌های کمپوست برای تقویت جمعیت مگس شکارگر سنوزیا در گلخانه تیمار

Fig. 1. Compost bags for augmenting the population of the predatory fly, *C. attenuata*, in the treatment greenhouse

۶۰×۹۰ سانت) با حجم حدود ۴۰-۵۰ کیلو در هر کیسه پر کرده و برای حصول اطمینان از عدم آلودگی به عوامل ناخواسته، ۲ هفته در قرنطینه نگهداری شدند. با حصول اطمینان از عدم آلودگی، کیسه‌های کمپوست (جمعا ۳۶ کیسه) در محل‌های بلا مانع (در ردیف ستون‌های عمودی) در گلخانه تیمار چیده شدند (شکل ۱).

کمپوست با آبیاری مرتب در طی دوره تولید خیس نگه داشته شد و زیر کیسه‌ها چندین سوراخ برای خروج آب

The exterior view (above) and the main path dividing the control greenhouse into two equal parts (below).

در طی فصل سرد (زمستان و فروردین) یک لایه پوشش پلاستیک اضافی از داخل، جلوی دیوارهای جانبی و بالا در ارتفاع ۳ متری برای حفظ گرما و کاهش مصرف انرژی کشیده بودند (اصطلاحاً دوپوش کرده بودند). عملیات تولید (غیر از آفات و بیماریها) در دو گلخانه مشابه هم مدیریت می شدند. در گلخانه تیمار (مدیریت آفات با محوریت کنترل بیولوژیک) و در گلخانه شاهد (کنترل شیمیایی معمول کشاورز) اجرا شد.

اقدامات پیشگیری از آفات و بیماریها و کشت گلخانه‌ها

گلخانه‌ها در تابستان آفتابدهی شده و تا اواخر پاییز، برای کشت بهاره-زمستانه خالی مانده بودند. هر دو گلخانه تیمار و شاهد در ورودی دارای اتاقک ایزولاسیون پلاستیکی (دودره) و چاهک ضد عفونی بودند (شکل ۳).



شکل ۳- حوضچه ضد عفونی جلوی در ورودی (بالا) و

اتاقک پلاستیکی جلوی درب ورودی (پایین و راست)

Fig.3. Disinfection basin at the entrance (top) and plastic chamber in front of the entrance door (bottom and right)

هر دو گلخانه دارای پوشش توری (حدود ۴۰ مش) دو لایه در دیوارهای جانبی و یک لایه در دریچه‌های سقفی بودند. طی فصل سرد، پوشش پلاستیکی دریچه‌ها بسته بود و فقط دریچه‌های سقفی باز و بسته می شد. برای عدم انتقال آفات، کارگران مجموعه‌ها جدا بوده یا قبل از جابجایی بین گلخانه‌ها ساعاتی وقفه را رعایت می کردند. رشدی از علفهای هرز در محدوده اطراف گلخانه نبود ولی مزرعه کشت بهاره



انتخاب گلخانه (جامعه آماری)

گلخانه‌های فلزی قوسی با پوشش پلاستیک در مناطق ورامین و پیشوا عمومیت دارد؛ در منطقه جوادآباد ورامین، روستای محمدآباد عربها دو گلخانه فلزی حدود ۱۵۰۰ مترمربعی، مشابه هم، با ارتفاع تاج حدود ۶/۵-۶ متر، هر یک دارای ۴ تونل با عرض ۸ متر و طول ۴۵ متر در جهت شرقی- غربی، مربوط به یک کشاورز بودند. گلخانه شاهد نیمه غربی از گلخانه ۳۰۰۰ مترمربعی بود که با یک راهرو عریض، محل استقرار بخاری‌ها، از نیمه دیگر جدا می شد (شکل ۲) و گلخانه تیمار به وسعت تقریبی ۱۳۰۰ مترمربع کمی کوچکتر بود. گلخانه‌ها دارای دریچه‌های تهویه جانبی و سقفی (در طول هر تونل) و بدون سیستم خنک کننده، با سیستم گرمایش بخاری گازی فن دار با لوله‌های پلاستیکی هدایت کننده گرما در طول گلخانه و سیستم آبیاری قطره‌ای بودند.



شکل ۲- گلخانه‌های منتخب در سال دوم (۱۴۰۱-۱۴۰۰)؛

بالا- نمای بیرونی و پائین- راهرو بین دو نیمه‌ی گلخانه شاهد

Fig. 2. Selected greenhouses in the second year (2021-2022)

(TKO) برای تقویت گیاهان و افزایش مقاومت بوته‌ها به سفیدک دروغی خیار در دو نوبت در هر دو گلخانه شاهد و تیمار محلولپاشی شد (جدول ۲)

عملیات پایش آفات

در هر دو گلخانه، پایش آفات با ۳ روش زیر انجام شد (Parker et al. 2016 و Baniameri 2016):

الف- پایش مشاهده‌ای بوته‌ها

از زمان کشت گلخانه، با پایش‌های یک هفته در میان، بررسی چشمی برای مشاهده بوته‌های غیرطبیعی (زردی و رنگ پریدگی، کوتولگی، پیچش برگ و بوته، خشکیدگی و ... ناشی از آفات یا بیماریها) انجام می‌شد. در صورت مشاهده بوته آلوده، ضمن علت‌یابی و رفع آن، با بستن نوار رنگی به عنوان گیاه نشانگر علامتگذاری (پرچم زده) می‌شد تا در پایش بعدی وضعیت آن و بوته‌های اطرافش بررسی شود.

ب- پایش آفات با بازرسی بوته‌ها

با انتخاب تصادفی ۱۵ بوته از نقاط مختلف گلخانه، آلودگی آنها به آفات، شامل ۵ آفت مهم (سفیدبالک، تریپس، مینوز، کنه و شته) یا بیماری‌ها (بوته‌میری) ثبت می‌شد. برای این منظور تا مرحله حدود ۱۰ برگی بوته‌ها، کل بوته بررسی می‌شد ولی پس از آن، ۳ برگ از آن، ۳ ارتفاع شامل یک سوم بالایی، میانی و پائینی و ۲ گل هر بوته از نظر حضور و عدم حضور هر یک از آفات یاد شده (در هر مرحله رشدی) بررسی و ثبت می‌شد و درصد بوته‌های آلوده به هر نوع از آفات مذکور تعیین می‌گردید.

ج- پایش آفات با کارتهای زرد و آبی چسبناک

در هر دو گلخانه، کارتهای زرد و آبی چسبناک به ابعاد ۱۰×۲۰ سانت و به تعداد ۵ عدد از هر کدام (با نسبت ۱ کارت از هر رنگ در ۲۵۰-۲۰۰ مترمربع) جهت پایش وقوع و تغییرات جمعیت آفات نصب و شماره‌گذاری شد (شکل ۵).

بادمجان (دارای آفات مشابه محصول خیار گلخانه) در جوار گلخانه‌ها بود که می‌توانست به عنوان منبع آلودگی بهاره گلخانه‌ها اثر داشته باشد.

اواخر آذر ۱۴۰۰، در فضای خزانه، بذور خیار رقم ناگین (پوشش‌دار) درون سینی‌ها در بستر پیت ماوس کشت شدند و موقع انتقال نشاها به زمین اصلی (۱۴۰۰/۱۰/۱۹)، محلول ۲۰۰ گرم تریکوروئین (با ماده فعال قارچ *Trichoderma harzianum* Rifai، محصول شرکت زیست فن‌آور سبز با فرمولاسیون WP) با مقدار آب لازم تهیه و ریشه نشاها را گلخانه تیمار و به همین مقدار برای گلخانه شاهد محلول پاشی شدند. بعد از نشاکاری، این مقدار قارچ‌کش زیستی ماهانه و از طریق سیستم آبیاری پای بوته‌ها داده شد (حدود ۰/۰۴ گرم به ازای بوته معادل ۰/۱۶ گرم در مترمربع). در گلخانه تیمار، با مشاهده علائم بیماری از اوایل اسفند ۱۴۰۰، محلول قارچ‌کش یادشده هر دو هفته یکبار داده شد. همچنین، فرآورده روئین ۱ (محصول شرکت زیست فن‌آور سبز، حاوی باکتری *Bacillus subtilis*) یک هفته بعد از انتقال نشاء، یک بسته ۲۰۰ گرمی در ۱۰۰ لیتر آب (حدود ۰/۱۶ گرم در مترمربع) از طریق سیستم آبیاری به کار رفت و هر بار یک هفته بعد از مصرف تریکورودرما، تکرار شد (شکل ۴).



شکل ۴- محلول‌پاشی نشاها با قارچ‌کش‌های زیستی

تریکوروئین (قبل از کشت) و روئین ۱ (بعد از کشت)

Fig.4. Watering of seedlings with biological fungicide solutions, Trichorouein (before planting) and Rouein 1 (after planting)

در گلخانه شاهد، علاوه بر اینها، قارچ‌کش یونیفرم، ۲ در هزار، پای گیاهچه‌ها هم استفاده شد. کود فسفیت پتاسیم

بیشترین سطح آلودگی بود مورد ارزیابی (تخمین سطح آلوده برگ) قرار گرفت. برای هر برگ نمونه، بر اساس درصد سطح آلوده، شاخص شدت بیماری (DSI= Disease Severity Index) با اختصاص نمره ۷-۱ تعیین شد و میانگین شدت بیماری برای هر ردیف (۱۰ بوته) در هر نوبت ارزیابی مشخص گردید. بعد از کنترل بیماری، پایش تا زمان واگذاری مدیریت گلخانه تیمار به کشاورز (۱۴۰۱/۳/۱۸) ادامه یافت.

عملیات کنترل آفات و رهاسازی دشمنان طبیعی

با پایش جمعیت و مشاهده اولین آفات، دشمنان طبیعی آنها با نسبت توصیه شده از سوی سازمان حفظ نباتات (جدول ۱) (Anon 2018) برای پیشگیری و یا کنترل خفیف (درمان سبک) رهاسازی گردیدند و تکرار لازم نیز اقدام شد. ابتدا سفیدبالک (۱۴۰۱/۱/۴) مشاهده شد که به دلیل جمعیت بالای مگس شکارگر سنوزیا *C. attenuata*، نیاز به رهاسازی زنبورهای پارازیتوئید نبود و جمعیت آفت افزایش نیافت (شکل ۶).



شکل ۶- مگس شکارگر سنوزیا در حال شکار سفیدبالک بالغ
Fig. 6. Hunter fly, *C. attenuata*, preying on adult whitefly

سپس تریپس دیده شد (۱۴۰۱/۱/۹) که با تامین کنه شکارگر سورسکی لازم، رهاسازی (۱۴۰۱/۲/۱۱) در گلخانه تیمار انجام شد که مصادف با مشاهده کنه تارتن نیز بود. سری اول حدود ۴۵-۵۰ هزار (در حد کنترل سبک) و در سری دوم (۱۴۰۱/۳/۹) نیز همین تعداد کنه سورسکی رهاسازی گردید (شکل ۷).



شکل ۵- نصب کارتهای زرد و آبی چسبناک در گلخانهها

Fig. 5. Installing sticky yellow and blue cards in greenhouses. روی کارتهای چسبناک نیز تعداد آفات بالغ پروازی چسبیده شامل شته، تریپس، سفیدبالک و مگس مینوز و نیز مگس شکارگر سنوزیا و میزبان آن یعنی مگسهای پوسیدهخوار شمارش و ثبت می شدند؛ تا زمانی که کارت بعلت جمعیت زیاد افراد شکار شده و سخت شدن شمارش یا عدم کارآیی تعویض شود. نصب کارتها و پایش ۲ هفته یکبار آنها، از زمان نشا بوته در هر دو گلخانه شروع شد و تا بعد از پایان اقدامات کنترل (۱۴۰۱/۳/۱۸) بصورت مرتب ادامه یافت.

پایش و نمونه برداری بیماریها

پس از نشاکاری، با پایش دوره‌ای، وقوع بیماری بوته‌میری در دو گلخانه تیمار و شاهد رصد و به شکل تجمیعی ثبت شد و سپس درصد وقوع بیماری^۱ تعیین گردید. در گلخانه تیمار علاوه بر بیماریهای خاکزاد، بیماریهای هوازاد نیز مدیریت شد. بوته‌میری و سفیدک داخلی خیلی کم بود ولی سفیدک سطحی در هر دو گلخانه با شدت بالا دیده شد که زمان وقوع و تیمارهای اعمال شده در دو گلخانه متفاوت بود (جدول ۲). در هر گلخانه چهار ردیف و از هر ردیف ۱۰ بوته به صورت تصادفی انتخاب و علامت‌گذاری شدند. ارزیابی در دو گلخانه، در سه نوبت انجام شد:

۱- قبل از سمپاشی گلخانه تیمار (۱۴۰۱/۱/۲۷)، ۲- سه روز بعد از سمپاشی اول گلخانه تیمار (۱۴۰۱/۲/۹) و ۳- سه روز بعد از سمپاشی دوم گلخانه تیمار (۱۴۰۱/۲/۲۵). در هر بوته شماره‌گذاری شده، برگ واقع در ثلث بالایی بوته که واجد

¹ Disease incidence

بوته‌های بیمار (بوته میری) در طول دوره تولید بود. بر این اساس درصد بوته‌های آلوده به هر آفت و درصد وقوع بیماری در هر یک از گلخانه‌ها تعیین شد. این داده‌ها، بین گلخانه‌های تیمار (کنترل بیولوژیک) و شاهد (کنترل شیمیایی بهره‌بردار) با هم مقایسه و اثرات دو روش در کنترل جمعیت آفات و بیماریها تحلیل شدند. برای رسم نمودارها از برنامه Excel استفاده شد.

برای تفسیر نقش تیمارها در ممانعت از گسترش بیماری سفیدک سطحی، سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری^۲ (AUDPC) با استفاده از میانگین شدت بیماری طبق فرمول (Campbell and Madden 1990) به صورت زیر محاسبه شد:

$$AUDPC = \sum_{i=1}^{n-1} \left(\frac{y_i + y_{i+1}}{2} \right) (t_{i+1} - t_i)$$

در این فرمول n تعداد دفعات ارزیابی، i نوبت ارزیابی، y_i و t_i به ترتیب میانگین شدت بیماری و زمان در ارزیابی قبلی، y_{i+1} و t_{i+1} به ترتیب میانگین شدت بیماری و زمان در ارزیابی حاضر هستند. مقایسه دو روش کنترل سفیدک سطحی خیار در دو گلخانه تیمار و شاهد، با مقایسه شدت بیماری و سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری در دو گلخانه، تفسیر شد.

نتایج

پایش تغییرات جمعیت آفات

۱- پایش جمعیت آفات با بازرسی بوته‌ها

به دلیل سردی محیط بیرون در زمان انتقال نشاء به گلخانه و پس از آن، آفتی از بیرون نفوذ نکرد و بوته‌ها تا مدت‌ها بدون آلودگی رشد داشتند. تغییرات دمای گلخانه‌های تیمار و شاهد در طول فصل کشت در نمودار ۱ آمده است.

مشاهدات و اقدامات در هر دو گلخانه تیمار و شاهد در جدول ۲ آورده شده است. با توجه به نظارت کارشناسی اقدامات تولید نظیر مدیریت دما و تهویه، خاک‌دهی پای بوته، کوددهی و تقویت بوته‌ها و سایر رسیدگی‌ها بهتر از گلخانه-های معمول منطقه بود. همچنین چون فعال کردن گلخانه اصلی و انتقال نشاء در فصل سرد (دی ماه) صورت گرفت و



شکل ۷- رهاسازی کنه سورسکی علیه تریپس و کنه تارتن
Fig. 7. Releasing the *A. swirskii*, against thrips and spider mite.

برای کنه تارتن هم به دلیل کافی نبودن جمعیت کلنی کنه‌های شکارگر (در حد کنترل سبک)، چند بار سمپاشی با آفتکش-های گیاهی (کم‌خطر) شامل پست اوت (۱ در هزار) دو نوبت متوالی، ماریاپرو-ام (۲ در هزار + ۰/۵ در هزار کاورینو) و کنه‌کش اس کوئینوسیل (کنه مایت) (۱ در هزار) یک نوبت، تا اوایل خرداد انجام گرفت. با تامین نسبی کلنی کنه‌های شکارگر، رهاسازی آنها در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹ حدود ۵۰۰۰ عدد از کنه کالیفرنیکوس (*Neoseiulus californicus* McGregor) و ۱۵۰۰ عدد کنه پرسیمیلیس (*Phytoseiulus persimilis* Athias-Henriot) (در حد کنترل سبک) (در محدوده‌های داغ آلودگی کنه تارتن) در ۱۲۰۰ مترمربع گلخانه تیمار انجام شد. آفت مگس مینوز نیز در زمان شروع آلودگی به دلیل جمعیت تقویت شده مگس شکارگر سنوزیا در گلخانه تیمار و فراوانی آن (در هر دو گلخانه)، کنترل شد و اقدام دیگری صورت نگرفت. شته در هر دو گلخانه آلودگی ایجاد کرد که به دلیل از بین رفتن کلنی پرورشی زنبورهای پارازیتوئید (*Aphidius colemani* Viereck)، سمپاشی با صابون حشره کش پالیزین و بدنبال عدم کسب نتیجه کافی با حشره کش چس (کم‌خطر برای سایر دشمنان طبیعی) جهت کنترل آفت اقدام گردید.

ثبت و تحلیل داده‌ها:

ثبت داده شامل، تعداد بوته‌های آلوده به هر آفت از ۱۵ بوته نمونه‌برداری شده، آمار فراوانی آفات (۴ آفت پروازی) بر روی کارتهای چسبناک زرد و آبی در هر بار پایش و فراوانی

² Area Under the Disease Progress Curve

گلخانه تیمار لکه آلوده به کنه، ۱۴۰۱/۲/۱۱ در سمت دیواره شمالی مشاهده شد که نشانگر ورود از بین توری و از بیرون گلخانه بود که با توجه به عدم وجود ذخیره کافی از کنه شکارگر پرسیمیلیس و کالیفرنیکوس در این تاریخ، استفاده از آنها در گلخانه تیمار مقدور نگردید ولی رهاسازی کنه سورسکی (۱۴۰۱/۲/۱۲) تا حدودی در مهار کنه تارتن تاثیر داشت.



نیز به دلیل رعایت بیشتر مسایل پیشگیری آفات و بیماریها، تاریخ شروع آلودگی به آفات با تاخیر نسبت به گلخانه‌های منطقه و از اوایل سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد و شدت آنها هم کمتر بود. اولین کنه‌های تارتن ۵ اسفند ۱۴۰۰ بصورت موردی در گلخانه شاهد دیده شد (کنه زمستانگذران در خاک گلخانه) که از اواسط اسفند با آفتکش آبامکتین ۲ هفته یکبار کنترل شد و با کنه‌کش‌های کم خطر ادامه یافت (جدول ۲)؛ ولی در

جدول ۲- مشاهدات و عملیات انجام شده در گلخانه‌های تیمار و شاهد (سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰)

Table 2. Observations and operations carried out in the treatment and control greenhouses (2021-2022).

Application	Treatment greenhouse (biological control)	Control Greenhouse (chemical control)
Soil solarization	July-August	July-August
Seed planting in the treasury (Nagin cultivar)	19-12-2021	19-12-2021
Transplanting into the greenhouse	9-1-2022	9-1-2022
Before transplanting: Spraying trichoderma (Tricho Rouein) (200 gr/100 liter) on the seedlings allocated for 1000 m ² greenhouse area, After transplanting: 200 gr/100 lit through irrigation system	9-1-2022 (Before transplanting application and after transplanting as monthly repetition through irrigation system and due to observed infected cases, two times per month from late February to the end of diseases)	9-1-2022 (Before transplanting application and after transplanting as monthly repetition through irrigation system and due to observed infected cases, two times per month from late February to the end of diseases)
Using <i>Bacillus subtilis</i> (Rouein 1)(200 gr/100 lit) through drip irrigation	19-1-2022 (Monthly repetition through irrigation system)(two times per month from late February to the end of diseases)	19-1-2022 (Monthly repetition through irrigation system)(two times per month from late February to the end of diseases)
Installation of yellow and blue cards and min-max thermometer	11-1-2022	11-1-2022
Start monitoring trap cards and plants (once every two weeks)	25-1-2022	25-1-2022
Soiling the feet of the plants	5-2-2022	5-2-2022
Spraying potassium phosphite (TKO) fertilizer to strengthen the plant against powdery and downy mildews	2-3-2022 (replicated 16-3-2022, 30-3-2022)	2-3-2022 (replicated 16-3-2022, 30-3-2022)
Picking the compost bags in the greenhouse to population enhancement of hunter fly, <i>Coenosia</i> sp.	13-2-2022	-
The first observation of plant infection by soil borne diseases	15-2-2022 (Spraying Tricho Rouein & Rouein 1 from Feb. 20- two times per month)	15-2-2022 (Spraying Tricho Rouein & Rouein 1 on Feb. 20, spraying fungicide Uniform 1-3-2022)
The first observation of plant infection by powdery mildew	24-3-2022 (Spraying phosphite 30-3-2022, spraying fungicide Caliban 26-4-2022 , 12-5-2022)	22-2-2022 (Spraying fungicide Diforobin (OrtivaTop) 2-3-2022, spraying phosphite 16-3-2022, 30-3-2022, spraying fungicide Domark 19-4-2022)
The first observation of plant infection by downy mildew	29-3-2022 (Spraying phosphite 30-3-2022)	15-2-2022 (Spraying phosphite 2&16&30-3-2022, spraying fungicide Infinito 14-4-2022)
The first observation of infestation by spider mite, <i>Tetranychus urticae</i>	1-5-2022 (<i>A. swirskii</i> mite release specially on hot spots 2&30-5-2022, spraying acaricide (Pest Out) 14&17-5-2022, spraying water 26-5-2022 and acaricide (Kanemite) in the next day, spraying acaricide (Danisaraba) 28-5-2022, predator release (<i>P. pesimilis</i> n=1500)&(<i>N. californicus</i> n=5000) on hot spots 30-5-2022, In the next, pest management left to	24-2-2022 (seen in small number but in large number in late April, spraying acaricide (Abamectin) from early March (biweekly) and late April (weekly), spraying acaricide (Pest Out) 14&17-5-2022, spraying water 26-5-2022 and acaricide (Kanemite) in the next day, spraying acaricide (Danisaraba) 28-5-2022, spraying acaricide (Nissorun+Oil)

	the grower 8-6-2022)	5-6-2022)
The first observation of infestation by whiteflies	24-3-2022 (control by hunter fly, <i>Coenosia</i> sp.)	24-3-2022 (control by hunter fly, <i>Coenosia</i> sp.)
The first observation of infestation by thrips	29-3-2022 (<i>A. swirskii</i> mite release n=45000-50000 1&2-5-2022 and repeat in the same number 30-5-2022)	29-3-2022 (spraying insecticide (Decis) 4-4-2022 and repetition biweekly until pest control)
The first observation of infestation by leaf miners	29-3-2022 (control by hunter fly, <i>Coenosia</i> sp.)	27-4-2022 (control by hunter fly, <i>Coenosia</i> sp.)
The first observation of infestation by aphids	25-4-2022 (spot spraying insecticide (Palizin) 30-4-2022, spraying insecticide (Chess) 5-5-2022)	25-4-2022 (spraying insecticide (Chess) 5-5-2022)




نمودار ۱- تغییرات دمای گلخانه‌های تیمار و شاهد ۱۴۰۱-۱۴۰۰

Chart 1. Temperature changes in the treatment and control greenhouses (2021-2022).

طبق نمودار ۲، آفات کنه و تریپس در گلخانه تیمار مهمتر بودند در صورتی که در گلخانه شاهد فقط تریپس کمی خودنمایی کرد. تریپس در گلخانه تیمار، از زمان مشاهده (۱۴۰۱/۱/۹) روی کارتهای چسبناک) و رهاسازی کنه شکارگر سورسکی (۱۴۰۱/۲/۱۲) هنوز روی بوته‌های نمونه‌برداری دیده نشده بود؛ ولی از ۱۴۰۱/۲/۲۱ (عمدتاً در روی گلها) مشاهده شد (گونه تریپس گل غربی) که بالای ۳۰٪ بوته‌ها را آلوده کرده بود و کنه شکارگر سورسکی بویژه با پیشرفت فصل و روند افزایشی دما، تاثیر کاهشی قابل قبولی در کنترل جمعیت آن نداشت و در نهایت به آلودگی حدود ۹۰٪ بوته‌ها (۱۴۰۱/۳/۱۸) منجر شد؛ بنابراین جهت کنترل بیولوژیک این آفت باید از عوامل مفید کمکی دیگر نیز استفاده کرد. آفات مگس مینوز و سفیدبالک در نتیجه حضور جمعیت تقویت شده و تراکم بالای مگس‌های شکارگر سنوزیا در زمان ظهور

با افزایش میانگین دما و شدت گرفتن فعالیت آفت، سمپاشی با آفت‌کش‌های گیاهی، ابتدا بصورت لکه‌ای و سپس سراسری در چندین نوبت استفاده شد (جدول ۲). آفت‌کش‌های گیاهی هر چند روی دشمنان طبیعی کم‌خطر هستند ولی به اندازه کنه‌کش‌های شیمیایی مصرفی در گلخانه شاهد، تاثیر قاطعی نداشتند. بعد از مدتی کنترل با کنه‌کش‌های گیاهی، زمانی که میانگین جمعیت کنه فعال به ازای برگ به کمتر از ۵ عدد رسید، رهاسازی همزمان کنه‌های شکارگر یاد شده (پرسیمیلیس حدود ۱۵۰۰ و کالیفرنیکوس ۵۰۰۰ عدد) در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹، توسعه جمعیت کنه تارتن را متوقف کرد (نمودار ۲) ولی گرمای فزاینده گلخانه‌ها و رطوبت کم (حدود ۳۰-۴۰٪) مانع فعالیت کارآمد آنها بود. در این شرایط جمعیت تریپس نیز رو به افزایش بود، بنابراین از ۱۸ خرداد ادامه کنترل آفات به گلخانه‌دار سپرده شد.



نمودار ۲- میانگین درصد بوته‌های خیار آلوده به آفات در گلخانه‌های تیمار و شاهد (۱۴۰۰-۱۴۰۱)



Chart 2. Average percentage of cucumber plants infested with pests in the treatment and control greenhouses (2021-2022)

تنها آفت قابل ملاحظه روی کارتهای زرد، تریپس با جمعیت کم می‌باشد. مشاهده تریپس در گلخانه تیمار (۱۴۰۱/۱/۹) با آلودگی بوته‌ها به سفیدک سطحی همزمان بود، بنابراین پس از مدتی انتظار برای کنترل بیماری، رهاسازی کنه شکارگر سورسکی (۱۴۰۱/۲/۱۰) انجام شد؛ پس از آن جمعیت تریپس روی کارت زرد (که بیشتر به تریپس پیاز *Thrips tabaci* نسبت داده می‌شود) کاهش داشت در صورتی که در گلخانه شاهد این رشد جمعیت ادامه یافت (نمودار ۳).

این آفات، بخوبی کنترل شدند و نتوانستند به آلودگی تا ۲۰٪ بوته‌ها برسند (نمودار ۲). البته کنه سورسکی هم در کنترل سفیدبالک نقش مهمی داشت. شته نیز در هر دو گلخانه با یک سمپاشی کنترل شد و ادامه نیافت.

۲- پایش جمعیت آفات با کارتهای تله چسبناک

در نمودار ۳، وضعیت فراوانی جمعیت آفات پروازی شکار شده روی تله‌های کارتی چسبناک زرد در گلخانه‌های تیمار و شاهد مشاهده می‌شود. طبق نمودار، در هر دو گلخانه،



نمودار ۳- تعداد آفات روی کارتهای زرد چسبناک در گلخانه‌های تیمار و شاهد (۱۴۰۰-۱۴۰۱)

Chart 3. Number of pests on the yellow sticky cards in the treatment and control greenhouses (2021-2022)


افزایش جمعیت تریپس طبق آخرین نمونه‌برداری از بوته (تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۸) تا آلودگی بیش از ۹۰٪ بوته‌ها رسید. سفیدبالک به تعداد خیلی اندک در گلخانه تیمار و حدود یکماه بعد به تعداد ناچیزی در گلخانه شاهد دیده شد که به دلیل جمعیت بالای مگس شکارگر سنوزیا (در هر دو گلخانه)

پس از رهاسازی کنه شکارگر سورسکی در گلخانه تیمار، جمعیت تریپس (گل غربی) کاهش یافت ولی بدنبال سمپاشی با کالیبان (۱۴۰۱/۲/۲۲) علیه سفیدک سطحی، در پایش بعدی کمی افزایش یافت که موجب ایجاد شبهه در بروز اثرات منفی آن بر جمعیت کنه شکارگر می‌باشد که قابل بررسی است.




بدنبال استقرار کیسه های کمپوست در گلخانه تیمار، برای تقویت جمعیت مگس شکارگر سنوزیا، جمعیت آن افزایش خوبی داشت (نمودار ۴). جذب این مگس ها به کارتهای زرد خیلی بیشتر از کارتهای آبی بود (شکل ۸)؛ بنابراین توصیه می گردد که از کارتهای تله چسبناک (به ویژه کارتهای زرد) شکل ۸- تفاوت شکار مگس سنوزیا در تله های کارت زرد و آبی در یک گلخانه

Figure 8. The difference between catching the *C. attenuata* in yellow and blue cards in a greenhouse



جمعیت آن پا نگرفت (نمودار ۳). آلودگی شته در گلخانه تیمار (وقوع ۱۴۰۱/۲/۵) با حشره کش پالیزین کنترل کافی ایجاد نکرد و در پایش ۳-۴ روز بعد از سمپاشی، آفت فعال بود، بنابراین از حشره کش پی متروزین یا چس (کم خطر برای دشمنان طبیعی) استفاده شد که موثر بود و آفت کنترل شد. پایش تغییرات جمعیت مگس شکارگر سنوزیا در کارتهای تله



نمودار ۵- تعداد مگس سنوزیا و مگس های پوسیده خوار میزبان آن در کارتهای تله در گلخانه های تیمار و شاهد (۱۴۰۱-۱۴۰۰)
Chart 5. Number of *C. attenuata* and its hosts, fungus gnats, on sticky cards in the treatment and control greenhouses (2021-2022)

مگس های شکارگر برای تجمع بیشتر در سمت غربی گلخانه-ها (تیمار و شاهد) داشتند و چون نیمه غربی گلخانه یکپارچه ۳۰۰۰ متری به عنوان شاهد بهره برداری شد می تواند دلیلی بر فراوانی آن باشد؛ البته میزان مصرف (کم) و نوع آفتکشها (کم خطر برای شکارگر) نیز می تواند دلیل آن بوده باشد. بهرحال در گلخانه شاهد هم دو آفت یاد شده پا نگرفتند.
پایش آلودگی بوته ها به بیماریها
بهمن ماه ۱۴۰۰ در ابتدای دوره تولید در هر دو گلخانه،

در حداقل تعداد ضروری (۱ عدد در ۲۵۰-۲۰۰ مترمربع) و فقط برای پایش استفاده گردد.
فراوانی بالای جمعیت این مگس شکارگر قبل از وقوع آفات، کنترل خوبی روی مگس مینوز و سفیدبالک های مشاهده شده در گلخانه تیمار ایجاد کرد به نحوی که جمعیت آنها رشد نیافت و اقدام کنترلی دیگری علیه آنها نیاز نشد (نمودار ۳). البته جمعیت مگس شکارگر در گلخانه شاهد نیز بالا بود (نمودار ۴) که علت مهم آن شاید مربوط به تمایلی بود که

چند بوته علائم پوسیدگی ریشه و طوقه نشان دادند که پس از کشت نمونه‌های آلوده، عامل بیماری *Fusarium oxysporum* تشخیص داده شد. در ادامه و زمان چند برگ‌ها، علائم لکه‌برگی در تعدادی از بوته‌ها در هر دو گلخانه مشاهده شد. پس از برداشت نمونه‌های برگ آلوده، عامل بیماری (*Phytophthora infestans*) جداسازی و تشخیص داده شد. با اینحال، بر اساس بازدیدهای دوره‌ای و مستمر، در گلخانه تیمار و شاهد، بیماری‌های خاکزاد خیار (شامل پوسیدگی‌های ریشه و طوقه و بوته‌میری) به جز موارد پراکنده و محدود به چند بوته، مشاهده نشد.

اولین وقوع سفیدک سطحی ۱۴۰۰/۱۲/۴ و سفیدک داخلی ۱۴۰۰/۱۲/۹ در گلخانه شاهد حدود یک ماه زودتر از گلخانه تیمار اتفاق افتاد. همچنین، سفیدک داخلی خیار در گلخانه تیمار بصورت ناچیز و پراکنده مشاهده شد حال آن که این بیماری با درصد وقوع و شدت زیاد در گلخانه شاهد وجود داشت. بزرگترین مشکل بیماری‌شناسی در گلخانه تیمار، سفیدک سطحی (پودری) بود که مدیریت آن کاملاً ضروری به نظر می‌رسید. البته این بیماری در گلخانه شاهد هم به همان نسبت وجود داشت که بعد از سفیدک دروغی، چالش اصلی بیماری‌شناسی بود. پس از مشاهده لکه‌های اولیه سفیدک پودری در گلخانه تیمار (۱۴۰۱/۱/۴) (که ابتدا در برگ‌های مسن پایینی دیده شد) از ترکیب کالیبان استفاده شد تا از گسترش بیماری در گلخانه به خصوص به سمت برگ‌های جوان بالایی جلوگیری بعمل آید. میانگین شاخص شدت بیماری سفیدک سطحی در سه زمان ارزیابی، در گلخانه تیمار به ترتیب ۰/۴، ۱/۵ و ۰/۴ و در گلخانه شاهد هم به ترتیب ۰/۸، ۱/۵ و ۰/۳ بود که اختلاف قابل توجهی با هم نداشتند. مقادیر سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (AUDPC) نیز برای گلخانه تیمار و شاهد به ترتیب ۳۶/۹۵ و ۴۲/۱۲ درصد تقریباً متفاوت نبودند.

بحث

طبق نتایج بدست آمده و مطابق با یافته‌های Asgari et al. (2023)، با تجهیز گلخانه‌ها و انجام عملیات خوب کشاورزی (GAP)، کنترل بیولوژیک آفات و بیماری‌ها و تولید محصولات سالم دست یافتنی است؛ ولی در اکثر گلخانه‌های غیرمجهز فعلی این مهم فقط زمانی که دمای میانگین زیر ۲۵°C و رطوبت بالای ۶۰-۵۰٪ تامین باشد، مقدور خواهد بود. این شرایط هم برای آفات و هم برای دشمنان طبیعی مطلوبیت دارد و در این شرایط عوامل بیولوژیک در گلخانه تیمار می‌توانند بخوبی آفات را کنترل کنند و تقریباً نیاز به کنترل شیمیایی نیست در صورتی که در گلخانه‌ی شاهد آفتکش‌ها مدام استفاده می‌شوند. همانطور که در این تحقیق دیده شد تا اواخر اردیبهشت که شرایط فوق برقرار بود در گلخانه تیمار آلودگی بوته‌ها به تریپس زیر ۰/۴٪ و به کنه زیر ۱۰٪ توسط کنه شکارگر سورسکی حفظ شده بود ولی با افزایش دما و کاهش رطوبت از کارایی شکارگر کاسته شده و آلودگی‌ها افزایش یافت.

نشأها در خزانه تهیه شده و زمانی که سرمای بیرون فعالیت آفات را متوقف کرده بود گلخانه اصلی راه‌اندازی شده و نشأها منتقل شدند. بنابراین تاریخ کشت در گلخانه اصلی باید طوری منظور شود که دمای بیرون بقدر کافی سرد شده باشد (تقریباً زیر ۱۰°C) که حشرات غیرفعال و غیرپروازی باشند و به گلخانه‌ها ورود نکنند. علاوه بر ملاحظه تاریخ کاشت، رعایت برخی مسایل پیشگیری باعث شد که وقوع آفات خیلی به تاخیر بیافتد. مدیریت دما و رطوبت گلخانه در دوره سرد محیط بیرون، در بروز و شدت بیماری‌های هوزاد شامل انواع سفیدک‌های پودری و دروغی موثر بودند. طوری که در اواخر سال و اوایل سال بعد در شرایط دمایی زیر ۲۵°C، تهویه ناکافی (بخاطر سرمای محیط بیرون گلخانه) و رطوبت بالا مشکلات بیماری‌های هوزاد شایع بود که کنترل آنها گاهی با کاربرد عوامل بیولوژیک تداخل داشت؛ مثلاً کنه شکارگر سورسکی، *A. swirskii* برای کنترل تریپس‌ها رهاسازی شده بود ولی تاثیر قارچکش‌ها، بویژه با خاصیت

کنه‌کشی، روی آنها نامعلوم بود. بطورکلی اثرات آفتکش‌ها (کنه‌کش‌ها و قارچ‌کش‌ها)، مواد کودی پاششی و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاه بر عوامل بیولوژیک، به دلیل همپوشانی زمان مصرف آنها، قابل بررسی است.

در ماه‌های گرم دوره تولید، با افزایش دما و خشکی هوا، گلخانه‌دار در ساعات گرم روز برای حفظ رطوبت گلخانه، دریچه‌ها را کم باز می‌کرد و گرمای زیاد و رطوبت پائین، علاوه بر محدود کردن فعالیت دشمنان طبیعی و حتی برخی آفات، موجب طغیان جمعیت کنه تارتن می‌شد و نیاز به کنترل‌های متعدد شیمیایی داشت. در صورت تجهیز گلخانه به سیستم پد و فن و رطوبت ساز، امکان تنظیم دما و تامین رطوبت وجود دارد و می‌توان هم از تراکم کنه تارتن کاست و هم از دشمنان طبیعی، از جمله کنه‌های شکارگر، بهره برد. توصیه شده که کنه‌کش‌های گیاهی زمانی که جمعیت ۵ کنه در سطح زیرین ۳۰٪ از برگ‌ها مشاهده شد استفاده گردد و برای جلوگیری از مقاومت آفت، بصورت چرخشی و با فاصله حداقل ۱۰ روز بکار روند طوری که هر کنه‌کش حداقل ۳ ماه یکبار استفاده شود (Arbabi & Imami 2020). در مطالعه ما نیز به همین صورت بکار رفتند. اما کنه‌کش‌های گیاهی، بویژه با گرم‌تر شدن گلخانه، به تنهایی کنترل کافی کنه تارتن ایجاد نکرد؛ بنابراین مصرف این ترکیبات در برنامه مدیریت آفات و در کنار روش کنترل بیولوژیک قابل توصیه است، وگرنه باید از کنه‌کش‌های موثرتر استفاده کرد.

آلودگی تریپس ابتدا در کارتهای چسبناک مشاهده شد و زمانی که دمای میانگین حدود 20°C بود شکار کارتهای زرد (با غالبیت تریپس پیاز) بیشتر بود و با افزایش میانگین دما به 25°C شکار کارتهای آبی (با غالبیت تریپس غربی گل) بیشتر شد که با مطالعات Naderi & Poorjavad (2021) همخوانی داشت؛ طبق گزارش آنها افزایش دما باعث افزایش جمعیت تریپس غربی گل می‌شود طوری که نرخ ذاتی افزایش جمعیت و نرخ خالص تولید مثل تریپس پیاز در دمای ثابت 25°C بیشتر از تریپس غربی گل بوده ولی در دمای 27°C این

شاخص‌ها برای تریپس غربی گل بیشتر است. همچنین تریپس پیاز به دلیل رقابت درون گونه‌ای، در رقابت بین گونه‌ای با تریپس غربی گل مغلوب می‌گردد. کنه شکارگر سورسکی از پوره‌های سن اول و کمی سن دوم تریپس تغذیه می‌کند و چند هفته طول می‌کشد تا اثر آن دیده شود و بعید است بتواند به طور کامل جمعیت تریپس (غربی گل) را کنترل کند (Rezaii 2021) که نتایج ما هم این موضوع را نشان داد بطوری که استفاده از یک عامل کمکی (مثل سن شکارگر اوریوس *Orius sp.*) برای کنترل بهتر تریپس قابل توصیه بود.

با استقرار بسترهای کمپوست مرطوب، جمعیت سنوزیا از اوایل دوره تولید تقویت شد که موجب کنترل مطلوب روی مگس مینوز و سفیدبالک شد طوری که هیچ کنترل دیگری نیاز نبود. در ضمن این شکارگر دماهای بالا را نیز بهتر از بقیه عوامل بیولوژیک تحمل کرده و فعال بود؛ بنابراین باید علاوه بر تقویت جمعیت این شکارگر، با محدود کردن و دقت در سمپاشی‌ها در جهت حفظ و حمایت آنها اقدام نمود. شبیه این نتایج، Shirazi et al. (2014) هم با تقویت جمعیت سنوزیا، در کنترل مگس مینوز خیار گلخانه تجربه موفق داشتند.

در هر دو گلخانه بیماریهای خاکزاد نیز بخوبی با عوامل بیولوژیک (تریکودرما) کنترل شدند. کنترل بیولوژیک انواع قارچ‌های خاکزاد توسط گونه‌های مختلف قارچ تریکودرما در مطالعات متعددی موفقیت آمیز گزارش شده است، مثلاً Khani et al. (2016) جدایه‌های مختلف ۳ گونه قارچ تریکودرما را در کنترل فیتوفتورا، عامل بوته‌میری خیار گلخانه، موثر اعلام کرده و روش تیمار بذر را در مقایسه با تیمار خاک در کاهش بیماری مؤثرتر گزارش کردند.

بر اساس نتایج، می‌توان گفت که در صورت تجهیز گلخانه‌ها و رعایت اصول پیشگیری آفات و بیماریها و با پایش مناسب آنها، مدیریت تلفیقی بر پایه بیولوژیک در گلخانه خیار کاملاً دست یافتنی است. امید می‌رود که ضمن حمایت گلخانه‌داران برای تجهیز گلخانه‌ها و ترویج و تشویق تولید محصول سالم، برای محصولات ناسالم با باقیمانده‌های

اکبر حسنی، محسن سیلِسپور (محققان و کارشناسان محترم مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران) و آقایان عزیز شیخی گرجان، رسول مرزبان، مجتبی خانی، محمدرضا شصتی و مسعود گلبنی (محققان و کارشناسان محترم موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور) بسیار قدردانی می‌نمایند.

References

- AHMADI, K., F. HATAMI, R. HOSSEINPOUR, H. ABD SHAH and H. EBADZADEH, 2021. Agricultural statistics of 2020: horticultural products (3). Information and Communication Technology Center of the Ministry of Jihad-e- Agriculture (in Persian).
- ANON, 2018. Project guidelines for developing the use of biological control agents in the integrated pest management of greenhouse crops of the country. Development group for the use of biological agents, Plant Protection Organization. 51 pp. (in Persian).
- ARBABI, M., M. S. IMAMI. 2020. Greenhouse cucumber spider mite management. Iranian Research Institute of Plant Protection. 11 pp. (in Persian with English summary).
- ARBABI, M. 2019. Review of effectiveness and use of *Phytoseiulus persimilis* A.H. in three decades in Iran. *Biocontrol in Plant Protection*, 7(1): 111-126 (in Persian with English summary).
- ARBABI, M. and V. BANIAMERI, 2012. Evaluation of methods & releasing time of predatory mites to control greenhouse cucumber spider mite in Tehran province. Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). 19 pp. (in Persian with English summary).
- ARBABI, M. 2007. Study on effectiveness of *Phytoseiulus persimilis* in control of cucumber two spotted spider mite (*Tetranychus urticae* complex) in woody and iron greenhouse structures in Varamine region. *Pajouhesh & Sazandegi*, No.73: 96-104 (in Persian with English summary).
- ASGARI, S., S. FARROKHI, S. H. MALKESHI, S. NAEIMI, M. ARBABI, S. SHAHROKHI, 2023. Integrated management of cucumber greenhouse pests based on using domestically produced biological control agents. Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), 74 pp. (in Persian with English summary).
- BANIAMERI, V., 2016. Integrated management of greenhouse cucumber pests based on biological control. *Greenhouse, scientific and news encyclopedia* (in Persian). Retrieved 2024 from: <http://www.golkhaneh.net/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AE%D8%B3>
- CAMPBELL, C.L. and L.V. MADDEN, 1990. Introduction to Plant Disease Epidemiology. John Wiley & Sons, New York. 532 pp.
- FARROKHI, S., M. J. ARDEH, S. ASGARI, M. HADAEGH, A. A. AKBARI, M. ARBABI, J. J. RODENRIJS, 2013a. Using biocontrol agents of strawberry whiteflies (Hem., Aleyrodidae) in greenhouses conditions of Tehran province. Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). 50 pp. (in Persian with English summary).
- FARROKHI, S., M. BAGHERI, S. ASGARI, V. BANIAMERI, M. P. ARAGHI, M. HADAEGH, M. GOLBONI, F. A. MESHGANANI, A. A. HASANI, J. J. RODENRIJS, 2013b. Using biocontrol agents of cucumber leafminers (Dip., Agromyzidae) in greenhouses conditions of Iran. Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). 35 pp. (in Persian with English summary).
- FARROKHI, S., A. SARPELLEH, M. J. ARDEH, M. ARBABI, S. H. MALKESHI, R. MARZBAN, D. SHAHRIARI, M. BAGHERI, S. JALALI, S. SHAHROKHI, M. GHAZAVI, H. ASGARI and V. BANIAMERI, 2013c. Research and development of beneficial agents and biological control materials for pests and plant diseases in cucumber and tomato greenhouses. Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). 228 pp. (in Persian with English summary).
- FARROKHI, S., M. HADAEGH, S. ASGARI, M. J. ARDEH, J. J. RODENRIJS, 2014. Using biocontrol agents of tomato whiteflies (Hem., Aleyrodidae) in greenhouses conditions of Tehran province. Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). 46 pp. (in Persian with English summary).
- KHANI, E., M. MALEKI, D. SHAHRIARI, 2016. Study of the possibility of biological control of *Phytophthora drechsleri* damping factor in cucumbers by the isolates of *Trichoderma* spp. in greenhouse. *Applied Plant Protection*, 5(1): 1-10 (in Persian).
- NADERI, V. and N. POORJAVAD, 2021. Competition between *Frankliniella occidentalis* and *Thrips tabaci* on cucumber and their abundance on several greenhouse
- غیرمجاز آفتکش‌ها، نیترات و فلزات سنگین محدودیت‌های قانونی وضع و اجرا شود.
- سیاسگزاری
- این تحقیق با حمایت مالی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران انجام گردید که نگارندگان تشکر و قدردانی خود را اعلام می‌نمایند. همچنین از همکاری‌های خانم‌ها آرزو پژمان، لاله دهقان، سمیه کنگرلو و آقایان کریم عرب سلمانی، علی

- plants. *Applied Entomology and Phytopathology*, 89(1): 51-63. DOI: 10.22092/jaep.2021.343218.1351 (in Persian with English summary).
- PARKER, B. L., M. SKINNER and C. F. SULLIVAN, 2016. A Manager's Guide to Integrated Pest Management for Vegetable Production in Greenhouses. Entomology Research Laboratory, University of Vermont, Burlington, VT. USA. (Farsi translation in press).
- REZAI, V. 2021. Methods of tracing and managing western flower thrips, *Frankliniella occidentalis* (Thysanoptera; Thripidae) in greenhouses and vegetable fields. Plant Protection Organization. 29 pp. (in Persian).
- SHAHROKHI S., H. NOURI, H. MALKESHI, S. ASGARI, V. BANIAMERI, M. R. SHASTI and A. A. AKBARI. 2013. Biological control of aphids in cucumber greenhouses using Ahipar and Ervipar biological products. Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). 26 pp. (in Persian with English summary).
- SHIRAZI, J., S. ASGARI, M. R. BAGERI, A. ZARNEGAR, S. M. NAJAFABADI and M. P. ARAGHI, 2014. The introduction of *Coenosia attenuata* as a new predator of the vegetable leaf minor *Liriomyza* sp. and its utilization on the greenhouse cucumber. Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), 27 pp. (in Persian with English summary).
- SOLEIMANI, S., M. HAKIMI-TABAR and M. SEYEDI, 2014. Comparison of different rearing substrates of the predatory mite *Amblyseius swirskii* (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae) with respect to the oviposition. *Applied Plant Protection*, 3(4): 243-250 (in Persian).