

ارزیابی رفتارهای بهداشتی *Uncapping & Removing* کلنی‌های زنبورعسل ایرانی (*Apis mellifera meda*) در مقابل کنه واروآ (*Varroa destructor*) در استان کرمانشاه

• عطااله رحیمی^{۱*} و شبنم پری چهره^۲

- ۱- بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران
۲- بخش تحقیقات زنبورعسل، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

تاریخ دریافت: مرداد ۱۴۰۲ تاریخ پذیرش: مهر ۱۴۰۲

شماره تماس نویسنده مسئول: ۰۹۱۱۹۰۷۴۹۹۵


Email: ata.rahimi@areeo.ac.ir

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22092/ ASJ.2023.363059.2330

چکیده

به دلیل اثرات نامطلوب کنه‌کش‌های سنتتیک مورد استفاده جهت کنترل کنه واروآ، امروزه استفاده از روش‌های غیرشیمیایی نظیر بهبود رفتارهای بهداشتی یا ایجاد لاین‌های بهداشتی مقاوم زنبورعسل علیه کنه واروآ مورد توجه است. به همین منظور، مطالعه حاضر باهدف بررسی رفتارهای بهداشتی *Uncapping & Removing* ۱۵۰ کلنی زنبورعسل آلوده به کنه واروآ از پنج شهرستان استان کرمانشاه طی بازه‌ی زمانی ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹ با استفاده از روش ازت مایع انجام شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ۴۸ ساعت بعد از ریختن ازت مایع، از لحاظ رفتارهای بهداشتی درپوش برداری و حذف نوزادان مرده بین کلنی‌های زنبورعسل شهرستان‌های مورد مطالعه اختلاف معنی‌دار وجود دارد ($P < 0/05$). نتایج مقایسه میانگین رفتارهای بهداشتی زنبورها ۴۸ ساعت بعد از ریختن ازت مایع نشان داد که کلنی‌های زنبورعسل شهرستان صحنه با میانگین ۸۵/۴۸ درصد بالاترین و کلنی-های زنبورعسل شهرستان سرپل ذهاب با میانگین ۵۸/۲۶ درصد کمترین رفتارهای بهداشتی درپوش برداری و حذف نوزادان مرده را نشان دادند. میانگین کل رفتارهای بهداشتی درپوش برداری و حذف نوزادان مرده جمعیت مورد مطالعه ۴۸ ساعت بعد از ریختن ازت مایع ۷۹/۹ درصد بدست آمد. این درصد بالای بروز رفتارهای بهداشتی نشانگر این موضوع است که رفتار بهداشتی درپوش برداری و حذف نوزادان مرده در جمعیت زنبورعسل استان کرمانشاه در حد مطلوبی بیان می‌شود. در مجموع، می‌توان نتیجه گرفت که کلنی‌های زنبورعسل استان کرمانشاه با انجام رفتارهای بهداشتی توانایی دفاع از خود در مقابل کنه واروآ را دارند و می‌توان با اجرای برنامه‌های اصلاح نژادی میزان این رفتار را در کلنی‌های زنبورعسل این استان بهبود بخشید.

واژه‌های کلیدی: استان کرمانشاه، رفتار بهداشتی، زنبورعسل، کنه واروآ، مقاومت به کنه واروآ.



Research Journal of Livestock Science No 144 pp: 3-16

Evaluation of the Uncapping & Removing hygienic behaviors of Iranian honey bee colonies (*Apis mellifera meda*) against *Varroa* mite (*Varroa destructor*) in Kermanshah provinceBy: Ataollah Rahimi^{1*} and Shabnam Parichehreh²

1: Animal Science Research Department, Kurdistan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Sanandaj, Iran

2: Department of Honeybee, Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran Corresponding author email: ata.rahimi@areeo.ac.ir

Received: August 2023

Accepted: October 2023

Due to synthetic acaricides' adverse effects, the use of non-chemical methods, such as improving hygienic behaviors, is considered against the *Varroa destructor*. Therefore, this study was conducted to investigate the hygienic behaviors of Uncapping & Removing 150 honey bee colonies infected with *Varroa* mite from four cities of Kermanshah province from 2019 to 2020 using the liquid nitrogen method. The results showed that a significant difference was observed 48 hours after pouring liquid nitrogen between the honey bee colonies of the studied cities in terms of hygienic behaviors of Uncapping & Removing ($P < 0.05$). The results of the comparison of means bees' hygienic behaviors 48 hours after pouring liquid nitrogen showed that the highest and lowest average hygienic behaviors were related to honey bee colonies of Sahneh city with an average of 85.48% and Sarpol-e Zahab city with an average of 58.26 %, respectively. The mean of the total hygienic behaviors of Uncapping & Removing of the studied population 48 hours after pouring liquid nitrogen was 79.9%. This high percentage of expression of hygienic behaviors indicates that the Uncapping & Removing hygienic behaviors in the honey bee population of Kermanshah province are expressed to an optimal level. In total, it can be concluded that the honey bee colonies of Kermanshah province can defend themselves against the *Varroa* mite by performing hygienic behaviors. Therefore, it is possible to improve the level of this behavior in the honey bee colonies of this province by implementing breeding programs.

Key words: Honey bee, Hygienic behavior, Kermanshah province, *Varroa destructor*, *Varroa* resistance.

مقدمه

۲۰۱۷، ملکی شیرجی و همکاران، ۱۴۰۲). امروزه، کنه واروآ بزرگ‌ترین چالش و معضل موجود در صنعت زنبورداری دنیا بوده و باعث ترک شغل بسیاری از پرورش‌دهندگان زنبورعسل کشور و حتی دنیا از این حوزه گردیده است (Genath و همکاران، ۲۰۲۱). این آفت با تغذیه از اجسام چربی زنبورهای بالغ و نوزادان و همچنین انتقال عوامل بیماری‌زای ویروسی، به‌ویژه ویروس تغییردهنده شکل بال، هر ساله خسارت سنگینی را به زنبورستان‌های سرتاسر دنیا وارد می‌کند (Ramsey و همکاران، ۲۰۲۱). همچنین، امروزه این پارازیت بر سیستم‌های تولید محصولات کشاورزی و قیمت مواد غذایی نیز تأثیر گذاشته است

زنبورعسل (*Apis mellifera* Linnaeus, 1758) یکی از مهم‌ترین حشرات اجتماعی است که نقش برجسته‌ای در امر گرده‌افشانی گیاهان زارعی - باغی، تأمین امنیت غذایی و اشتغال‌زایی دارد (Tu و همکاران، ۲۰۱۰؛ Rahimi و همکاران، ۲۰۲۳). با وجود تمام مزایای اقتصادی و اجتماعی مربوط به صنعت زنبورداری در کشور و نقش ارزنده زنبورعسل در طبیعت، امروزه کلنی‌های زنبورعسل به‌وسیله یک‌سری عوامل نامطلوب تحت تأثیر واقع شده‌اند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به آلودگی کلنی زنبورعسل به کنه واروآ (*Varroa destructor* Anderson & Trueman, 2000) اشاره کرد (Rahimi و همکاران،

بهداشتی *Uncapping & Removing* شامل تشخیص نوزادان مرده، آلوده و یا غیرطبیعی درون سلول نوزادان و به دنبال آن درپوش برداری و تخلیه محتویات سلول آلوده است (-Perez Sato و همکاران، ۲۰۰۹). تحقیقات نشان داده است که رفتارهای بهداشتی *Uncapping & Removing* تحت کنترل عوامل ژنتیکی است و به وسیله آلل‌های مغلوب دو ژن کنترل می‌شود. همچنین، در مطالعات دیگری مدل دو جایگاهی مدل را برای بیان آن پیشنهاد کردند که یک جایگاه منجر به درپوش برداری (u) و جایگاه دیگر منجر به تخلیه حجره حاوی لارو مرده (r) می‌شود (Wilkes and Rothenbuhler و همکاران، ۱۹۶۴؛ Oldroyd، ۲۰۰۲). کلنی‌هایی که بیش از ۹۵ درصد نوزادان مرده، آلوده و غیرطبیعی را کمتر از ۴۸ ساعت از کندو حذف می‌کنند کلنی‌های بسیار بهداشتی محسوب می‌شوند که به طور معمول تنها حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد کلنی‌های زنبورعسل جمعیت‌های طبیعی رفتار بهداشتی مطلوب را از خود نشان می‌دهند (Rinderer و همکاران، ۲۰۰۱؛ Perez-Sato و همکاران، ۲۰۰۹). این نسبت به وسیله اصلاح نژاد می‌تواند افزایش یابد. کلنی‌ها یا لاین‌های اصلاح شده بهداشتی به درمان کمتری نسبت به کلنی‌های غیربهداشتی نیاز دارند و به همین نسبت هر گونه کاهش دارو و سموم در داخل کلنی‌ها منجر به کاهش هزینه‌های عملیاتی برای زنبورداری تجاری و کاهش خطر آلودگی فرآورده‌های کلنی می‌شود (Spivak and Ruttner، ۲۰۰۱). در یک مطالعه‌ای، بانو حسینی و همکاران (۱۳۹۲) رفتار بهداشتی کلنی‌های زنبورعسل پشتیبان طرح اصلاح نژاد زنبورعسل ایرانی را مورد بررسی قرار دادند و گزارش کردند کلنی‌های مورد بررسی، تنوع فنوتیپی قابل توجهی را برای صفات درپوش برداری و تخلیه نوزادان آلوده نشان دادند. همچنین، این محققان گزارش کردند که زنبورعسل ایرانی دارای مقاومت ژنتیکی مطلوبی در مقابل کنه-واروآ است و در طرح‌های اصلاح نژادی، جهت ایجاد کلنی‌های مقاوم زنبورعسل ایرانی به کنه‌واروآ باید برنامه‌ریزی شود. طهماسبی و همکاران (۱۳۹۷) رفتار بهداشتی و میزان آلودگی ۱۰۰ کلنی زنبورعسل ایرانی را نسبت به کنه واروآ مورد بررسی قرار

(Kochanskig و همکاران، ۲۰۱۷). علاوه بر این موارد، اخیراً آلودگی کلنی‌های زنبورعسل به کنه‌واروآ سبب ناپدیدشدن درصد قابل توجهی از جمعیت‌های زنبورعسل شده که این پدیده به اختلال ناپدیدشدن جمعیت‌های زنبورعسل (Colony Collapse Disorder (CCD) معروف است (Morton و همکاران، ۲۰۱۰).

تحقیقات متعددی برای کنترل کنه‌واروآ در دنیا صورت گرفته و در این راستا با استفاده کنه‌کش‌های شیمیایی از قبیل تتو-فلووالینات، آمیتراز و غیره تا حدودی توانسته‌اند از طغیان جمعیت کنه‌واروآ در زنبورستان‌ها جلوگیری نمایند. لیکن، گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که جمعیت‌های این کنه در مقابل کنه-کش‌های شیمیایی مقاوم گردیده (Higes و همکاران، ۲۰۲۰؛ Morgan و همکاران، ۲۰۲۱) و اثر آنها در کنترل این کنه رفته‌رفته کم‌رنگ گشته و از طرف دیگر این سموم عوارض زیان باری را برای انسان، زنبورها، محیط‌زیست به بار آورده و علی‌رغم این موارد، بقایای نامطلوب آنها در محصولات کندو به‌ویژه عسل و موم نیز گزارش شده است (Radakovic و همکاران، ۲۰۱۴؛ Căuia and Căuia، ۲۰۲۲). به همین خاطر، توجه محققین این رشته به روش‌های کم‌خطر برای سلامتی بشر، زنبورها و فرآورده‌های کلنی و محیط‌زیست معطوف شده است. با توجه به اینکه شیوع آلودگی به کنه‌واروآ از یک کندو به کندوی دیگر، از یک زنبورستان به زنبورستان دیگر و بالاخره از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است، تحقیقات زیادی جهت شناسایی علل این اختلافات انجام شده و مشخص شده است که مکانیسم‌هایی وجود دارند که رشد جمعیت کنه‌واروآ را در کلنی‌های زنبورعسل کاهش می‌دهند (Spivak and Reuter، ۲۰۰۱). رفتارهای بهداشتی *Uncapping & Removing* یکی از مهم‌ترین مکانیزم‌های دفاعی زنبورعسل با پایه ژنتیکی علیه کنه‌واروآ است که در طرح‌های اصلاح نژادی برای بهبود این صفات در زنبورها تلاش زیادی شده است (Amor and Amor، ۲۰۱۷). این رفتار به وسیله زنبورهای کارگر کلنی جهت دفاع در مقابل انواع آفات و بیماری‌ها بخصوص کنه واروآ انجام می‌گیرد. رفتارهای

جمعیت) آلوده به کنه‌واروآ انجام شد. زنبورستان‌هایی مورد مطالعه قرار گرفتند که مقیم استان بوده و کوچ برون‌استانی نداشتند.

شیوه اجرای آزمایش

قبل از انجام آزمایش، کلنی‌های آزمایشی از لحاظ سن ملکه (همگی ملکه‌های هم‌سن خواهری یک‌ساله)، جمعیت (بالغین و نوزادان) و ذخیره عسل بر اساس دستورالعمل Delaplane و همکاران (۲۰۰۵) یکسان‌سازی شدند. در طول دوره آزمایش، کلنی‌های مورد مطالعه هیچ‌گونه داروی کنه کشی را دریافت نکردند. همچنین، نرخ آلودگی کندوها به کنه‌واروآ با استفاده از دستورالعمل Dietemann و همکاران (۲۰۱۳) برای زنبورهای بالغ و بر اساس دستورالعمل Zemene و همکاران (۲۰۱۳) برای نوزادان سه بار در سال (بهار، تابستان و پاییز) ارزیابی گردید. سپس، صفات رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف نوزادان مرده، تولید عسل، جمعیت (نوزادان و بالغین) و رفتار تهاجمی مورد ارزیابی قرار گرفت.

ارزیابی صفات

رفتارهای بهداشتی Uncapping & Removing

برای ارزیابی رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف شفیره‌های مرده کلنی‌های زنبورعسل مورد مطالعه، از ازت مایع جهت کشتن شفیره‌ها استفاده شد (Spivak and Ruttner, ۱۹۹۸). برای اینکه در زمان دادن ازت مایع تمام کلنی‌های مورد مطالعه، شفیره هم سن داشته باشند، قبل از انجام آزمایش، کلنی‌های مورد مطالعه بازدید شده و به هر یک از آنها یک شان بافت شده کدگذاری شده داده شد. سپس، برای تحریک کلنی‌ها به تخم‌ریزی، تمام کلنی‌های مورد مطالعه هم‌زمان به مدت ۳ روز تغذیه تحریکی شدند. منطقه تخم‌ریزی ملکه روی شان‌های آزمایشی هر کلنی، علامت‌گذاری شد. سپس، ۱۵ روز بعد از تخم‌ریزی ملکه (یعنی در زمان شش روزگی شفیره‌ها) از ازت مایع برای کشتن شفیره‌ها استفاده شد (طهماسبی و همکاران، ۱۳۹۷). یک روز قبل از استفاده از ازت مایع در کلنی‌ها، برای

دادند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که کلنی‌های بهداشتی نسبت به کلنی‌های غیربهداشتی آلودگی کمتری نسبت به کنه واروآ نشان دادند. سهم رفتارهای بهداشتی در کنترل کنه واروآ را ۲۶ درصد اعلام کردند. همچنین اعلام کردند که رفتارهای بهداشتی با صفات عملکردی همبستگی مثبت دارند. طاهری امام کندی و همکاران (۱۴۰۲) رفتار بهداشتی کلنی‌های زنبورعسل استان آذربایجان غربی را مورد بررسی قرارداد. نتایج پژوهش آنها نشان داد که کلنی‌های زنبورعسل آذربایجان غربی دارای رفتار بهداشتی در حد مطلوبی هستند و با بروز این رفتار توانایی دفاع از خود در مقابل کنه واروآ را دارند.

راه‌حل درازمدت جهت کاهش جمعیت کنه واروآ در کلنی‌های زنبورعسل و آلودگی فرآورده‌های کلنی به آن، بهبود و توسعه مقاومت‌های ژنتیکی زنبورعسل در مقابل این پارازیت بوده و پژوهش بیشتر در این زمینه جهت شناسایی کلنی‌ها و جمعیت مقاوم زنبورعسل ایرانی مورد نیاز است؛ بنابراین، مطالعه حاضر باهدف بررسی رفتار بهداشتی جمعیت بومی زنبورعسل استان کرمانشاه انجام شد تا نتایج حاصل، مسیر تحقیقاتی آتی در مورد مقاومت ژنتیکی کلنی‌های زنبورعسل ایرانی (*Apis mellifera* meda Linnaeus, 1758) را نسبت به کنه واروآ و ایجاد لاین‌های بهداشتی مقاوم به کنه واروآ از جمعیت‌های بومی را هموارتر سازد.

مواد و روش‌ها

زمان و مکان اجرای آزمایش

مطالعه‌ی حاضر روی جمعیت بومی زنبورعسل استان کرمانشاه طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹ انجام شد. کلنی‌های زنبورعسل مورد مطالعه از زنبورستان‌های پنج شهرستان استان کرمانشاه (شهرستان‌های صحنه، کنگاور، سنقر، سرپل ذهاب و پاره) و از هر شهرستان دو زنبورستان بالای ۳۰۰ کلنی و از هر زنبورستان ۱۵ کلنی (کلنی‌هایی که آلودگی بالای ده درصد داشتند) به صورت کاملاً تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع، مطالعه حاضر روی ۱۵۰ کلنی زنبورعسل (کلنی‌های نه قاب

ارزیابی وزن دقیق عسل باقی‌مانده، از روش ارزیابی سطح عسل باقیمانده روی قاب‌ها به وسیله قاب‌های مخصوص که با سیم گالوانیزه به مستطیل ۱۰×۵ سانتی‌متر کادربندی شده است، استفاده شد. برای تخمین عسل باقی‌مانده با استفاده از تجربیات محققین ایرانی (یاراحمدی و همکاران، ۱۳۸۶) و دیگر کشورها از روش تبدیل سطح به وزن، بدین ترتیب هر دسی‌متر مربع عسل در دو طرف قاب را معادل ۳۰۴ گرم عسل در نظر گرفته، استفاده شد. با قراردادن این کادرها روی هر دو طرف قاب‌های باقی‌مانده عسل در کندوها، مجموعاً سطح عسل باقی‌مانده در هر کلنی محاسبه و ثبت گردید. در پایان با مجموع عسل باقی‌مانده و برداشتی، کل عسل تولیدی هر کندو بدست آمده و برای آن کندو ثبت شد. ارزیابی این صفت روی تمام کلنی‌های مورد مطالعه در فصل برداشت عسل در منطقه انجام شد.

رفتار تهاجمی

ارزیابی این رفتار در زنبورستان‌های تحت مطالعه با استفاده از روش نظری انجام گردید. در این روش کلنی‌ها از نظر رفتار روی قاب در زمان بازدید مورد ارزیابی و امتیاز متناسب با رفتار خود دریافت می‌کنند (طهماسبی و همکاران، ۱۳۹۷؛ رحیمی و همکاران، ۱۴۰۲) به این ترتیب برای ارزیابی رفتار تهاجمی باتوجه به رفتار زنبورها امتیاز هر کلنی به شرح ذیل در شناسنامه هر کلنی ثبت شد:

- کندوهایی که بدون دوددادن آرام هستند نمره (۴)
- کندوهایی که با دود کم آرام می‌شوند نمره (۳)
- کندوهایی که با مقداری دود آرام نشده و عصبی هستند نمره (۲)
- کندوهایی که با دود زیاد نیز مهاجم هستند نمره (۱)

جمعیت زنبورهای بالغ و نوزادان:

ارزیابی جمعیت زنبورهای بالغ در طی اجرای این پروژه به صورت بصری و در دو مرحله که نوبت اول در خرداد و نوبت دوم در شهریور سال ۱۳۹۷ است، انجام شد. نحوه این ارزیابی بدین صورت خواهد بود که در هنگام بازدید کندو، قابی که دو طرف آن از زنبور بالغ پوشیده شده باشد، آن را به عنوان یک قاب کامل

اطمینان از وجود شفییره‌ها همه کلنی‌ها بازدید شدند. قاب‌های شفییره علامت‌گذاری را از داخل کندوها (از هر کندو دو قاب) به داخل اتاقک صحرایی منتقل کرده و سپس بقیه مراحل کار در داخل اتاقک و گاهی روی خود کندوها انجام شد. برای استفاده از ازت مایع، از سیلندر استوانه‌ای تو خالی از جنس گالوانیزه به قطر شش سانتی‌متر و ارتفاع پانزده سانتی‌متر استفاده شد. برای هر کلنی حدود ۳۰۰ میلی‌لیتر ازت مایع برای کشتن حدود ۱۶۰ سلول شفییره داخل استوانه، استفاده گردید. بدین ترتیب، روی شفییره از قبل علامت‌گذاری شده در سطح شان به وسیله استوانه یک دایره به قطر شش سانتی‌متر ایجاد کرده و استوانه را به آرامی چرخانده تا به سیم وسط شان برسد و استوانه کاملاً داخل موم شان قرار گیرد. سپس، تعداد سلول‌های خالی داخل استوانه شمارش و ثبت گردید. بعد، مقدار ازت مایع (۳۰۰ میلی‌لیتر) مورد نظر را داخل استوانه ریخته و منتظر شدیم تا ازت مایع کاملاً تبخیر شود. سپس، شان و شفییره‌های کشته شده به کلنی‌های مادری منتقل شدند. ۲۴ و ۴۸ ساعت بعد از ریختن ازت از طریق بازدید کلنی‌ها، تعداد سلول‌های شفییره مرده‌ای که در منطقه مذکور در پوش برداری و تخلیه شدند، در دو نوبت صبح و بعدازظهر شمارش و ثبت گردید. ثبت نتایج تعداد سلول‌های در پوش برداری شده و تخلیه شده به طور مجزا برای هر کلنی یادداشت گردید. ارزیابی رفتارهای بهداشتی در فصول بهار و تابستان (ماه‌های خرداد و تیر) انجام شد. باتوجه به تعریف، ملاک کلنی بهداشتی مطلوب، کلنی‌هایی که در مدت ۴۸ ساعت پس از ریختن ازت مایع بیش از ۹۵ درصد شفییره‌های مرده را در پوش برداری و خارج نمودند به عنوان کلنی‌های بهداشتی در نظر گرفته شدند (Gilliam و همکاران، ۱۹۸۳).

تولید عسل

برای ارزیابی مقدار عسل تولیدی کلنی‌ها در فصل برداشت عسل در منطقه، وزن عسل برداشتی و باقی‌مانده در هر کندو محاسبه شد. تفاوت وزن قاب‌های عسل هر کندو قبل و بعد از استخراج عسل، میزان عسل تولیدی قاب‌ها و مجموع عسل استخراج شده از قاب‌های هر کلنی، میزان عسل تولیدی آن کلنی را تشکیل داد. جهت

پیرسون برای تعیین روابط بین متغیرها استفاده شد.

نتایج و بحث

تجزیه واریانس و مقایسه میانگین رفتارهای بهداشتی

درپوش برداری و حذف محتویات سلول

در مطالعه حاضر، ارزیابی رفتارهای بهداشتی درپوش برداری و حذف محتویات سلول در فصل بهار و تابستان (ماه‌های خرداد و تیر) سال ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹ روی کلنی‌های زنبورعسل پنج شهرستان استان کرمانشاه انجام شد. ارزیابی‌ها در مقاطع زمانی ۲۴ و ۴۸ ساعت بعد از ریختن ازت مایع انجام گردید. در این تحقیق، دامنه وسیعی از رفتارهای بهداشتی درپوش برداری و حذف شفیله‌های مرده طی دوره آزمایش در کلنی‌های زنبورعسل مورد مطالعه مشاهده شد. نتایج تجزیه واریانس رفتارهای بهداشتی درپوش برداری و حذف محتویات سلول به طور جداگانه در هر مقطع زمانی در جدول (۱) ارائه شده است. نتایج تجزیه واریانس رفتارهای بهداشتی درپوش برداری و حذف نوزادان مرده ۲۴ ساعت بعد از ریختن ازت مایع نشان داد که از لحاظ این رفتارها بین کلنی‌های زنبورعسل شهرستان‌های مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. اما، ۴۸ ساعت بعد از ریختن ازت مایع، بین کلنی‌های زنبورعسل شهرستان‌های مورد مطالعه از لحاظ رفتارهای بهداشتی درپوش برداری و حذف نوزادان مرده اختلاف معنی‌دار مشاهده شد ($P < 0/05$). در این بررسی، مقایسه میانگین‌ها بر اساس روش دانکن انجام و نتایج آن در جدول (۲) و نمودار (۱) ارائه شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که کلنی‌های زنبورعسل شهرستان صحنه با میانگین ۶۲/۴ درصد بیشترین و کلنی‌های زنبورعسل شهرستان سرپل ذهاب با میانگین ۵۴/۸۳ درصد کمترین رفتارهای بهداشتی درپوش برداری و حذف نوزادان مرده را در ۲۴ ساعت بعد از ریختن ازت مایع داشتند. در بازه زمانی ۴۸ ساعت نیز کلنی‌های زنبورعسل شهرستان صحنه با میانگین ۸۵/۴۸ درصد بالاترین و کلنی‌های زنبورعسل شهرستان سرپل ذهاب با میانگین ۵۸/۲۶ درصد کمترین رفتار بهداشتی درپوش برداری و حذف نوزادان مرده را نشان دادند. در مجموع (کل ساعات مورد پایش)، بیشترین و کمترین رفتارهای بهداشتی

زنبور در نظر گرفته و در صورتی که زنبورهای بالغ بخشی از سطح قاب را پوشش دهند متناسب با جمعیت مذکور، کسری از یک قاب به عنوان جمعیت زنبورهای بالغ در نظر گرفته شد. مجموع جمعیت قاب‌ها به عنوان جمعیت کندو در نظر گرفته و ثبت شد. ارزیابی جمعیت نوزادان نیز در دو مرحله در ماه‌های خرداد و شهریور روی تمام کلنی‌های مورد مطالعه انجام شد. جمعیت نوزادان شامل قاب‌های حاوی تخم، لارو و شفیره است که اندازه‌گیری آنها در خردادماه همانند ارزیابی جمعیت زنبورهای بالغ به صورت یک قاب کامل نوزاد و کسری از یک قاب نوزاد ارزیابی و سپس مجموع آنها به عنوان جمعیت نوزادان کلنی ثبت شد. در اواخر فصل، برای محاسبه دقیق جمعیت نوزادان از یک قاب خالی کادربندی شده با سیم گالوانیزه استفاده کردیم به طوری که فضای داخل قاب به مربع‌های ۵×۵ سانتی متر تقسیم شده است و سپس با انطباق قاب‌های کادربندی شده روی تک‌تک قاب‌های نوزادان هر کلنی، تعداد کادربندی‌های حاوی نوزاد در هر قاب شمارش و سطح پوشش نوزادان بر حسب سانتی متر مربع محاسبه گردید.

تجزیه و تحلیل داده‌ها

رفتارهای بهداشتی برای کل زنبورهای هر کلنی از طریق فرمول Palacio و همکاران (۲۰۰۵) به شرح ذیل محاسبه گردید:

$$THB^1 = X - Y - Z / X \times 100$$

THB = رفتارهای بهداشتی کل کلنی (درصد تخلیه نوزادان)

X = تعداد حجره‌های درب بسته نوزاد مورد آزمایش (۱۶۰ حجره داخل استوانه که با ازت مایع کشته شدند)

Y = تعداد حجره‌های نوزاد مرده درب پوش برداری نشده بعد از ۴۸ ساعت

Z = تعداد حجره‌های نوزاد مرده درب پوش برداری شده ولی تخلیه نشده بعد از ۴۸ ساعت

در مطالعه حاضر، داده‌ها در قالب طرح آشیانه‌ای با استفاده از نرم‌افزار SAS V. 9.4 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون دانکن و از همبستگی

¹ - Total Hygienic Behavior

هیبرید استارلاین و یک گروه از کلنی‌های زنبورعسل نژاد ایتالیایی بعد از سه نسل انتخاب را به ترتیب ۸۳ و ۵۹ درصد ارزیابی و میزان بروز این رفتار را در ۲۶ درصد از کلنی‌ها در حد مطلوب گزارش کردند (Spivak and Gray, ۱۹۹۸). در مطالعه دیگری، رفتار بهداشتی درپوش‌برداری و حذف نوزادان مرده زنبورهای عسل کشور استرالیا با استفاده از روش ازت مایع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ۲۰ درصد کلنی‌های زنبورعسل کشور استرالیا بهداشتی هستند. همچنین، Kekecoglu (۲۰۱۵) رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف محتویات سلول ۲۵۰ کلنی زنبورعسل را با استفاده از روش ازت مایع بعد از ۴۸ ساعت مورد بررسی قرار دادند و گزارش کردند که از بین کلنی‌های زنبورعسل مورد بررسی، پنج کلنی رفتار بهداشتی برتری داشتند. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، ۱۰ درصد کلنی‌های زنبورعسل مورد مطالعه (۱۵ کلنی)، کلنی‌های با رفتار بهداشتی بسیار مطلوب بودند. طهماسبی و همکاران (۱۳۹۷) مطالعه‌ای را در دو مرحله روی رفتار بهداشتی درپوش‌برداری و حذف نوزادان مرده جمعیت زنبورعسل استان البرز و کلنی‌های پشتیبان طرح اصلاح نژاد زنبورعسل ایرانی انجام دادند. این محققان در مرحله اول ۲۱ و در مرحله دوم ۱۸ درصد کلنی‌های مورد مطالعه را کلنی‌هایی با رفتار بهداشتی مطلوب گزارش کردند. این موضوع در مطالعه دیگری که روی رفتار بهداشتی زنبورعسل ایرانی با استفاده از روش ازت مایع انجام گرفت، گزارش شد. در این مطالعه، ۳۵ درصد کلنی‌های زنبورعسل ایرانی را کلنی بهداشتی معرفی کردند (Najafgholian و همکاران، ۲۰۱۱). باتوجه به نتایج بدست آمده در مورد جمعیت‌های زنبورعسل ایرانی می‌توان استنباط کرد که زنبورعسل ایرانی از توانمندی مطلوب و برتری نسبت به سایر نژادهای دنیا از لحاظ رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف محتویات سلول برخوردار است و اصلاح این نژاد در راستای مقاومت به کنه و اروآ می‌تواند نتایج ارزشمندی را در آینده در برداشته باشد.

طی انجام یک پروژه تحقیقاتی روی کلنی‌های بهداشتی و

درپوش‌برداری و حذف نوزادان مرده به ترتیب مربوط به کلنی‌های زنبورعسل شهرستان صحنه و سرپل ذهاب بود.

بر اساس نتایج به‌دست آمده، میانگین کل رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف نوزادان مرده ۴۸ ساعت بعد از ریختن ازت مایع ۷۹/۹ درصد بدست آمد. این درصد بالای بروز رفتار بهداشتی کلنی‌های زنبورعسل مورد مطالعه بیانگر این موضوع است که رفتار بهداشتی درپوش‌برداری و حذف نوزادان مرده در جمعیت زنبورعسل بومی استان کرمانشاه در حد مطلوبی بیان می‌شود. مطالعات متعددی در مناطق مختلف کشور انجام شده که همگی بروز مطلوب رفتار بهداشتی درپوش‌برداری و حذف نوزادان مرده را در جمعیت‌های مختلف زنبورعسل ایرانی تأیید کرد که از آن جمله می‌توان به مطالعات عاکف (۱۳۸۰) روی جمعیت‌های زنبورعسل ایرانی واقع در استان‌های خراسان، تهران، قزوین، اصفهان و مرکزی، علمی و همکاران (۱۳۸۶) روی جمعیت زنبورعسل استان آذربایجان غربی، بانو حسینی و همکاران (۱۳۹۲) روی ۱۰۰ کلنی پشتیبان طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل ایرانی، طهماسبی و همکاران (۱۳۹۷) روی جمعیت زنبورعسل استان البرز، یحیایی و کریمی دهکردی (۱۴۰۰) روی جمعیت زنبورعسل استان لرستان و طاهری امام‌کندی و همکاران (۱۴۰۲) روی جمعیت زنبورعسل استان آذربایجان غربی اشاره کرد.

مطالعات زیادی روی سایر نژادهای زنبورعسل در مناطق مختلف دنیا صورت گرفته و نتایج متفاوتی را برای بروز این رفتارها گزارش شده است. در برخی کشورها مثل آلمان، اسلونی، کانادا و ایالات متحده آمریکا روی رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف محتویات سلول نژادهای بومی آن کشور بررسی‌های زیادی صورت گرفته و برنامه‌های اصلاح نژادی آنها جهت ایجاد لاین‌های مقاوم به آفات و بیماری‌های زنبورعسل منجمله کنه و اروآ با پیشرفت‌های بالایی همراه بوده است و در تعدادی از این کشورها موفق به ایجاد لاین‌های مقاوم زنبورعسل نسبت به کنه و اروآ و برخی بیماری‌ها مثل لوک شده‌اند (Ibrahim و همکاران، ۲۰۰۷). برخی از محققان، میانگین کل رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف نوزادان مرده در کلنی‌های اصلاح شده

تخلیه سلول را انجام می‌دهند. نتایج تحقیقات محققان مختلف حاکی از این امر است که رفتار بهداشتی درپوش‌برداری و حذف محتویات سلول در زنبورعسل معمولی (*Apis mellifera*) بیان می‌شود و درصد بیان این رفتار بین نژادهای مختلف آن متفاوت است. بر اساس یافته‌های پژوهش‌های قبلی انجام شده در ایران و همچنین نتایج مطالعه حاضر می‌توان نتیجه گرفت که رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف محتویات سلول در زنبورعسل نژاد ایرانی هم بیان می‌شود و درصد بیان این رفتار در بین جمعیت‌های مختلف این نژاد در مناطق مختلف کشور متفاوت و نتایج مطالعه حاضر در تایید این موضوع حاکی از این امر است که رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف نوزادان مرده در جمعیت زنبورعسل استان کرمانشاه در حد مطلوبی بیان می‌شود.


غیربهداشتی، Palacio و همکاران (۲۰۱۰) به این نتیجه رسیدند که کلنی‌های بهداشتی نسبت به کلنی‌های غیربهداشتی رفتارهای درپوش‌برداری و تخلیه محتویات سلول‌ها را سریع‌تر و به تعداد بیشتری انجام می‌دهند به طوری که کلنی‌های بهداشتی ۹۸ درصد سلول‌های آلوده و کلنی‌های غیربهداشتی ۶۰ درصد سلول‌های آلوده را در زمان معین و مشابه تخلیه می‌کنند. در مطالعات دیگری، Masterman و همکاران (۲۰۰۰) و Gramacho و Spivak (۲۰۰۳) به این نتیجه رسیدند که زنبورهای مسئول شناسایی و درپوش‌برداری سلول‌ها، حس بویایی و تحریک‌پذیری بیشتری دارند و به همین ترتیب، این زنبورها بوی لاروهای آلوده را سریع‌تر شناسایی می‌کنند. زنبورهای بهداشتی آستانه تحمل پاسخگویی پایین‌تری برای رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و تخلیه سلول‌های آلوده دارند و سریع‌تر این رفتار درپوش‌برداری و

جدول ۱- تجزیه واریانس رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف نوزادان مرده کلنی‌های زنبورعسل شهرستان‌های مورد مطالعه استان کرمانشاه در مطالعه حاضر

زمان	منبع تغییرات	درجه آزادی	مجموع مربعات	میانگین مربعات	F	سطح معنی داری
۲۴ ساعت	شهرستان	۳	۱۷۶۳/۳۳	۴۴۲/۳۶۳		
۴۸ ساعت	زنبورستان داخل شهرستان	۵	۹۵۵۱/۱۳۹	۱۹۵/۲۳۴	۳/۲۵۲	۰/۰۹۱
	کنده داخل زنبورستان هر شهرستان	۱۴۴	۸۶۵۸۶/۱۲	۳۹۶۲/۲۸۶		
۴۸ ساعت	شهرستان	۳	۹۹۹۸/۸۶۳	۳۸۲۶/۳۷۲		
	زنبورستان داخل شهرستان	۵	۲۶۵۶۲/۵۹۸	۴۶۳۲۹۶	۶/۲۸۲	۰/۰۰۵
	کنده داخل زنبورستان هر شهرستان	۱۴۴	۹۹۹۷۲/۹۹۶	۶۶۳۵/۳۴۸		

جدول ۲- مقایسه میانگین رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف نوزادان مرده کلنی‌های زنبورعسل شهرستان‌های مورد مطالعه استان کرمانشاه در مطالعه حاضر

شهرستان	میانگین درصد درپوش‌برداری و حذف نوزادان مرده	
	۲۴ ساعت بعد از ریختن ازت مایع	۴۸ ساعت بعد از ریختن ازت مایع
صحنه	۶۲/۳ ^a	۸۵/۴۸ ^a
سنقر	۵۶/۲۵ ^{ab}	۶۹/۲۵ ^{ab}
کنگاور	۵۵/۳۸ ^{ab}	۶۶/۸۷ ^{ab}
پاوه	۵۹/۲۸ ^a	۷۸/۹۸ ^a
سرپل ذهاب	۵۴/۸۳ ^{ab}	۶۰/۴۸ ^b



نمودار ۱: میانگین رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف نوزادان مرده کلنی‌های زنبورعسل شهرستان‌های مورد مطالعه

درپوش‌برداری و حذف محتویات سلول تحت‌تأثیر فصل قرار دارد و میزان بروز این رفتار در فصل بهار در کلنی‌ها بیشتر از فصل تابستان است. این موضوع توسط محققان دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفته و آنها گزارش کردند که رفتار بهداشتی زنبورها به‌وسیله عوامل مختلفی از جمله ژنتیک، سیستم‌های عصبی، اجتماعی و شرایط محیطی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد که این فاکتورها می‌توانند در بیان رفتار بهداشتی کلنی‌ها مؤثر باشند (Gramacho and Gonçalves, 2009). در یک مطالعه‌ای، Bigio و همکاران (2013) اثر فصل را روی بروز رفتار بهداشتی مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند اثر فصل روی بروز رفتار بهداشتی درپوش‌برداری و حذف نوزادان مرده تأثیر دارد طوریکه زنبورها در فصل بهار به علت حضور تعداد بیشتر لاور و تحریک‌پذیری بیشتر، رفتار بهداشتی بیشتر و سریع‌تری را از خود نسبت به فصل تابستان نشان می‌دهند. مطالعه دیگری توسط Guler و همکاران (2013) روی نژاد زنبورعسل ترکیه‌ای (*Apis mellifera anatoliaca* Maa, 1953) انجام دادند. این پژوهشگران گزارش کردند میزان بروز رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف محتویات سلول تحت‌تأثیر زمان قرار

اثر فصل روی بروز رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف شیره‌های مرده

نتایج مقایسه میانگین اثر فصل روی بروز رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف نوزادان مرده ۴۸ ساعت بعد از ریختن ازت مایع در فصول بهار (خردادماه) و تابستان (تیرماه) در جدول (۳) ارائه شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف محتویات سلول تحت‌تأثیر فصل قرار دارد. بر اساس نتایج بدست آمده، میزان بروز این رفتار در فصل بهار به طور معنی‌داری بیشتر از فصل تابستان است ($P < 0.05$). از دلایل این امر می‌توان به افزایش شهد ورودی به کندو در فصل بهار اشاره کرد. به‌طوری‌که مطالعات مختلفی نشان دادند میزان بروز رفتارهای بهداشتی کلنی‌ها در فاصله زمانی که جریان شهد به کندو افزایش می‌یابد، بیشتر است. هم‌راستا با نتایج این تحقیق، نتایج مطالعات طهماسبی و همکاران (۱۳۹۷) روی کلنی‌های زنبورعسل اصلاح شده ایرانی در استان البرز، یحیایی و کریمی دهکردی (۱۴۰۰) روی کلنی‌های زنبورعسل استان لرستان و طاهری امام‌کندی و همکاران (۱۴۰۲) روی جمعیت زنبورعسل استان آذربایجان غربی نشان دادند رفتارهای بهداشتی

برآورد کردند (Oxley و همکاران، ۲۰۱۰) و گزارش کردند که میزان بروز رفتار بهداشتی بسته به گونه و زیرگونه‌های مختلف زنبورعسل متغیر است.

دارد. اما با این وجود، روند مشخصی را در ماه‌های مختلف سال مشاهده نکردند. عوامل ژنتیکی نیز در بروز رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف محتویات سلول نقش عمده‌ای دارد به طوری که برخی محققان میزان وراثت‌پذیری این رفتار را ۰/۶۵

جدول ۳- مقایسه میانگین اثر فصل روی بروز رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف نوزادان مرده ۴۸ ساعت بعد از ریختن ازت مایع در ماه‌های خرداد و تیر

P-value	SE	ماه‌های مورد مطالعه		صفت
		تیر	خرداد	
۰/۰۵	۰/۶۷	۷۳/۹۸ ^b	۸۶/۶۹ ^a	رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف محتویات سلول

محتویات سلول کلنی‌های پشتیبان طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل ایرانی و یحیایی و کریمی دهکردی (۱۴۰۰) روی کلنی‌های زنبورعسل استان لرستان نیز نتایج مشابهی را گزارش کردند. بین رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و تخلیه محتویات سلول ۴۸ ساعت بعد از ریختن ازت مایع و تولید عسل همبستگی مثبت و معنی‌داری مشاهده شد ($P < 0/01$) که با نتایج مطالعات افشاری (۱۳۹۱)، بانو حسینی و همکاران (۱۳۹۲) و منصوری ذلاتی و همکاران (۱۳۹۷) همخوانی داشت. همچنین، بین تولید عسل با جمعیت همبستگی مثبت و معنی‌داری مشاهده گردید ($P < 0/05$). بانو حسینی و همکاران (۱۳۹۲)، منصوری ذلاتی و همکاران (۱۳۹۷) و Szabo و همکاران نیز همبستگی بین جمعیت و تولید عسل را مثبت و معنی‌دار گزارش کردند که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد. بر اساس نتایج بدست آمده بین رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف محتویات سلول با جمعیت همبستگی مثبت مشاهده شد. منصوری ذلاتی و همکاران (۱۳۹۷)، یحیایی و کریمی دهکردی (۱۴۰۰) و Lilia و همکاران (۲۰۰۱) نیز نتایج مشابهی را گزارش کردند. در همین راستا، Boecking و Spivak (۱۹۹۹) گزارش کردند کلنی‌های پر جمعیت رفتار بهداشتی بیشتر بروز می‌دهند و در برابر آفات منجمله‌کنه واروآ مقاوم‌تر هستند. با وجود ارتباط مثبتی که بین اندازه جمعیت و رفتار بهداشتی وجود دارد، Ibrahim و همکاران (۲۰۰۶)

همبستگی رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف محتویات سلول با صفات عملکردی

در مطالعه حاضر از آنالیز همبستگی پیرسون برای بدست آوردن رابطه بین رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف محتویات سلول با صفات عملکردی - رفتاری کلنی‌های زنبورعسل استفاده شد و نتایج آن در جدول (۴) ارائه شده است. نتایج نشان داد که بین رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف محتویات سلول با تمام صفات عملکردی - رفتاری کلنی‌های زنبورعسل مورد مطالعه در پژوهش حاضر همبستگی مثبت وجود دارد که این همبستگی در برخی موارد معنی‌دار است. بر اساس نتایج بدست آمده، بین درصد درپوش‌برداری و حذف محتویات سلول ۴۸ ساعت بعد از ریختن ازت مایع همبستگی مثبت و معنی‌داری مشاهده شد ($P < 0/01$). همبستگی مثبت بین میزان درپوش‌برداری و تخلیه سلول امری بدیهی است زیرا با افزایش درپوش‌برداری و در دسترس قرارگرفتن شفیره احتمال تخلیه سلول نیز افزایش می‌یابد. منصوری ذلاتی و همکاران (۱۳۹۷) نیز در بررسی رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف محتویات سلول کلنی‌های زنبورعسل نسل سوم و چهارم طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل ایرانی، طهماسبی و همکاران (۱۳۹۷) در بررسی کلنی‌های اصلاح شده زنبورعسل ایرانی در استان البرز، بانو حسینی و همکاران (۱۳۹۲) در بررسی رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و حذف

دهکردی (۱۴۰۰) در جمعیت زنبورعسل استان لرستان گزارش شد. اما، Rothenbuhler و همکاران (۱۹۶۴) نشان دادند که رفتارهای دفاعی و بهداشتی تواریث جداگانه‌ای دارند و کلنی‌هایی که رفتار بهداشتی بالاتری دارند به اندازه سایر کلنی‌ها آرام هستند. به طور کلی، چون در کلنی‌های زنبورعسل اثر متقابل ژنوتیپ و محیط وجود دارد، همبستگی ژنتیک در اکثر موارد کاهش می‌یابد و عوامل محیطی متفاوتی مثل دما، رطوبت، فصل، جریان شهد، اندازه جمعیت و توانایی‌های کلنی‌ها در بروز رفتارهای بهداشتی آنها تاثیر می‌گذارند (Bar-Cohen و همکاران، ۱۹۷۸؛ Spivak & Giliam، ۱۹۹۳؛ Boecking & Spivak، ۱۹۹۹؛ Gramaco & Gonçalves، ۲۰۰۹).

گزارش کردند که این ارتباط به صورت خطی نمی‌باشد. نتایج مطالعات این محققان نشان داد که در برخی از کلنی‌های بسیار بهداشتی ممکن است جمعیت بالغ کمتری نیز نسبت به کلنی‌های غیربهداشتی داشته باشند. دلیل این امر این است که کلنی‌های بسیار بهداشتی کوچک‌ترین اختلال در داخل سلول‌های شفیره حتی اگر عامل آن کنه یا عامل بیماری‌زا هم نباشد به سرعت شناسایی، درپوش برداری و تخلیه می‌کنند که این امر منجر به کاهش جمعیت نوزادان و بالغین می‌گردد. همچنین، نتایج مطالعه حاضر نشان داد یک همبستگی مثبت نسبتاً بالائی بین میزان رفتار درپوش برداری و تخلیه محتویات سلول با رفتار دفاعی وجود دارد که از لحاظ آماری نیز معنی‌دار می‌باشد ($P < 0.01$). نتایج مشابهی برای این روابط توسط یحیایی و کریمی

جدول ۴: همبستگی بین رفتارهای بهداشتی درپوش برداری و حذف محتویات سلول با صفات عملکردی - رفتاری

کلنی‌های زنبورعسل مورد مطالعه

متغیرهای مورد بررسی	درصد رفتار بهداشتی درپوش برداری ۴۸ ساعت بعد از ریختن ازت (۱)	درصد رفتار بهداشتی حذف محتویات سلول ۴۸ ساعت بعد از ریختن ازت (۲)	تولید عسل (۳)	جمعیت (۴)	رفتار تهاجمی (۵)
۱	۱				
۲	۰/۷۴۳**	۱			
۳	۰/۴۹۶**	۰/۳۲۶**	۱		
۴	۰/۲۸۱	۰/۰۹۵	۰/۵۲۸*	۱	
۵	۰/۶۷**	۰/۹۹**	۰/۰۴۸	۰/۰۹۹	۱

** معنی‌داری در سطح احتمال ۱ درصد، * معنی‌داری در سطح احتمال ۵ درصد

نتیجه‌گیری

تخم‌گذاری بالا در کندو به عنوان یک راهکار طبیعی برای مبارزه با کنه واروآ پیشنهاد می‌شود. همچنین، بررسی و تحقیق بیشتر روی سایر رفتارهای بهداشتی زنبورعسل مثل رفتار VSH، نظافت گری، رفتار بهداشتی Uncapping & Recapping و سایر سازوکارهای رفتاری زنبورعسل علیه کنه واروآ روی جمعیت زنبورعسل استان کرمانشاه به منظور شناسایی کلنی‌های بهداشتی برتر و ایجاد لاین‌های بهداشتی مقاوم به کنه واروآ پیشنهاد می‌شود.

به‌طور کلی، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کلنی‌های زنبورعسل استان کرمانشاه با انجام رفتارهای بهداشتی درپوش برداری و حذف محتویات سلول، توانایی دفاع از خود در برابر کنه واروآ را دارند؛ بنابراین می‌توان با اجرای برنامه‌های اصلاح نژادی مدون در درازمدت، میزان این رفتارها را در جمعیت زنبورعسل این استان بهبود بخشید و با ایجاد لاین‌های بهداشتی زنبورعسل مقاوم به کنه واروآ، میزان مصرف سموم شیمیایی استفاده شده در زنبورستان‌ها جهت کنترل این پارازیت را کاهش داد. از آنجایی که اندازه جمعیت به عنوان یک عامل محیطی نقش مهمی در بروز رفتارهای بهداشتی زنبورها ایفاء می‌کند؛ بنابراین، استفاده از ملکه‌های با توان

منابع

- افشاری، م. (۱۳۹۱). بررسی رفتارهای بهداشتی و نظافت گری کلنی‌های زنبورعسل در مقابل کنه واروآ. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی لرستان.
- بانو حسینی، س.ب.، طهماسبی، غ.، اسکندری نسب، م. و بابایی، م. (۱۳۹۲). ارزیابی رفتارهای درپوش‌برداری و تخلیه لاروهای آلوده و همبستگی آنها با تولید عسل، جمعیت و رفتار دفاعی کلنی‌های زنبورعسل ایرانی. نشریه پژوهش‌های علوم دامی. ۳۳: ۹۹-۹۱.
- رحیمی، ع.، طهماسبی، غ.، بهمنی، ح.، صالحی، ص.، زارع، ب.، پارسانسب، ع.، رخزاد، ب. (۱۴۰۲). ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد ملکه‌های اصلاح شده زنبورعسل ایرانی (*Apis mellifera* *meda* Skorikov 1929) در شرایط اقلیمی استان کردستان. پژوهش‌های تولیدات دامی. ۱۴ (۳۹): ۱۰۲-۱۱۱.
- طهماسبی، غ.، حسینی، ب. و اسکندری نسب، م. (۱۳۹۷). ارزیابی رفتار بهداشتی زنبورعسل و ارتباط آن با میزان آلودگی کلنی به کنه واروآ در زنبورعسل ایرانی. مجله دانش گیاه‌پزشکی. ۴۱ (۲): ۸۹-۱۰۱.
- طاهری امام‌کندی، رسول. (۱۴۰۲). بررسی رفتارهای بهداشتی Uncapping & Removing و نظافت‌گری توده زنبورعسل استان آذربایجان غربی در مقابل کنه واروآ. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.
- عاکف، مجید. (۱۳۸۰). بررسی رفتارهای بهداشتی درپوش‌برداری و تخلیه سلول‌ها و جذابیت برخی از توده‌های زنبوران عسل در برابر کنه‌واروآ. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زنبورعسل، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره).
- علمی، م.، شاددل، ا. و ماهری، ن. (۱۳۸۶). بررسی رفتارهای توده زنبورعسل آذربایجان شرقی در مقابل کنه واروآ. مجله دانش نوین کشاورزی. ۶: ۶۸-۶۱.
- ملکی شیرجی، م.، سپهری، ر.، رحیمی، ع. (۱۴۰۲). تأثیر غلظت-های مختلف اسید اگزالیک و اسید فرمیک روی کنترل کنه واروآ (*Varroa destructor*) در کلنی‌های زنبورعسل
- ایرانی (*Apis mellifera meda*). پژوهش و سازندگی. پذیرش (در نوبت چاپ).
- منصوری ذلاتی، ا.، طهماسبی، غ.، امام جمعه کاشان، ن.، امین افشاری، م.، قاضی خان شاد، ع. (۱۳۹۷). بررسی رفتارهای بهداشتی و نظافت‌گری زنبورعسل ایرانی (*Apis mellifera meda*) در کلنی‌های انتخاب شده نسل سوم و چهارم طرح اصلاح نژاد برای مقاومت به کنه واروآ. فصلنامه تخصصی حشره‌شناسی. ۱۰ (۱): ۵۶-۷۶.
- یحیایی، م.، کریمی دهکردی، م. (۱۴۰۰). بررسی تأثیر فصل و اندازه جمعیت بر بروز رفتار بهداشتی و قدرت تهاجمی کلنی‌های زنبورعسل استان لرستان. فصلنامه علمی محیط‌زیست جانوری. ۱۳ (۳): ۳۲۲-۳۲۸.
- یاراحمدی، س.، میرائی آشتیانی، س.، عبادی، ر.، طهماسبی، غ. (۱۳۸۰). همبستگی فنوتیپی بین نه صفت مرفولوژیکی و سه صفت تولیدی در توده زنبوران عسل استان تهران. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. ۵ (۲): ۱۶۸-۱۵۷.
- Amro, M.A. and Amro, A. (2017). A review of the role of hygienic behavior as a defense mechanism of honey bees against parasitic mites and diseases. *Egyptian Academic Journal of Biological Sciences*. 10: 51-64. doi: 10.21608/EAJB.2017.12093
- Anderson, D. and Trueman, J. (2000). *Varroa jacobsoni* (Acari: Varroide) is more than one species. *Journal of Experimental Applied Acarology*. 24: 165-189. doi 10.1023/a:1006456720416.
- Bar-Cohen, R., Alpern, G. and Bar-Anan, R. (1978). Progeny testing and selecting Italian queens for brood area and honey production. *Apidologie*. 9: 95-100. doi.org/10.1051/apido:19780201
- Bigio, G., Schürch, R. and Ratnieks, F.L. (2013). Hygienic behavior in honey bees (Hymenoptera: Apidae): effects of brood, food, and time of the year. *Journal of economic entomology*. 106(6): 2280-2285. doi.org/10.1603/EC13076
- Boecking, O. and Spivak, M. (1999). Behavioral defenses of honey bees against *Varroa jacobsoni* Oud. *Apidologie*. 30: 141-158.

- Căuia, E. and Căuia, D. (2022). Improving the *Varroa* (*Varroa destructor*) Control Strategy by Brood Treatment with Formic Acid—A Pilot Study on Spring Applications. *Insects*. 13: 149. doi.org/10.3390/insects13020149
- Delaplane, K.S., Berry, J.A., Skinner, J.A., Parkman, J.P. and Hood, W.M. (2005). Integrated pest management against *Varroa destructor* reduces colony mite levels and delays the treatment threshold. *Journal of Apicultural Research*. 44(4):157-162. doi.org/10.1080/00218839.2005.11101171
- Dietemann, V., Nazzi, F., Martin, S.J., Anderson, D.L., Locke, B., Delaplane, K.S., Wauquiez, Q., Tannahill, C., Frey, E., Ziegelmann, B. and Rosenkranz, P. (2013). Standard methods for *Varroa* research. *Journal of apicultural research*. 52(1):1-54. doi: 10.3896/IBRA.1.52.1.09
- Genath, A., Petruschke, H., Bergen, M. and Einspanier, R. (2021). Influence of formic acid treatment on the proteome of the ectoparasite *Varroa destructor*. *PLOS ONE*. 16(10): 1-15. doi.org/10.1371/journal.pone.0258845
- Giusti, M., Sabelli, C., Di Donato, A., Lamberti, D., Paturzo, C.E., Polignano, V., Lazzari, R. and Felicioli, A. (2017). Efficacy and safety of Varterminator, a new formic acid medicine against the *Varroa* mite. *Journal Apiculture Research*. 56: 162-167. doi.org/10.1080/00218839.2017.1291207
- Gilliam, M., Taber, S., Richardson, G.V. (1983). Hygienic behavior of honey bees in relation to chalkbrood disease. *Apidologie*. 14: 29-39
- Gramacho, K.P. and Gonçalves, L.S. (2009). Sequential hygienic behavior in Carniolan honey bees (*Apis mellifera carnica*). *Journal of Genetics and Molecular Research*. 8(2): 655-663. doi:10.4238/vol8-2kerr027.
- Gramacho, K. and Spivak, M. (2003). Differences in olfactory sensitivity and behavioral responses among honey bees bred for hygienic behavior. *Behavioral Ecology and Sociobiology*. 54: 472-479.
- Güler, A. (2000). The effects of narrowed area and additional feeding on some physiological characteristics of honey bee (*Apis mellifera* L.) colonies. *Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences*. 14: 24: 1-6.
- Higes, M., Martín-Hernández, R., Hernández-Rodríguez, C.S., González-Cabrera, J. (2020). Assessing the resistance to acaricides in *Varroa destructor* from several Spanish locations. *Parasitology Research*. 119(11):3595-3601. doi: 10.1007/s00436-020-06879-x.
- Ibrahim, A., Gary, S., and Spivak, M. (2007). Field trail of honey bee colonies bred for mechanisms of resistance against *Varroa destructor*. *Apidologie*. 38: 67-76. doi.org/10.1051/apido:2006065
- Ibrahim, A. and Spivak, M. (2006). The relationship between hygienic behavior and suppression of mite reproduction as honey bee (*Apis mellifera*) mechanisms of resistance to *Varroa destructor*. *Apidologie*. 37: 31-40.
- Kekecoglu, M., Gocrasgele, P., Burgut, A. and Kambur, M. (2015). Breeding and selection of ylca honey bee (*Apis mellifera* L.) 44th Apimondia International Apicultural Congress, Deajeon, Korea, P.149.
- Kochanskj, J., Gary, S., and Wilzer, M. (2017). Comparison of the transfer of coumaphos from bee's wax into honey. *Apidologie*. 32: 119-125. doi.org/10.1051/apido:2001117
- Lilia, I., Guzman, N. and Rinderer, T. (2001). Hygienic behavior by honeybees from Far-eastern Russia. *American Bee Journal*. 3: 58-60.
- Masterman, R., Smith, B.H. and Spivak M. (2000). Brood odor discrimination abilities in hygienic honey bees (*Apis mellifera* L) using probosci's extension reflex conditioning. *Journal of Insect Behavior*. 13: 87-101. doi: 10.1023/A:1007767626594
- Morgan, A.R., James, M.W., Aaron, D.G. (2021). Assessing *Varroa destructor* acaricide resistance in *Apis mellifera* colonies of Virginia. *Apidologie*. 52:1278-1290. https://doi.org/10.1007/s13592-021-00901-6
- Morton, J., Ball, R., Brown, M. and Wilkins, S. (2010). Managing *Varroa*. Central Science Laboratory and Department for Environment, Food and Rural Affairs, London, UK, 1-36.
- Najafgholian, J., Pakdel, A., Thahmasbi, G. and Nehzati, G. (2011). Assessing hygienic behavior and attraction to *Varroa* mite (Acari: Varroidae) in Iranian honey bee (*Apis Mellifera meda*). *Journal of Biotechnology*. 10(6): 1011-1021.

- Oxley, P.R., Spivak, M. and Oldroyd, B.P. (2010). Six quantitative trait loci influence task thresholds for hygienic behavior in honeybees (*Apis mellifera*). *Molecular Ecology*. 19: 1452-1461. doi: 10.1111/j.1365-294X.2010.04569.x.
- Palacio, M.A., Flores, J.M., Figini, E., Ruffinengo, S., Escande, A., Bedascarrasbure, E., Rodriguez, E. and Gonçalves, L.S. (2005). Evaluation of the time of uncapping and removing dead brood from cells by hygienic and non-hygienic honey bees. *Genetic and Molecular Research*. 4(1): 105-114.
- Perez-Sato, J. A., Chaline, N., Martin, S. J., Hughes, W. H. O. and Ratnieks, F. L. W. (2009). Multi-level selection for hygienic behavior in honey bees Heredity. *Journal of Heredity*. 102: 609-615. doi: 10.1038/hdy.2009.20
- Ramsey, S.D., Ochoa, R., Bauchan, G., Gulbranson, C., Mowery, J.D., Mowery, A., Lim, D., Joklik, J., Cicero, J.M., Ellis, J.D., Hawthorne, D. and VanEngelsdorp, D. (2021). *Varroa destructor* feeds primarily on honey bee fat body tissue and not hemolymph. *PNAS Latest Articles*. 22: 1-10. doi: 10.1073/pnas.1818371116.
- Rahimi, A., Mirmoayedi, A., Kahriz, D., Zarei, L. and Jamali, S. (2023). Genetic characterization of Iranian honey bees, *Apis mellifera meda* Skorikow, 1829, based on microsatellite DNA polymorphism. *Biochemical genetics*. 61 (2):1-25. doi: 10.1007/s10528-023-10368-y
- Rahimi, A., Khorramdel, Y., Mpradpor, F. (2017). The effect of ethanolic extract of Thyme (*Thymus caucasicus*) on *Varroa* mite (*Varroa destructor*), an external parasitic mite of *Apis mellifera meda* (Hym: Apidae). *Biologija*. 63(2): 177-184.
- Radakovic, M., Stevanovic, J., Djelic, N., Lakic, N., Knezevic-Vukcevic, J., Vukovic-Gacic, B. and Stanimirovic, Z. (2013). Evaluation of the DNA damaging effects of Amitraz on human lymphocytes in the Comet assay. *Journal of Biosciences*. 38(1): 53-62. doi:10.1007/s12038-012-9287-2.
- Rinderer, T. E., deGuzman, L.I., Delatte, G., Stelzer, J., Lancaster, V., Kuznetsov, V. and Harris, J. (2001). Resistance to the parasitic mite *Varroa destructor* in honey bees from far-eastern Russia. *Apidologie*. 32: 381-394. doi: 10.1051/apido:2001138
- Rothenbuhler, W. C. (1964). Behavior genetics of nest cleaning in honey bees. I. Responses of four inbred lines to disease-killed brood. *Journal of Animal Behaviors*. 12: 578-583. doi.org/10.1016/0003-3472(64)90082-X
- Spivak, M. and Reuter, G. S. (2001). *Varroa jacobsoni* infestation in untreated honey bee (Hymenoptera: Apidae) colonies selected for hygienic behavior. *Journal of Economic Entomology*. 94: 326-331. doi: 10.1603/0022-0493-94.2.326
- Spivak, M. and Gary, S. (1998). Performance of hygienic honey bee colonies in commercial apiary. *Apidologie*. 29: 291-302. doi.org/10.1051/apido:19980308.
- Spivak, M. and Gilliam, M. (1993). Facultative expression of hygienic behavior of honey bees in relation to disease resistance. *Journal of Apicultural Research*. 32 147-157. doi.org/10.1080/00218839.1993.11101300
- Szabo, T. I. and Lefkovich, L. P. (1989). Effect of brood production and population size on honey production of honey bee colonies in Alberta, Canada. *Apidologie*. 20:157-163.
- Tu, S., Qiu, X., Cao, L., Han, R., Zhang, Y. and Liu, X. (2010). Expression and characterization of the chitinases from *Serratia marcescens* GEI strain for the control of *Varroa destructor*, a honey bee parasite. *Journal of invertebrate pathology*. 104: 75-82. doi: 10.1016/j.jip.2010.02.002
- Wilkes, K., Oldroyd, B. (2002). Breeding hygienic disease-resistant bees. RIRDC project no, US-39A
- Zemene, M., Bogale, B., Derso, S., Belete, S., Melaku, S. and Hailu, H. (2015). A review on *Varroa* mites of honey bees. *Academic Journal of Entomology*. 8(3):150-159.