

معرفی فلور علف‌های هرز باغ‌های چای ایران

سیدتقی میرقاسمی^{۱*} و مسلم محمدشریفی^۲

۱- پژوهشکده چای، موسسه تحقیقات علوم باگیانی؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان، ایران.

۲- موسسه تحقیقات برنج کشور؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.

* mirghaseminori@yahoo.com

بندواش‌ها (*Panicum spp.*) و ارزن (*Paspalum spp.*) باعث کاهش سطح برگ و تعداد برگ می‌شود. بیشترین خسارت آن‌ها در مرحله گل‌دادن و اوچ رشد رویشی است

(آیلانگو و همکاران، ۱۹۹۸). در بسیاری از کشورهای چای‌خیز جهان مطالعاتی در زمینه شناسایی فلور علف‌های هرز چای صورت گرفته است. بررسی‌های انجام شده در کشور هندوستان نشان داد که ۳۴۰ گونه از ۲۲۹ چای و ۷۶ خانواده جزو فلور علف‌های هرز چای در منطقه هیمالیا هندوستان می‌باشد که گونه‌های متعلق به خانواده‌های پوآسه (Poaceae)، آستراسه (Astraceae) و فاباسه (Fabaceae) بیشترین فراوانی را داشتند (سینگ و همکاران، ۱۹۹۸). مطالعات دیگری که در دهه ۹۰ میلادی در آفریقای مرکزی انجام شد، نشان داد که در جریان شناسایی علف‌های هرز چای به گونه جدیدی از علف هرز به نام میکانیا (*Mikania scandens*) در کنار رودی واقع در بخش مالاوی برخورد نمودند، که قبلاً جزو فلور علف‌های هرز چای در منطقه نبود (وایت، ۱۹۹۶).

در ایران، اواخر دهه ۶۰ شمسی مطالعاتی توسط محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان در این زمینه انجام و طی آن ۸۲ گونه گیاهی به عنوان علف‌های هرز باغ‌های چای شمال جمع‌آوری و شناسایی شد (محمدشریفی، ۱۳۷۲). رشد علف‌های هرز مطابق با وضعیت اقلیمی مناطق و فصل‌های مختلف فرق می‌کند. بیشتر علف‌های هرز بعد از باران ماههای مارس و آوریل سبز می‌شوند و تراکم بالایی در ماههای آگوست و جولای دارند. در زمستان دارای توقف رشد بوده و در سطح غیر بی‌خطر باقی می‌مانند و تا فصل محصول که منطبق با مارس است به حالت غیر مشکل‌ساز باقی می‌مانند. علف‌های هرز باغ‌های چای کشور بنگلادش بر اساس صفت فراوانی به دو گروه مهم و کم اهمیت تقسیم‌بندی شده که شامل علف‌های هرز تکلیف‌ای و دولپه‌ای می‌باشند.

بیان مساله

درختچه چای گیاهی است با نام علمی، *Camellia sinensis* (L.) Kountze که از جنس کاملیا، خانواده کاملیاسه (Camelliaceae) و راسته گوتی‌فرالس (Guttiferales) می‌باشد (ویلسون، ۱۹۹۹). خاستگاه آن آب و هوای گرم و مرطوب با اسیدیته (pH ۵/۵) می‌باشد. جنس کاملیا دارای ۸۲ گونه بوده که مهمترین گونه آن از نظر اقتصادی چای است. علف‌های هرز یکی از عوامل محدودکننده عملکرد چای از لحاظ کمی و کیفی هستند. بعضی از گونه‌های علف‌های هرز که دارای ساقه‌های رونده هستند مانند پیچک صحرایی، با پیچیدن دور غنچه‌ها وارد فرآیند چای‌سازی شده و کیفیت تولید را با کاهش رنگ و طعم پائین می‌آورند (اصغری و محمودی، ۱۳۷۵). شدت خسارت بستگی به شدت رشد علف‌های هرز، شدت رقابت آن‌ها و توانایی رقابت ارقام کلونی چای دارد. علف‌های هرز برای دست‌یابی به مواد غذایی، نور و رطوبت به طور کامل با چای رقابت می‌کنند. علاوه بر کاهش محصول، علف‌های هرز اثرهای بازدارنده رشد مداوم روی چای می‌گذارند که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

الف) محدود شدن شاخسارهای و توسعه‌ی اسکلت‌بندی درختچه‌ها؛

ب) جانشینی خوب برای میزانی آفات مهم چای؛

ج) کاهش نقاط برگ‌چینی؛

د) شاخه دوانیدن (خزنده‌گی) روی درختچه‌های چای که مانع برگ‌چینی می‌شود؛

ه) کاهش تداوم آب در زهکش‌ها، (راجکوا، ۲۰۰۵).

آمار جهانی نشان می‌دهد که ۱۴ تا ۱۵ درصد محصول چای جهان توسط علف‌های هرز کاهش پیدا می‌کنند (سانا، ۱۹۸۹). علف‌های هرز چای علاوه بر این که در برگ‌چینی برای کشاورزان ایجاد مشکل می‌کنند، بعضی از گونه‌های علف‌های هرز چای مانند مرغ (*Cynodon dactylon*) (۱۵)

مدیریت علف‌های هرز می‌باشد. بنابراین انجام این مطالعه با توجه به اهداف اشاره شده یک ضرورت به نظر می‌رسید و این مقاله ترویجی نتایج مهم تحقیق موصوف را بیان می‌دارد.

روش بررسی

این تحقیق در باغ‌های چای استان‌های گیلان و مازندران واقع در مناطق لاهیجان، رودسر، لنگرود، رشت، رامسر و تنکابن انجام شد. در باغ‌های چای برای جمع‌آوری و شناسایی علف‌های هرز مهم در هر منطقه چای‌کاری چهار قطعه باغ (دو قطعه در دشت و دو قطعه در کوهپایه انتخاب شدند) که مساحت هر قطعه ۵۰۰۰ مترمربع بود، این باغ‌های چای به عنوان نمونه‌هایی از جامعه علف‌های هرز انتخاب شدند.

جمع‌آوری و شناسایی همه علف‌های هرز، به مدت سه سال با بازدیدهای مکرر از سطح کل قطعات باغ‌های چای انتخابی نمونه، در فصل‌های رویش و گل‌دهی علف‌های هرز (بهار و تابستان) انجام شد. تمامی نمونه‌های علف‌های هرز همراه با گل، ریشه، بذر و ثبت مشخصات گیاه‌شناسی داخل پلاستیک گذاشته و سپس برای خشک‌کردن به آزمایشگاه گیاه‌پزشکی ستاد پژوهشکده چای منتقل شدند. نمونه‌های خشک شده روی مقواوی به ابعاد 30×40 چسبانده شده و زیر آن کلیه مشخصات گیاه‌شناسی مورد نظر از قبیل؛ نام علمی، نام فارسی، خانواده، نام محلی، تاریخ جمع‌آوری، محل جمع‌آوری و تشخیص در آن ثبت گردید. سپس کلیه گونه‌های یک خانواده در داخل پوشه مجزا نگهداری شدند. شناسایی گونه‌ها توسط همکاران متخصص گیاه‌شناسی سیستماتیک پژوهه با استفاده از کلیدهای شناسایی گیاهان، منابع علمی گیاه‌شناسی و اینترنتی انجام شد.

برای ارزیابی جمعیت علف‌های هرز از روش مشاهدات چشمی استاندارد در هر قطعه نمونه استفاده شد. داخل هر قطعه گونه‌ای از علف‌های هرز که دارای تراکم بیش از ۵۰ درصد بودند به عنوان علف‌های هرز مهم شناسایی شده انتخاب شدند. در ایران، مطالعات مختلفی در مورد روش‌ها و تعیین تراکم علف‌های هرز در محصولات زراعی مختلف صورت گرفته است. در این ارزیابی‌ها شاخص‌هایی برای

در این جامعه رویشی بعضی‌ها یک‌ساله و چندساله هستند. به عنوان مثال، علف‌های هرز میکانیا و شیرسگ که از طریق ریزوم، بذر یا استولون تکثیر پیدا می‌کنند؛ جزو این دسته از علف‌های هرز محسوب می‌شوند. دولپه‌ای‌ها نسبت به تکلیفهای ها غالب بوده و از اهمیت بیشتری برخودار هستند. شایان ذکر است بررسی و شناسایی جمعیت علف‌های هرز دو بار در سال برای بررسی توالی علف‌های هرز و معرفی علف‌های هرز غالب انجام می‌شود. شناسایی علف‌های هرز مهم بر اساس درصد فراوانی و تراکم با روش *Borreria* کوادرات ثابت انجام می‌شود؛ برای مثال، *Scoperia dulcis* و *Euphorbia hirta hispida* گونه‌های غالب علف‌های هرز هستند. میزان غالیت *Borreria hispida* به دیگر گونه‌ها به نسبت پنج به یک است (سالانه، ۱۹۸۹). در جمعیت‌های گیاهی گونه‌های که دارای فراوانی بیش از ۵۰ درصد باشند، دارای پایداری بالایی هستند (دانشیان، ۱۳۸۲)؛ چون گونه‌های پایدار علف‌های هرز در اکوسیستم‌های زراعی از سرعت رشد نسیی و فتوستنتز بالایی برخودار هستند و می‌توانند جزو علف‌های هرز مهم در جامعه رویشی محسوب شوند.

در طی تحقیقاتی که در کشور هندوستان انجام شد، ۳۳ گونه علف هرز به عنوان علف‌های هرز مهم باغ‌های چای معرفی شدند. بین آن‌ها ۱۲ گونه متعلق به خانواده پوآسه (Poaceae) و سه گونه متعلق به خانواده آستراسه (Astraceae) دارای بیشترین فراوانی بودند. جمعیت علف‌های هرز باریک برگ با ۲۱ گونه بیشتر از پهنه برگان بود. در میان گونه‌های شناسایی شده، هشت (۸) گونه فقط در باغ‌های جوان چای مشاهده شد (گوش هاجرا، ۲۰۰۱).

با توجه به افزایش جمعیت کشور و به تبع آن بالا رفتن مصرف سرانه چای، تولید فلی جواب‌گوی نیاز داخلی نیست؛ بنابراین، ضرورت دارد تا عملکرد این محصول در واحد سطح افزایش یابد، زیرا امکان توسعه‌ی باغ‌های چای به علت محدود بودن اراضی در شمال کشور چندان مقدور نیست. از راه‌کارهای مهم برای دست‌یابی به این هدف، کاهش میزان خسارت ناشی از عوامل زنده خسارت‌زا (آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز) می‌باشد. شناسایی، تعیین تنوع گونه‌ای، بررسی درجه اهمیت نسبی علف‌های هرز چای و مطالعه اکولوژی جمعیت آن‌ها گام‌های نخست برای

دارند. آیلانگو و ویکتور (۲۰۰۵)، در شناسایی فلور علف‌های هرز چای در جنوب هند به ۴۵ گونه گیاهی اشاره نمودند که دارای ارزش اقتصادی و دارویی بالایی می‌باشند. در مجموعه رویشی علف‌های هرز ۱۳ گونه گیاهی از خانواده‌های مختلف دارای تراکم بالای ۵۰ درصد بودند که می‌توانند جزو علف‌های هرز مهم چای محسوب شوند (جدول ۲).

در ایران مطالعات مختلفی در مورد روش‌ها و تعیین تراکم علف‌های هرز در محصولات زراعی مختلف صورت گرفته است. در این ارزیابی‌ها، شاخص‌هایی برای تعیین غالیبیت علف‌های هرز منظور شده است. در بسیاری از مطالعات ارزیابی به صورت مشاهده‌ای بوده و از تراکم درختچه به عنوان یک شاخص کمی برای معرفی علف‌های هرز غالب استفاده می‌شود. در حالی که، از شاخص‌های فراوانی و یکنواختی هم می‌توان به عنوان شاخص‌های کمی در تعیین گونه‌های غالب استفاده کرد (مین‌باشی، ۱۳۸۱). همچنین کاپیلا و همکاران (۲۰۰۴) و سانا (۱۹۸۹)، در بررسی جمعیت علف‌های هرز چای از شاخص‌های فراوانی و تراکم برای معرفی گونه‌های غالب استفاده کردند. ارزیابی جمعیت علف‌های هرز دو بار در سال برای بررسی توالی علف‌های هرز باید انجام شود و علف‌های هرز مهم معرفی شوند. با تهیه این نقشه جامع علف‌های هرز می‌توان به یک کنترل مناسب برای مبارزه با علف‌های هرز دست یافت (سana، ۱۹۸۹). بنابراین، درصد تراکم یکی از صفات وابسته به علف‌های هرز است که در تعیین گونه‌های مهم نقش زیادی دارد. علف‌های هرز در تراکم‌های زیاد، تداخل منفی با گیاهان مجاور به وجود می‌آورند و نقش مهمی را در رقابت با گیاه اصلی بازی می‌کنند. علف‌های هرز در تراکم‌های بالا بخش زیادی از ماده خشک در باغ را به خود اختصاص می‌دهند. پوترو جاندر (۱۹۷۷)، در معرفی علف‌های هرز مهم خصوصیاتی از قبیل؛ سرعت رشد نسبی در مرحله گیاهچه‌ای، سرعت زیاد فتوستتر و تخصیص سریع وزن خشک (*Biomass*) را عنوان کردند. از طرفی، گونه‌های که دارای تراکم بالای ۵۰ درصد باشند از پایداری بیشتری در جامعه برخوردار هستند (دانشیان، ۱۳۸۲). علف‌های هرزی که دارای درصد تراکم و فراوانی زیادی باشند به احتمال زیاد صفات نام بردہ بالا در آن‌ها بیشتر

تعیین غالیبیت علف‌های هرز منظور شده است. در بسیاری از مطالعات ارزیابی به صورت مشاهده‌ای بوده و از تراکم درختچه به عنوان یک شاخص کمی برای معرفی علف‌های هرز غالب استفاده می‌شود. در حالی که از شاخص‌های فراوانی و یکنواختی هم می‌توان به عنوان شاخص‌های کمی در تعیین گونه‌های غالب استفاده کرد (مین‌باشی، ۱۳۸۱).

برای تعیین چرخه زندگی علف‌های هرز از کلیه مراحل فنولوژیکی علف‌های هرز، مرحله گل‌دهی تا بذردهی آن‌ها و طول دوره رشد، یادداشت‌برداری در باغ انجام گرفت. این کار با مشاهدات مکرر در باغ انجام گرفت.

نتایج و بحث

گونه‌های علف‌های هرز شناسایی شده در باغ‌های چای در جدول (۱) آورده شده است. در این تحقیق، ۹۱ گونه علف هرز متعلق به ۲۵ خانواده گیاهی شناسایی شد. خانواده‌های پوآسه (Poaceae) و آستراسه (Astraceae) به ترتیب با داشتن ۱۵ و ۹ گونه گیاهی جزو فراوان‌ترین خانواده‌های گیاهی در فلور علف‌های هرز محصول چای بودند. نتایج این تحقیق با نتایج گوش هاجرا (۲۰۰۱) که اظهار داشت خانواده‌های گیاهی پوآسه و آستراسه دارای بیشترین فراوانی در جامعه علف‌های هرز باغ‌های چای هستند، مطابقت دارد. همچنین نتایج این پژوهش با نتایج مطالعه سینگ و همکاران (۱۹۹۴) که اظهار نموده‌اند ۳۴۰ گونه علف هرز متعلق به ۶۷ خانواده جزو فلور علف‌های هرز چای منطقه هیماکال هند بوده و خانواده‌های پوآسه (Poaceae)، آستراسه (Astraceae) و فاباسه (Fabaceae) دارای بیشترین فراوانی می‌باشند، مطابقت می‌کند. در زراعت‌های دیگر هم تا حد زیادی این ویژگی به چشم می‌خورد. در علف‌های هرز مزارع زعفران ۶۱ گونه علف هرز متعلق به ۲۶ خانواده گیاهی شناسایی شدند که میان آنها خانواده‌های گیاهی پوآسه (Poaceae) و آستراسه (Astraceae) دارای بیشترین فراوانی بودند (پادارلو و همکاران، ۱۳۸۶). با عنایت به نتایج به دست آمده می‌تواند چنین استدلال کرد که دو خانواده گیاهی پوآسه و آستراسه از خانواده‌های مهم در جامعه رویشی علف‌های هرز به شمار می‌آیند. شایان ذکر است که تعدادی از گونه‌های علف‌های هرز مناطق چای‌کاری شناسایی شدند که در آینده جهت مصارف صنعتی، دارویی، آرایشی، غذایی و علف‌کشی قابلیت توسعه

اگر ما یک گیاه جدید را در منطقه‌ای می‌بینیم که قبلاً وجود نداشت این امر نشانگر آن است که شرایط محیط اکوسیستم برای ظهور آن گونه مناسب بود. در اکوسیستم‌های زراعی تغییرات محیط به نفع گیاهان زراعی است؛ ولی در این شرایط گیاهان هرزی هستند که از این شرایط استفاده می‌کنند. هرگونه تغییر نهاده‌های کشاورزی و برهم زدن خاک در یک باغ یا مزرعه می‌تواند باعث ظهور یک گونه جدید علف هرز در باغ شود (کوچکی و همکاران، ۱۳۸۰؛ بابارا و همکاران، ۲۰۰۳).

است؛ چون سرعت رشد نسبی و سرعت زیاد فتوسنتز از عواملی هستند که در رشد و پراکنش علف هرز نقش زیادی دارند و باعث می‌شوند که در صد تراکم علف هرز در مزرعه بالا رود و خسارت زیادی به محصول وارد آید (کوچکی و همکاران، ۱۳۸۰). در بیشتر نظامهای باغداری کشاورزی تراکم بالای علف هرز مانع عملکرد زیاد می‌شود؛ به طوری که در زراعت چغندرقد با افزایش تراکم علف هرز تاج خروس وحشی کاہش چشمگیری در عملکرد کمی وکیفی چغندرقد به وجود آمد (حسین نیا و همکاران، ۱۳۸۰). علفهای هرزی که دارای این ویژگی‌ها باشند از موفقیت‌های چشمگیری در اکوسیستم‌های زراعی برخوردار هستند و روش‌های مدیریت باید بیشتر روی آن‌ها متمرکز شود (کوچکی و همکاران، ۱۳۸۰). از دستاوردهای مهم در بررسی فلور علفهای هرز باغهای چای این است که با توجه به توسعه سطح زیر کشت اراضی چای‌کاری و تغییر اقلیمی منطقه، نوع رستنی‌ها در باغهای چای در حال تغییر و تحول است. بعضی از گونه‌ها به تازگی وارد مجموعه رویشی علفهای هرز چای شدند که قبلاً وجود نداشتند؛ مثل ارزن جنگلی (*Oplismenus compositus*) از خانواده پوآسه و برگ‌بیدی (*Tradescantia flumenensis*) از خانواده کاملیاسه جزو علفهای هرزی بودند که قبلاً در باغهای چای گزارش نشده بودند. به جهت دستکاری‌های انسان در اکوسیستم‌های کشاورزی، توالی علفهای هرز دستخوش دگرگونی می‌شوند. وجود گونه‌های جدید در فلور علفهای هرز مovid این فرضیه است.



ویژگی‌های خاص علفهای هرز باعث شده تا آن‌ها بتوانند در جوامع کشاورزی یا اکوسیستم‌های طبیعی و دست‌ساز بشر نفوذ پیدا کنند.

جدول (۱) جامعه علف‌های هرز باغ‌های چای ایران

| ردیف | نام علمی علف هرز | نام فارسی | خانواده | سیکل زندگی |
|------|----------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| ۱ | <i>Amaranthus retroflexus</i> | تاج‌خرس وحشی | Amaranthaceae | یک‌ساله |
| ۲ | <i>Alopecurus myosuroides</i> | دم رویاهی | Poaceae | یک‌ساله |
| ۳ | <i>Aira elegans</i> | علف‌موئین | Poaceae | یک‌ساله |
| ۴ | <i>Agrimonia eupatoria</i> | غافت | Rosaceae | یک‌ساله |
| ۵ | <i>Anagallis arvensis</i> | آناغالیس | Primulaceae | یک‌ساله |
| ۶ | <i>Artemisia annua</i> | درمنه‌خرزی | Asteraceae | چندساله |
| ۷ | <i>Achillea millefolium</i> | بومادران | Asteraceae | چندساله |
| ۸ | <i>Acalyphe austrialis</i> | ساس‌واش | Euphorbiacea | یک‌ساله |
| ۹ | <i>Amarantus sp.</i> | تاج‌خرس وحشی | Amaranthacea | یک‌ساله |
| ۱۰ | <i>Brunella vulgaris</i> | نعمان‌چمنی | Laminaceae | یک‌ساله |
| ۱۱ | <i>Bromus brizoides</i> | جوپیش | Poaceae | یک‌ساله |
| ۱۲ | <i>Bromus sp.</i> | گونه‌ای جومیش | Poaceae | یک‌ساله |
| ۱۳ | <i>Briza minor</i> | لرzanک | Poaceae | یک‌ساله |
| ۱۴ | <i>Cyperus rotundus</i> | اویارسلام نقره‌ای | Cyperaceac | یک‌ساله |
| ۱۵ | <i>defformis Cyperus</i> | اویارسلام | Cyperaceac | یک‌ساله |
| ۱۶ | <i>Cyperus esculentus</i> | اویارسلام زرد | Cyperaceac | یک‌ساله |
| ۱۷ | <i>Centaurium erythraea</i> | گل‌سپاس | Qentianaceae | دوساله |
| ۱۸ | <i>Capsella bursa – pastoris</i> | کیسه‌کشیش | Cruciferae | یک‌ساله |
| ۱۹ | <i>Conyza canadensis</i> | پیربهار کانادایی | Asteraceae | یک‌ساله |
| ۲۰ | <i>Cynodon dactylon</i> | مرغ | Poaceae | چندساله |
| ۲۱ | <i>Carex sp.</i> | جگن | Cyperaceae | یک‌ساله |
| ۲۲ | <i>Cerastium sp.</i> | سراسیتیوم صحرائی | Caryophyllaceae | یک‌ساله |
| ۲۳ | <i>Capsella sp.</i> | کیسه‌کشیش | Cruciferae | یک‌ساله |
| ۲۴ | <i>Convolvulus sepium</i> | نیلوفر پیچ | Convolvulaceae | چندساله |
| ۲۵ | <i>Convolvulus arvensis</i> | پیچ‌صحرایی | Convolvulaceae | چندساله |
| ۲۶ | <i>Cirsium arvense</i> | کنگر وحشی | Asteraceae | چندساله |
| ۲۷ | <i>Chelidonium majus</i> | مامیران | Asteraceae | یک‌ساله |
| ۲۸ | <i>Campunula sp.</i> | گل استکانی | Capumulaceae | چندساله |
| ۲۹ | <i>Coronilla sp.</i> | ماشک بنفس | Fabaceae | چندساله |
| ۳۰ | <i>Digitaria sanguinalis</i> | پنجه کلالگی | Poaceae | یک‌ساله |
| ۳۱ | <i>Dryopteris sp.</i> | نوعی سرخس | Aspidiaceae | یک‌ساله |
| ۳۲ | <i>Euphorbia maculata</i> | شیرسگ | Euphorbiacea | یک‌ساله |

| | | | | |
|----|-------------------------------|----------------------|------------------|---------|
| ۳۳ | <i>Euphorbia helioscopia</i> | فرفیون شماطه | Euphorbiacea | یکساله |
| ۳۴ | <i>Euphorbia peplus</i> | فرفیون پیلوسی | Euphorbiacea | یکساله |
| ۳۵ | <i>Equisetum arvensel</i> | دماسب | Equisetaceae | یکساله |
| ۳۶ | <i>Erigeron canadensis</i> | پیربهار کانادایی | Asteraceae | یکساله |
| ۳۷ | <i>Fillago sp.</i> | فیلاگو | Asteraceae | یکساله |
| ۳۸ | <i>Galium aparine</i> | بی‌تی‌راخ | Rubiaceae | یکساله |
| ۳۹ | <i>Galium sp.</i> | گونه‌ای بی‌تی‌راخ | Rubiaceae | یکساله |
| ۴۰ | <i>Geranium sp.</i> | شمعدان وحشی | Geraniaceae | یکساله |
| ۴۱ | <i>Hordeum vulgaris</i> | گونه‌ای جو وحشی | Poaceae | یکساله |
| ۴۲ | <i>Hordeum probibly</i> | جو وحشی | Poaceae | یکساله |
| ۴۳ | <i>Hypericum androsaemum</i> | متامتی | Hypericaceae | چندساله |
| ۴۴ | <i>Helianthus tuberosus</i> | سیب‌زمینی ترش | Asteraceae | یکساله |
| ۴۵ | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> | قدح مریم | Hypericaceae | یکساله |
| ۴۶ | <i>Hypericum perforatum</i> | گل راعی | Hypericaceae | یکساله |
| ۴۷ | <i>Lolium temolatum</i> | چجم | Poaceae | یکساله |
| ۴۸ | <i>Lotus corniculatus</i> | یونجه باغی | Fabaceae | چندساله |
| ۴۹ | <i>Laminum album</i> | گزنه سفید | Lamiaceae | یکساله |
| ۵۰ | <i>Juncos sp.</i> | سازو | Juncaceae | یکساله |
| ۵۱ | <i>Myosotis spp.</i> | گل فراموش مکن | Graminaceae | یکساله |
| ۵۲ | <i>Oplismenus compositus</i> | ارزن جنگلی | Poaceae | یکساله |
| ۵۳ | <i>Oxalis corniculata</i> | شبدر ترشک | Oxalidaceae | یکساله |
| ۵۴ | <i>Poa annua</i> | علف‌چمنی | Poaceae | یکساله |
| ۵۵ | <i>Paspalum distichum</i> | بندواش آبزی | Poaceae | یکساله |
| ۵۶ | <i>Paspalum dilatatom</i> | بندواش خشکزاری | Poaceae | یکساله |
| ۵۷ | <i>Polypogon sp.</i> | چمن ریش | Poaceae | یکساله |
| ۵۸ | <i>Polygonum sp.</i> | علف هفت‌بند | Polygonaceae | چندساله |
| ۵۹ | <i>Polygonum avicularel</i> | علف هفت بند مرغان | Polygonaceae | یکساله |
| ۶۰ | <i>Potentilla reptans</i> | پنج انگشتی | Rosaceae | یکساله |
| ۶۱ | <i>Plantago major</i> | بارهنگ | Plantaginaceae | یکساله |
| ۶۲ | <i>Papaver sp.</i> | شقاقیق | Papaveraceae | یکساله |
| ۶۳ | <i>Phytolaca americana</i> | سرخاب کولی | Phytollaceae | چندساله |
| ۶۴ | <i>Phleum pratens</i> | لوئیچه چمنی | Poaceae | یکساله |
| ۶۵ | <i>Rumex acetosella</i> | ترشک کوچک | Polygonaceae | چندساله |
| ۶۶ | <i>Rumex crispus</i> | ترشک | Polygonaceae | چندساله |
| ۶۷ | <i>Rhynchosciurus elephas</i> | گل‌فیل یا آتشک | Scrophulariaceae | یکساله |
| ۶۸ | <i>Rapistum grugusum</i> | سلمی | Cruciferae | یکساله |
| ۶۹ | <i>Rhaphanus raphanistrum</i> | تریچه وحشی | Cruciferae | یکساله |
| ۷۰ | <i>Rubus fruticosas</i> | تمشک باغ‌های کوهپایه | Rosaceae | چندساله |
| ۷۱ | <i>Silvia vigata</i> | مریم‌گلی | Labiateae | چندساله |
| ۷۲ | <i>Scutellaria sedum</i> | عرق‌چن سگ | Saxifragaceae | چندساله |
| ۷۳ | <i>Scatellaria sp.</i> | بشقاوی | Lamiaceae | یکساله |
| ۷۴ | <i>Setaria viridis</i> | دمروباھی سبز | Poaceae | یکساله |

| | | | | |
|----|---------------------------------|-------------------|------------------|---------|
| ۷۵ | <i>Setaria glauca</i> | دمورباهی زرد | Poaceae | یکساله |
| ۷۶ | <i>Setaria faberi</i> | دمورباهی بلند | Poaceae | یکساله |
| ۷۷ | <i>Sinapis arvensis</i> | خردل وحشی | Crucifereae | یکساله |
| ۷۸ | <i>Solanum nigrum</i> | تاجریزی | Solanaceae | یکساله |
| ۷۹ | <i>Sombucus ebulus</i> | اقطی | Caprifoliaceae | چندساله |
| ۸۰ | <i>Scrophularia</i> sp. | گل‌میمون | Scrophulariaceae | چندساله |
| ۸۱ | <i>Sanchus aspera</i> | شیرک زبر | ASteraceae | یکساله |
| ۸۲ | <i>Sanchus oleraceus</i> | شیرک نرم | ASteraceae | یکساله |
| ۸۳ | <i>Tradescantia flumenensis</i> | بیهودی سرگردان | commelinaceae | چندساله |
| ۸۴ | <i>Trifolium</i> sp. | شبدر | Papilionaceae | چندساله |
| ۸۵ | <i>dioica Urtica</i> | گزنه دوپایه | Urticaceae | یکساله |
| ۸۶ | <i>Vicia villosa</i> | ماشک گل‌خوشیده‌ای | Papilionaceae | یکساله |
| ۸۷ | <i>Veronica anagallis</i> | سیزاب | Lamiaceae | یکساله |
| ۸۸ | <i>Veronica persica</i> | سیزاب باغی | Scrophylariaceae | یکساله |
| ۸۹ | <i>Viola</i> sp. | بنفسه | Violaceae | یکساله |
| ۹۰ | <i>Vulpia myuros</i> | گونه‌ای دمورباهی | Poaceae | یکساله |
| ۹۱ | <i>Verbascum punalense</i> | گل ماهور | Scrophylariaceae | چندساله |

جدول (۲) علف‌های هرز مهم باغ‌های چای

| ردیف | نام علمی | نام فارسی | خانواده | سیکل زندگی | درصد تراکم |
|------|------------------------------|----------------------|----------------|------------|------------|
| ۱ | <i>Oplismenus compositus</i> | ارزن جنگلی | Poaceae | یکساله | ۶۵ |
| ۲ | <i>Convolvulus sepium</i> | پیچک صحرایی | Convolvulaceae | چندساله | ۵۵ |
| ۳ | <i>Convolvulus arvensis</i> | گونه‌ای پیچک صحرایی | Convolvulaceae | چندساله | ۵۵ |
| ۴ | <i>Potentilla reptans</i> | پنج انگشتی | Rosaceae | چندساله | ۶۰ |
| ۵ | <i>Anagallis arvensis</i> | رازیانه قرمز | Primulaceae | چندساله | ۶۵ |
| ۶ | <i>Erigeron canadensis</i> | پیربهار کانادایی | ASteraceae | یکساله | ۵۵ |
| ۷ | <i>Paspalum dilatatum</i> | بندواش خشکزی | Poaceae | چندساله | ۶۰ |
| ۸ | <i>Paspalum disticum</i> | بندواش آبزی | Poaceae | چندساله | ۷۰ |
| ۹ | <i>Cyperus esculentus</i> | اویارسلام زرد | Cyperaceac | چندساله | ۶۵ |
| ۱۰ | <i>Acalypha australis</i> | ساسواش برگ‌نقره‌ای | Euphorbiacea | یکساله | ۶۵ |
| ۱۱ | <i>Rubus fruticosas</i> | تمشک باغ‌های کوهپایه | Rosaseae | چندساله | ۵۵ |
| ۱۲ | <i>poa annua</i> | علف چمنی | Poaceae | یکساله | ۶۵ |
| ۱۳ | <i>Setaria viridis</i> | دمورباهی بلند | Poaceae | یکساله | ۶۰ |

هرز دارای تراکم بیش از ۵۰ درصد بوده که به احتمال زیاد می‌توانند به عنوان علف‌های هرز غالب معرفی شوند. بررسی اکولوژی جمعیت علف‌های هرز باید بدفواصل زمانی نزدیک انجام گیرد تا شناخت کافی از توالی علف‌های هرز و گونه‌های غالب داشته باشیم.

نتیجه‌گیری کلی

در این تحقیق، ۹۱ گونه علف هرز متعلق به ۲۵ خانواده گیاهی شناسایی شدند. خانواده‌های پوآسه (Poaceae) و آستراسه (Astraceae) به ترتیب با داشتن ۱۵ و ۹ گونه گیاهی جزو فراوان‌ترین خانواده‌های گیاهی در فلور علف‌های هرز باغ‌های چای ایران هستند. ۱۳ گونه علف

پیام ترویجی

شناساندن جامعه علف هرز باغ‌های چای به ویژه علف‌های هرز مهم به چایکاران ضروری است و پیشنهاد می‌شود در قالب کلاس‌های آموزشی و ترویجی معرفی صورت پذیرد. همچنین تهیه یک نقشه جامع علف‌های هرز در یک منطقه به منظور طراحی مدیریت تل斐قی مناسب مبارزه با علف‌های هرز برای جامعه چای‌کاران، توسط محققان و کارشناسان پژوهشکده چای موسسه تحقیقات علوم باغبانی و سازمان چای کشور توصیه می‌شود.

فهرست منابع

- اصغری، ج. و محمودی، الف. (۱۳۷۵). علف‌های هرز مرتع و زراعت‌های ایران. دانشگاه گیلان، ۱۵۶ ص.
- پادارلو، ع.، بازوبندی، م. و علیمرادی، ل. (۱۳۸۶). شناسایی علف‌های هرز مزارع زعفران حوزه سد کاردہ مشهد. دومین همایش علوم علف هرز ایران، مشهد، ص ۶۰-۶۲.
- حسین‌نیا، الف.، بازوبندی، م.، اخوان، م.، کریمی، م. و آرین، ه. (۱۳۸۶). تاثیر تراکم‌های مختلف علف هرز تاج خروس بر پارامترهای کمی و کیفی چندر قند. دومین همایش علوم علف هرز ایران، مشهد، ص ۲۰-۲۶.
- دانشیان، ج. (۱۳۸۲). اکولوژی. انتشارات دیاگران، ۲۸۸ ص.
- کوچکی، ع.، ظریف‌كتایی، ح. و نخفروش، ع. (۱۳۸۰). رهیافت‌های اکولوژیکی مدیریت علف‌های هرز. دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۶۲ ص.
- مین‌باشی‌معینی، م. (۱۳۸۱). شاخص‌های کمی برای تعیین غالبیت علف‌های هرز و دینامیسم جمعیت آن‌ها. هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج، ص ۶۵۹.
- محمدشریفی، مسلم. (۱۳۷۲). علف‌های هرز چای و زیان اقتصادی آن‌ها در گیلان. خلاصه مقالات یازدهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران، رشت، ص ۱۷۵.

- Barbara, D., Stephen, D. and Swanton, C. J. (2003). Weed ecology in natural and agricultural system. CABI publishing, 511p.
- Gosh Hajra, N. (2001). Tea cultivation comprehensive. Treatise International Book, Distributive Company, India, 518p.
- Ilango, R. and Victor, J. (2005). Weed flora in south Indian field Himakala. *Economic and Taxonomic Botany*, **29** (3): 491-503.
- Ilango, R.V. J., Styalarayana, N., Mathew, N. M., Kuruvilla, C., Licy, J., Menatoor, R. and Thomas, K. (1998). Influence of certain weed species on froth of young tea. The^{12th} Symposium on Plantation Crops, Indian, Pp., 167-169.
- Ptter, J. R. and Jones, J. W. (1977). Leaf area portioning as an important factor in growth. *Plant physiology*, **59**: 10-14.
- Prematilake, K. G., Froud, W. R. J. and Ekanayake, P. B. (2004). Weed infestation and tea growth in a young tea plantation. *Weed Biology and Management*, **4**: 239 – 248.
- Rajkhowa, D. J., Burua, I. C., Bhuyan, R. P. and Dyadurahu, N. T. (2005). Weed management in tea. National Research Center for Weed Science, Jabalpur, 25p.
- Singh, R. D., Sinha, B. K., Sud, R. K. Tamany, M. B. and Chakrabarty, D. N. (1994). Weed flora in tea plantation of Himachal Pradesh. *Journal of Economic and Taxonomic Botany*, **18** (2): 399- 418.
- Sana, P. L. (1989). Tea science. Bangle Bazaar Bangladesh, 391p.
- White, A. M. (1996). *Mikania scandens* a new record. *Tea Research Foundation of Central Africa*, **122**: 20 – 22.