

**Research Article****The effect of different seed dormancy breaking treatments on optimizing seed germination of *Echinophora platyloba*****Behrooz Salehi-Eskandari^{1*} , Farzaneh Aslani²**

1. Assistant Professor, Department of Biology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2. MSc Graduate, Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Shahid Behashti, Tehran, Iran.

Article Information

Received: 27 Feb. 2024

Revised: 26 May 2024

Accepted: 27 May 2024

Keywords:

Gibberellic Acid,
GA3,
Moist chilling,
Scarification,
Seed germination

Corresponding Author:
behsalehi@pnu.ac.ir**Abstract**

Echinophora platyloba is an aromatic perennial plant belonging to the family Apiaceae which is used as food seasoning and persevering in Iran and the shoots have medicinal properties. This study aimed to investigate treatments of moist chilling (0, 30, 45, 70, and 90 days), gibberellic acid (GA₃; 0, 500, 1000, and 2000 mg/L), and scarification alone or a combination of these treatments for breaking seed dormancy of *E. platyloba*. The dormancy of the seeds was broken only after 90 days of moist chilling. Pretreatment GA only at the highest level (2000 mg/L) could induce seed germination (GP; 33%). The highest GP (50%) and germination index (GR; 3 seeds per day) was recorded in moist chilling treatment 45 days with GA₃ treatment of 1000 mg/L. The lowest GR was related to moist chilling treatment for 90 days and moist chilling treatment for 30 and 70 days with GA₃ treatments of 500 and 2000 mg/L. The scarification treatment alone or combined with other treatments does not affect germination parameters.

How to cite this paper: Salehi-Eskandari, B., & Aslani, F. (2025). The effect of different seed dormancy breaking treatments on optimizing seed germination of *Echinophora platyloba*. *Iranian Journal of Seed Science and Technology*, XX (X), X-X.
<https://doi.org/10.22092/ijsst.2024.365118.1516>

© Authors, Published by Iranian Journal of Seed Science and Technology. This is an open-access article distributed under the CC BY (license <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

EXTENDED ABSTRACT

Introduction

Climate changes, soil erosion, drought periods, overexploitation as well as over-grazing have led to the degradation of many Iranian rangelands. Degradation rangeland amendment, including re-seeding, oversowing, and planned rotational grazing can improve soil seed-bank and it is necessary to know the wants of seeds to breaking dormancy. *Echinophora platyloba* is an aromatic perennial plant belonging to the family Apiaceae which is used as food seasoning and persevering in Iran and the shoots have medicinal properties. This plant grown in some areas of the Zagros and Alborz Mountains. *E.platyloba* is used as an aromatic medicinal herb in Iranian traditional medicine as a food flavoring in dairy products such as yogurt and cheese. its main usage is as an antifungal preservative agent for preventing the fungal growth and antibacterial on some traditional made foods. This study aimed to investigate treatments of moist chilling (15, 30, 45, 70, and 90 days), gibberellic acid (GA_3 ; 0, 500, 1000, and 2000 mg/L), and scarification alone or a combination of these treatments for breaking seed dormancy of *E. platyloba*

Materials and Methods


Seeds of *E. platyloba* were collected from at least 40 plants growing in the western region of Isfahan. These seeds were then stored in paper bags and kept in a refrigerator. Seeds were disinfected using sodium hypochlorite (bleach with 1% active chlorine) for 15 min, washed three times in distilled water, and germinated in the Petri dishes with deionized water. To investigate seed germination factors, we tested various treatments, including moist chilling (15, 30, 45, 70, and 90 days), GA_3 (gibberellic acid) concentrations (0, 500, 1000, and 2000 mg/L), and scarification, both alone and in combined. Experiments were done in a factorial randomized complete block design with at least three replicates with 20 seeds each in Petri dishes.

Result and Dissuasion

Since the scarification treatment alone or combined with other treatments does not affect germination parameters, we focused on reporting the results of moist chilling, GA_3 , and their combined treatments. Seed dormancy was broken only after 90 days of moist chilling. Therefore, *E. platyloba* seeds have morphophysiological dormancy. Pretreatment with GA_3 only induced germination with germination percentage (GP: 33%) at the highest concentration (2000 mg/L). The relatively low rate of germination of non-cold stratification of *E. platyloba* seeds may be due to a high concentration of abscisic acid (ABA) and a low concentration of GAs within the seeds. The highest GP (50%) and germination index (GR; 3 seeds per day) was recorded in moist chilling treatment for 45 days with GA_3 treatment of 1000 mg/L. The lowest GR was related to moist chilling treatment for 90 days and moist chilling treatment for 30 and 70 days with GA_3 treatments of 500 and 2000 mg/L. Our results confirm that GA_3 could substitute cold stratification. It has been reported that moist chilling increases GA biosynthesis, and suppresses GA catabolism at the same time. Germination of the seeds inside the schizocarp fruit was inhibited. This result supports the hypothesis that the pericarp acts by providing both mechanical resistances to seed imbibition as well as chemical inhibitors. Then the pericarp has an important role in seed dispersal.

Conclusions

Our results show that *E. platyloba* seeds exhibit morphophysiological dormancy, with chemical inhibitors in the pericarp playing an important role in seed dispersal. Removal of the pericarp, followed by moist chilling at 4–5°C for 45 days in the presence of GA_3 -1000 mg/L is an effective strategy to improve seed germination.



اثر تیمارهای مختلف خواب شکنی بر بهینه‌سازی جوانه‌زنی بذرهای خوشاریزه (*Echinophora platyloba*)

بهروز صالحی اسکندری^{۱*}, فرزانه اصلانی^۲

۱. استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
۲. دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

اطلاعات مقاله

چکیده

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

خوشاریزه، گیاهی علفی چند ساله و معطر از خانواده چتریان است که از برگ‌های آن به عنوان چاشنی و نگهدارنده

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۳/۰۶

مواد غذایی استفاده می‌کنند و اندام هوایی آن دارای خاصیت دارویی است. هدف از این تحقیق، بررسی تیمارهای

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۳/۰۷

سرماده‌ی مرطوب (۰، ۳۰، ۴۵، ۷۰ و ۹۰ روز)، اسید جیرلیک (۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر)،

واژه‌های کلیدی:

خراش دهی به تنهایی و ترکیب هم‌زمان این تیمارها جهت شکست خواب بذرهای خوشاریزه است. خواب بذرها

جوانه‌زنی،

فقط پس از سرماده‌ی مرطوب ۹۰ روزه شکسته شد و پیش‌تیمار جیرلیک تنها در بالاترین غلظت توانست باعث

سرماده‌ی مرطوب،

جوانه‌زنی ۳۳ درصدی بذرها شود. بالاترین درصد (۵۰ درصد) و سرعت جوانه‌زنی (۳ دانه در روز) در تیمار

جیرلیک،

سرماده‌ی مرطوب در تیمار ۴۵ روزه به همراه تیمار جیرلیک ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر حاصل شد. کمترین سرعت جوانه‌زنی

خراش دهی

در تیمارهای سرماده‌ی ۹۰ روزه، جیرلیک ۵۰۰ و ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر به ترتیب توان با سرماده‌ی مرطوب و

نویسنده مسئول:

روزه حاصل شد. تیمار خراش دهی به تنهایی یا توان با دیگر تیمارها اثری بر جوانه‌زنی بذرها نداشت. بذرها

behsalehi@pnu.ac.ir

موجود در پوشش میوه شیز و کارپ نتوانستند جوانه‌زنی نمایند. با توجه به نتایج حاصل، خواب بذرهای خوشاریزه

ترکیبی از خواب فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی است و پوشش میوه دارای ترکیبات بازدارنده شیمیایی است که

پراکنش بذرها را تسهیل می‌نماید.



نحوه استناد به این مقاله:

Salehi-Eskandari, B., & Aslani, F. (2025). The effect of different seed dormancy breaking treatments on optimizing seed germination of *Echinophora platyloba*. *Iranian Journal of Seed Science and Technology*, XX (X), X-X.
<https://doi.org/10.22092/ijsst.2024.365118.1516>

مقدمه

را تغییر می‌دهد. این گیاه در اغلب نقاط کوهستانی البرز و زاگرس رویت شده است (Avijgan & Mahboubi, 2015). این جنس در ایران دارای چهار گونه معطر است که دو گونه *E. cinerea* Boiss. و *E. platyloba* DC. بومی (اندیمیک) ایران هستند و گونه‌های دیگر *E. orientalis* Hedge et Lamond و *E. sibthorpiana* بجز ایران در کشورهای روسیه، ارمنستان، یونان، سوریه، جزیره بالکان، ترکمنستان، افغانستان و قبرس نیز می‌رویند (Mozaffarian, 1996) از دیگر نام‌های محلی خوشاریزه، می‌توان به خوشاروز، کشندر، تیغ توراغ (Mozaffarian, 1996)، فیاله (Delaram & Haeri 2011)، تولوغ (Avijgan & Mahboubi, 2015) و تنگ زند (Avijgan & Mahboubi, 2015) اوتی (علف مشک) و تنگ زند (Avijgan & Mahboubi, 2015) اشاره کرد.

خوشاریزه (*Echinophora platyloba*) به شکل ستیجهٔ معطر کردن غذا استفاده می‌گردد. قسمت‌های هوایی این گیاه به صورت تازه و خشک به عنوان چاشنی به پنیر و ماست افزوده می‌شود. (Sadraei et al., 2003). همچنین خاصیت ضد قارچی (Avijgan & Mahboubi 2015; Majid et al., 2010) و آنتی‌باکتریایی (Pilevar et al., 2017; Sharafati-chaleshtori et al., 2012) نیز از آن گزارش شده است. از عصاره این گیاه جهت کاهش شدت و علایم سندروم پیش از قاعدگی و استفاده می‌کنند (Delaram & Haeri, 2011).

بذرهای گونه‌های گیاهی که در شرایط مساعد محیطی نتوانند جوانه‌زنی کنند را بذرهای خواب یا خفته^۱ می‌نامند (Archana et al., 2023). انواع خواب بذرهای عبارتند از: فیزیولوژیک (PD²), مرفوولوژیک (MD³), مرفوفیزیولوژیک (MPD⁴), فیزیکی (PY⁵) و ترکیبی^۶ (PY + PD) (Baskin & Baskin, 2004). خواب فیزیولوژیک ناشی از جنبین دانه است که اغلب به سه سطح عمیق، متواتر و غیرعمیق تقسیم شده (Archana et al., 2023) که خواب فیزیولوژیک عمیق معمولاً با سرمادهٔ مرطوب^۷ ۳ الی ۴ ماه بذرها برطرف می‌شود و جیرلین می‌تواند جوانه‌زنی بذرهای

و سعی مراعع ایران در سال ۱۳۴۴ حدود ۹۴ میلیون هکتار بوده که با تخریب و بهره برداری نادرست از آنها این عرصه در سال ۱۳۷۸ به حدود ۸۶ میلیون هکتار کاهش یافته است و امروزه این وسعت به حدود ۸۴ رسیده است (Esmaeili et al., 2021). اجیای مراعع تخریب شده و جایگزین کردن جوامع گیاهی بومی آن با مشکلات و هزینه‌های فراوان همراه است که در این راستا آگاهی از زمان کشت و توجه به نیاز دمایی گیاهان و تغییرات دمایی منطقه می‌تواند منجر به افزایش درصد جوانه‌زنی بذرها شود و در نهایت بهره‌وری را ارتقاء دهد (Cerabolini et al., 2004). بنابراین کشت بذرهای نادر مختص مناطق محدود در شرایط آزمایشگاهی و سنجش نیازهای اولیه آنها برای جوانه‌زنی، تضمین کننده رشد بقاء آنها را در عرصه طبیعی است (Salehi-Eskandari et al., 2017).

خانواده چتریان (Apiaceae) در دنیا دارای ۴۲۳ جنس و ۳۰۰ گونه است (Baskin et al., 1992) که در ایران، ۳۶۰ گونه و ۱۲۱ جنس مختلف از این خانواده رویش می‌نمایند و با توجه تنوع اقلیمی منحصر به فرد ایران، ۱۲۲ گونه از آنها بومی این سرزمین است (Emami & Aghazari, 2010). خوشاریزه (*Echinophora platyloba*) گیاهی علفی چند ساله معطر از خانواده چتریان (Umbelliferae)، زیرخانواده Apoideae و قبیله Echinophoreae است (Avijgan et al., 2010). ارتفاع ساقه این گیاه ۲۰ تا ۵۵ سانتی‌متر، با برگ‌های خاردار که برگ‌های قاعده‌ای نسبت به برگ‌های بالایی بزرگ‌تر و تعداد لوبهای بیشتری است (Mozaffarian, 2017). گلازین چتر آن، دارای گل‌های زرد رنگ، حاوی یک یا دو میوه‌ی کشیده (سلیندری شکل) است که اغلب در خاک‌های شنی و در ارتفاع ۱۴۰۰ تا ۲۰۰۰ متر بالاتر از سطح دریا رویش کرده و دوره رویش آن از اوایل شهریور تا اوسط آبان ماه ادامه می‌یابد سپس دوره خواب آن شروع می‌شود. البته تغییرات دمایی و ارتفاع، دوره رویش آن

¹ Dormant seed

² Physiological dormancy

³ Morphological dormancy

⁴ Morphophysiological dormancy

⁵ Physical dormancy

⁶ Combinational dormancy

⁷ Moist chilling or stratification

هفت‌های به همراه هورمون‌های گیاهی GA_3 (جیرلین)، BA (بتریل آدنین)، IBA (ایندول بوتیریک اسید) و ترکیب هر سه آنها افزایش یافت که خواب فیزیولوژیک در بذرهای کرفس کوهی را ثابت می‌نماید (Tabatabaeian & Kadkhodaee, 2019). در صد جوانه‌زنی بذر زیره سیاه (*Bunium persicum*) نیز با سرماده‌ی مرطوب ۶۰ روزه و استفاده توام از هورمون‌های جیرلین $6.3 \mu\text{mol L}^{-1}$ TDZ² (۱۰ $\mu\text{mol L}^{-1}$ BAP، $100 \mu\text{mol L}^{-1}$ L) از ۱۱ به ۹۳ درصد افزایش یافت (Chauhan et al., 2023).

محققین دریافتند، تیمار سرماده‌ی مرطوب به مدت ۴۵ روز را بهترین تیمار برای افزایش جوانه‌زنی (تا ۹۸ درصد) بذرهای *Echinophora cinerea* معرفی کردند (Esmaeili et al., 2021).

با توجه افزایش شخم بی‌رویه مراتع جهت کشت دید، برداشت بی‌رویه گیاه از مراتع و تغییر الگوهای بارش که ممکن است منجر به خشکسالی و حذف گونه‌های نادر شود و نیز با در نظر گرفتن خواص درمانی و غذایی گیاه خوشاریزه ضروری است تا مطالعات گسترشده‌ای در زمینه شکستن خواب بذر و زارت آن انجام شود. در همین راستا در پژوهش حاضر تاثیر انواع تیمارها مختلف جهت رفع خواب و بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی در گیاه خوشاریزه مورد بررسی گرفت.

مواد و روش‌ها

بذرهای خوشاریزه (*Echinophora platyloba*) در آبان ماه سال ۱۴۰۱ از فریدن، واقع در غرب استان اصفهان با عرض جغرافیایی 32° درجه و 84° دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 50° درجه و 43° دقیقه شرقی با ارتفاع ۲۱۲۵ متر (از سطح دریا) از حداقل 40° گیاه مادری جمع‌آوری شد. پس از جداسازی پوسته چوبی، بذرها شکسته شده و بذرهای آسیب دیده، بذرهای سالم جهت انجام آزمایش‌ها در پاکت‌های کاغذی درون یخچال نگهداری شدند. آزمایش‌ها در ابتدا از تیمارهای مختلف شکست خواب از آزمون قبل از استفاده از تیمارهای اطمینان از زنده‌مانی بذرها استفاده شد. جهت شکست خواب بذرهای (جدا شده از میوه) تیمارهای سرماده‌ی مرطوب، اسید جیرلینیک (GA_3) و ترکیب هم‌زمان این تیمارها

دارای خواب فیزیولوژیک متوسط و غیرعمیق را تحریک نماید (Baskin & Baskin, 2004). جنین نارس موجب ایجاد خواب مرفوولوژیک شده که نمو بذرها در دوره خواب کامل می‌شوند (Archana et al., 2023; Baskin & Baskin 2004).

خواب فیزیکی حاصل، پوشش دانه، میوه یا ترکیب آنهاست که جذب آب و تبادلات هوایی را محدود می‌نماید (Baskin & Baskin, 2005).

تیمارهای متعددی جهت جوانه‌زنی بذرها دارای خواب ارائه شده که شامل نگهداری آن‌ها در جای خشک (برطرف کردن خواب مرفوولوژیک یا MD^2 ، قرار دادن در نور یا تاریکی، سرماده‌ی سرماده‌ی مرطوب^۷، Salehi-Eskandari & Kaviani, 2021)، تیمار جیرلین به تنها یا سرماده‌ی توام با جیرلین (Barreto et al., 2016; Salehi-Eskandari et al., 2017) استفاده از قراردادن بذرها در آب جوش (۹۰ درجه سلسیوس)، روش‌های فیزیکی (خراش‌دهی^۱، شیمیایی (اسید سولفوریک، الکل و استن) و آنزیمی (سلولاز، پکتیناز) نفوذپذیری پوشش دانه افزایش می‌یابد (Archana et al., 2023).

بذرهای بسیاری از گونه‌های گیاهی در خانواده چتریان دارای رویان (جنین) خطی هستند که نموشان کامل نشده و با طی دروه خفتگی، می‌توانند جوانه‌زده و رویش نمایند. بذرهای گونه‌های گیاهی در این خانواده ممکن است دارای خواب MD (مرفوولوژیک) یا MPD ترکیب از خواب (فیزیولوژیک با مرفوولوژیک) باشند (Zhang et al., 2023). بذر گیاهان *Torilis* (Baskin & Baskin, 1990) *Angelica glauca* (Baskin & Baskin, 2006) *nodosa* *Chaerophyllum procumbens* (Nikolaeva, 1985) *Bupleurum aureum* (2004) *Trepocarpus aethusae* (Baskin et al., 2003) *Cenolophium denudatum* (Rosbakh et al., 2020) دارای خواب MD و بذر MPD می‌باشند.

جوانه‌زنی بذرهای کرفس کوهی توده کوهرنگ^۲ با سرماده‌ی مرطوب^۸ (*Kelussia odoratissima* Mozaff)

¹ Scarification

² تیدیازورن (نوع هورمون سیتوکینین)

$$GP = \frac{\sum ni}{\sum Di} \times 100 \quad \text{رابطه ۲}$$

ni در این رابطه، تعداد بذر جوانه زده در هر روز و Di شماره روز پس از شروع انتقال پتری‌ها به ژرمیناتور است. زمان متوسط جوانه‌زنی (MGT) از رابطه ۳ تعیین شد (Salehi-Eskandari et al., 2024).

$$MGT = \frac{\sum Dn}{\sum n} \times 100 \quad \text{رابطه ۳}$$

که در این رابطه D تعداد روز پس از شروع جوانه‌زنی و n تعداد بذر جوانه‌زنده در روز MGT است (Ellis & Roberts, 1981).

تحلیل آماری

آزمایش‌ها با حداقل سه تکرار انجام شد و با سه عامل سرماوهی مرطوب، جیرلین (GA₃) و خراشدهی با استفاده از نرم افزار 26 SPSS و با آزمون Two-way ANOVA و Three-way ANOVA تحلیل شدند. تجزیه و تحلیل و میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن و در سطح احتمال کمتر از پنج درصد مقایسه شدند جهت رسم نمودارها از نرم افزار Excel استفاده شد.

نتایج و بحث

اثر مدت زمان سرماوهی مرطوب، غلظت جیرلین و همچنین برهکنش آنها بر درصد جوانه‌زنی در سطح احتمال کمتر از یک دهم درصد معنی دار شد (جدول ۱). اثر تیمارهای مختلف سرماوهی مرطوب بر درصد جوانی بذرهای خوشاریزه در شکل ۱، نشان داد که فقط سرماوهی مرطوب ۹۰ روزه می‌تواند موجب جوانه‌زنی ۲۲ درصدی بذرها شود و تیمارهای سرماوهی مرطوب کمتر از ۹۰ روز تاثیری در جوانه‌زنی آنها نداشت. غلظت ۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر جیرلین نیز اثری بر شکست خواب بذرها نداشت اما غلظت‌های بالاتر موجب افزایش معنی دار جوانی زنی بذرها شد ۲۰۰۰ (P<0.05). به طوری که میزان جوانه‌زنی بذر در غلظت ۲۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر جیرلین (۳۳/۳ درصدی) دو برابر غلظت ۱۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر جیرلین (۱۶/۸ درصدی) بود. سرماوهی مرطوب ۳۰ روزه فقط در غلظت‌های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر جیرلین باعث جوانه بذرها شد که این دو غلظت از لحاظ آماری

اعمال شد. تیمارهای سرماوهی مرطوب به مدت ۱۵، ۴۵، ۳۰، ۷۰ و ۹۰ روز در دمای ۴ درجه سلسیوس و GA₃ در سه سطح (۵۰۰ و ۲۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر) بود.

جهت برطرف کردن خواب دانه‌ها از تیمار خراشدهی به تنهایی و ترکیب آن با همان تیمارهای سرماوهی مرطوب و GA₃ استفاده شد. در آزمایش دیگر، اثر پوشش میوه شیزوکارپ بر جوانه‌زنی دانه با همان تیمارهای سرما بررسی شد. اما با توجه به این که هیچ کدام از دانه‌های درون میوه شیزوکارپ و دانه‌های با تیمارهای مختلف دارای خراشدهی نتوانستند جوانه‌زنی کنند صرف نتایج تیمارهای سرماوهی مرطوب، اسید جیرلیک (GA₃) و ترکیب آنها بررسی شد.

جهت انجام آزمایش‌ها، بذرها با هیپوکلریت سدیم ۵ درصد به مدت ۲۰ دقیقه عفنونی شده و پس از آن با آب م قطر چندین بار شستشو گردیدند. در این آزمایش‌ها برای هر تیمار ۳ تکرار در نظر گرفته شد و تعداد بذرها در هر پتری ۲۰ عدد بذر بود. به منظور اعمال تیمارهای جیرلین بذرها به مدت ۲۴ ساعت در تیمارهای مختلف GA₃ و در شرایط تاریکی قرار گرفتند (Abbasi sourki et al., 2019). پس از آن بذرها به پتری‌های حاوی آب م قطر منتقل شدند و به مدت ۲۰ روز در اتاق رشد تحت دمای دمای 25 ± 2 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۸۰ درصد در دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی قرار داده شدند.

برای محاسبه شاخص‌های جوانه‌زنی بذرها پس از اعمال تیمارها ذکر شده به مدت ۲۰ روز در اتاق رشد با دمای 25 ± 2 سلسیوس قرار گرفتند و میزان جوانه‌زنی دانه‌ها در هر تیمار روزانه ثبت شده تا بتوان با آنها شاخص‌های جوانه‌زنی محاسبه کرد. معیار جوانه‌زنی خروج ریشه‌چه حداقل به اندازه ۲ میلی‌متر از بذر در نظر گرفته شد. از رابطه ۱ درصد جوانه‌زنی (FGP¹) محاسبه شد (Salehi-Eskandari & Kaviani, 2021).

$$GP = \frac{n}{N} \times 100 \quad \text{رابطه ۱}$$

در این رابطه، تعداد بذر جوانه‌زنده و N، تعداد کل بذرها است. سرعت جوانه‌زنی نیز از رابطه ۲ حاصل شد (Maguire, 1962; Salehi-Eskandari et al., 2024).

¹ Final Germination Percentage

سرمادهی مرطوب ۹۰ روزه به همراه جیرلین فقط در پایین ترین غلظت جیرلین (۵۰۰ میلی گرم در لیتر) توانست موجب جوانهزنی ۴۱/۶ درصد بذرهای خوشاریزه شود. بر طبق این یافته خواب بذرهای خوشاریزه نوعی خواب فیزیولوژیکی نیمه عمیق است که توسط سرمادهی طولانی مدت (۹۰ روزه) یا جیرلین برطرف می‌گردد (Rouhi et al., 2010).

اختلاف معنی داری نداشتند ($P > 0.05$). سرمادهی مرطوب ۴۵ روز توام با جیرلین ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر جیرلین به ترتیب موجب جوانهزنی ۴۰/۷، ۵۰ و ۲۴ درصدی بذرهای خوشاریزه شد که از لحاظ آماری با هم اختلاف معنی دار نداشتند ($P < 0.05$) و بالاترین درصد جوانهزنی در این آزمایش‌ها متعلق به تیمار سرمادهی مرطوب ۴۵ روزه توام با جیرلین ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر (۵۰ درصد) بود.

جدول ۱- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف بر صفات جوانهزنی خوشاریزه (*Echinophora platyloba*)

Table 1- Analysis of variance of the effect of different treatments and their interaction on germination parameters in *Echinophora platyloba*.

منابع تغییرات Source of variance	درجه آزادی df	متوجه مربعات Mean square			متوجه زمان جوانهزنی MGT
		درصد جوانهزنی GP	سرعت جوانهزنی GI		
جیرلین	3	866.98***	3.297***	20.11***	
GA ₃					
سرمادهی مرطوب	4	758.9***	2.99***	2.83***	
Moist chilling					
جیرلین × سرمادهی مرطوب	12	821.39***	2.02***	24.52***	
GA ₃ × Moist chilling					
خطای آزمایش	80	15.58	0.05	0.182	
Error					

*** نشان‌دهنده معنی دار بودن در سطح احتمال کمتر از ۰/۱ درصد


*** showed significant at $p < 0.001$.

سلسیوس) سپس انتقال بذرها به دمای محیطی با حداقل ۱۵ و حداقل ۲۵ درجه سلسیوس باعث جوانهزنی آنها شد. قابل ذکر است در این دوره اندازه جنین افزایش قابل توجه داشت که نشان‌دهنده نارس بودن رویان و خواب مرفوولوژیک (MD) است که در دیگر جنس‌های این خانواده هم گزارش شده است (Ahmad et al., 2009; Khan et al., 2023) (Zhang et al., 2023) قبل از بلوغ می‌توان با تیمار جیرلین وادر به جوانهزنی کرد خواب پیشنهاد شده را ترکیبی از خواب MPD (فیزیولوژیک با مرفوولوژیک) معرفی کرده‌اند (Zhang et al., 2023).

خواب بذرهای *Echinophora cinerea* نیز ترکیبی از خواب فیزیولوژیک با مرفوولوژیک است چون جوانهزنی بذرهای تحت تیمار سرمادهی مرطوب در دمای ۴ درجه سلسیوس به مدت ۴۵ روز به میزان ۹۷/۸ درصد افزایش داشت (Esmaeili et al., 2021). نتایج گزارش‌های ذکر شده موافق با نتایج این تحقیق


از طرفی احتمالاً طی این دوره (۹۰ روزه) باعث بلوغ جنین می‌شود که این موضوع در مقالات متعدد در مورد جنس‌های خانواده چتریان ذکر شده و بیانگر این است که خواب بذرهای خوشاریزه ترکیب از خواب فیزیولوژیک با مرفوولوژیک (MPD) است (Baskin & Baskin, 2004; Nikolaeva, 1985; Rosbakh et al., 2020, Zhang et al., 2023) سرمادهی مرطوب تولید جیرلین را تحریک و از شکست آن جلوگیری می‌نماید (Güleyüz et al., 2011, Yamauchi et al., 2004) سرمادهی مرطوب حساسیت دانه‌ها را به جیرلین افزایش می‌دهد (Rouhi et al., 2010; Salehi-Eskandari et al., 2017) جیرلین نیز با افزایش متابولیسم سلولی، درصد جوانهزنی را افزایش می‌دهد (Khan et al., 2023). نتایج مشابهی در مورد جوانهزنی بذرهای *Torilis scabra* (Apiaceae) حاصل شد. قرار گرفتن بذرها در دمای سرمادهی مرطوب (دمای ۴ درجه

است اما نتایج تحقیق سورکی و همکاران (Abbasi Sourki et al., 2019) برخلاف نتایج این پژوهش خواب خوشاریزه (*Echinophora platyloba*) را فقط فیزیولوژیکی عنوان کرده.



شکل ۱- اثر غلظت‌های مختلف جیرلین و سرمادهی مرطوب بر درصد جوانه‌زنی گیاه خوشاریزه (*Echinophora platyloba*). هر عدد میانگین سه تکرار ± خطای استاندارد است و حروف غیر مشابه، بیان گر اختلاف معنی دار بین داده‌ها بر اساس آزمون دانکن ($P < 0.05$) است.

Fig. 1- Effect of GA₃ and moist chilling and their interaction on germination percentage in *Echinophora platyloba* (mean ± SE, n = 3). Different letters indicate statistically significant differences based on Duncan's test ($p < 0.05$).




شکل ۲- اثر غلظت‌های مختلف جیرلین و سرمادهی مرطوب بر سرعت جوانه‌زنی (دانه / روز) گیاه خوشاریزه (*Echinophora platyloba*). هر عدد میانگین سه تکرار ± خطای استاندارد است و حروف غیر مشابه، بیان گر اختلاف معنی دار بین داده‌ها بر اساس آزمون دانکن ($P < 0.05$) است.

Fig. 2- Effect of GA₃ and moist chilling and their interaction on germination rate in *Echinophora platyloba* (mean ± SE, n = 3). Different letters indicate statistically significant differences based on Duncan's test ($p < 0.05$).

(Khan et al., 2023; Sharifi & Pouresmael, 2006) می‌شود. پیش‌تیمار جیبرلین از طریق افزایش درون‌زای اکسین و ترکیبات مشابه جیبرلین در جنبین دانه موجب افزایش درصد جوانه‌زنی می‌شود (Rout et al., 2017) که با نتایج این تحقیق مطابقت داشته و موجب معنی دار شدن ($P < 0.01$) برهمکنش جیبرلین با تیمار سرماده‌ی برصفات جوانه‌زنی شد (جدول ۱). مطابق شکل ۳، بالاترین میانگین زمان جوانه‌زنی (۶/۱ روز) مربوط به بالاترین غلظت جیبرلین (۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر) بود که نسبت به سطوح پایین‌تر جیبرلین، اثر کمتری بر صفات اندازه‌گیری شده جوانه‌زنی داشت. این ممانعت با افزایش دوره سرماده‌ی مربوط تشید شد. ممانعت ذکر شده احتمالاً ناشی از افزایش غلظت اکسین در جنبین است که با افزایش دوره سرماده‌ی و سطح جیبرلین تشید شده و از رشد ریشه و جوانه‌زنی بذرها جلوگیری به عمل می‌آورد (Rout et al., 2017). کاهش میانگین جوانه‌زنی در تیمار ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر جیبرلین با سرماده‌ی ۷۰ روزه (۳/۳ روز) نشان از مهار خواب توسط غلظت مناسبی از جیبرلین به همراه سرماده‌ی مربوط است.

. (Hilhorst and Karssen, 1992, Koyuncu 2005)

همانطور که شکل ۲ مشاهده می‌شود، سرعت جوانه‌زنی در تیمار ۹۰ روز سرماده‌ی مربوط توأم با پایین‌ترین غلظت جیبرلین (۵۰۰ میلی گرم در لیتر)، ۳/۱ برابر سرعت جوانه‌زنی در همان تیمار فاقد جیبرلین است. بالاترین سرعت جوانه‌زنی در این تیمارها (۳/۰۳ دانه در روز) مربوط به تیمار سرماده‌ی ۴۵ روز به همراه تیمار ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر جیبرلین حاصل شد که تیمار مشابه با غلظت ۲۰۰۰ و ۵۰۰ میلی گرم در لیتر جیبرلین نسبت به آن به ترتیب کاهش ۶۹/۸ و ۴۸/۸ درصدی داشتند ($P < 0.05$). پایین‌ترین سرعت جوانه‌زنی مربوط به تیمارهای سرماده‌ی مربوط ۹۰ روزه فاقد جیبرلین، سرماده‌ی مربوط ۷۰ روزه با جیبرلین ۵۰۰ میلی گرم در لیتر، سرماده‌ی مربوط ۳۰ روزه با جیبرلین ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر و استفاده از جیبرلین ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر بدون دریافت سرماده‌ی بود. تیمار سرماده‌ی از طریق برطرف نمودن موانع فیزیولوژیکی جوانه‌زنی از جمله تجزیه اسید آبسیسیک (ABA) و کاهش غلظت آن نسبت به اسید جیبرلیک منجر به افزایش درصد و سرعت جوانه‌زنی در بذرها می‌گردد (Eisvand et al., 2005). تیمار سرماده‌ی به کمک آنزیم‌های تنفسی منجر به حفظ ساختار غشاء سلولی



شکل ۳- اثر غلظت‌های مختلف جیبرلین و سرماده‌ی مربوط بر میانگین زمان جوانه‌زنی (روز) گیاه خوشاریزه (*Echinophora platyloba*). هر عدد میانگین سه تکرار ± خطای استاندارد است و حروف غیرمشابه، بیان گر اختلاف معنی دار بین داده‌ها بر اساس آزمون دانکن ($P < 0.05$) است.

Fig. 3- Effect of GA₃ and moist chilling and their interaction on mean germination time in *Echinophora platyloba* (mean ± SE, n = 3). Different letters indicate statistically significant differences based on Duncan's test ($p < 0.05$).

میوه رها شوند، جوانه‌زنی و رویش خواهند کرد.

تشکر و قدردانی

از معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان، جهت حمایت مالی از این پژوهش تقدیر و تشکر می‌شود.

تعارض منافع

نویسنده‌گان این مقاله اعلام می‌دارند که هیچ گونه تعارض منافعی در رابطه با نگارش و یا انتشار این مقاله ندارند.

References

- Abbasi Sourki, A., Hosseni, Z., & Fallah, S. (2019).** Effect of stratification and its combination with gibberellic acid on seed dormancy breaking of *Echinophora platyloba* [Research]. *Iranian Journal of Seed Research*, 5(2), 91–104. [In Persian] <https://doi.org/10.29252/yujs.5.2.91>
- Archana, H., Akash, A., Kushwah, A., & Sanjay, M. (2023).** Recent advances in seed science and technology. Stella International Publication.
- Avijgan, M., & Mahboubi, M. (2015).** *Echinophora platyloba* DC. as a new natural antifungal agent. *Asian Pacific Journal of Tropical Disease*, 5(3), 169–174. [https://doi.org/10.1016/S2222-1808\(14\)60647-2](https://doi.org/10.1016/S2222-1808(14)60647-2)
- Barreto, L. C., Santos, F. M., & Garcia, Q. S. (2016).** Seed dormancy in *Stachytarpheta* species (Verbenaceae) from high-altitude sites in southeastern Brazil. *Flora-Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants*, 225, 37–44. <https://doi.org/10.1016/j.flora.2016.09.009>
- Baskin, C. C., & Baskin, J. M. (2005).** Seed dormancy in trees of climax tropical vegetation types. *Tropical Ecology*, 46(1), 17–28. <https://www.jstor.org/stable/4034156>
- Baskin, C. C., Baskin, J. M., & Chester, E. W. (2003).** Ecological life cycle of *Trepocarpus aethusae* (Nutt.) ex DC. and comparisons with two other winter annual *Apiaceae* native to Eastern United States. *Castanea*, 43–55. <https://www.jstor.org/stable/4034156>
- Baskin, C. C., Chester, E. W., & Baskin, J. M. (1992).** Deep complex morphophysiological dormancy in seeds of *Thaspium pinnatifidum* (Apiaceae). *International Journal of Plant Sciences*, 153(4), 565–571. <https://doi.org/10.1086/297080>

همانطور که در آزمایش‌های اولیه در مواد و روش‌ها ذکر شد خراش‌دهی به‌همراه تیمارهای مختلف سرماده‌ی مرطوب و جیبرلین تاثیری بر جوانه‌زنی بذرهای خوشاریزه نداشت. احتمالاً خراش‌دهی بذر از طریق ورود میکرووارگانیسم‌ها باعث فساد بذر Salehi-Eskandari & Kaviani, 2021 شده که عامل بازدارنده جوانه‌زنی است (Kaviani, 2021) البته ممکن است در حین خراش‌دهی مریستم‌های انتهایی جنین دچار آسیب شده که مانع از رشد نمو جنین و جوانه‌زنی آنها می‌شود.

همانطور که در آزمایش‌های اولیه ذکر شده و در مواد و روش‌ها نیز مشخص گردید پوشش میوه شیزوکارپ مانع از جوانه‌زنی بذرهای موجود در هر مریکارپ^۱ شد. پوشش میوه یا بافت‌های احاطه کننده جنین بواسطه، اختلال در جذب آب و تبادلات هوایی (اکسیژن و دی‌اکسید کربن)، مهار مکانیکی برای خروج ریشه، عرضه بازدارنده به جنین، جلوگیری از نشت بازدارنده‌ها از جنین و فیلتراسیون نور باعث خواب دانه می‌شود (Bradford & Nonogaki, 2007). بسیاری از مطالعات ترکیبات فلی، به ویژه فلاونوئیدها را عامل عدم جوانه‌زنی بذرها ذکر کرده‌اند (Kelly et al., 1992). عدم جوانه‌زنی دانه‌ها در پوشش میوه تضمین کننده بقاء گونه در شرایط نامساعد و افزایش دهنده پراکنش بذرهاست (Salehi-Eskandari et al., 2017)

نتیجه‌گیری

با توجه به این که جوانه‌زنی بذرهای خوشاریزه فقط در تیمار سرماده‌ی مرطوب ۹۰ روزه رخ داد و بالاترین درصد جوانه در این تیمارها متعلق به تیمار سرماده‌ی مرطوب ۴۵ روزه، توأم با جیبرلین ۱۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر (۵۰ درصد) بود. بنابراین، خواب بذرهای خوشاریزه ترکیبی از فیزیولوژیکی و مرغولوژیکی است. نظر به این که تیمارهای مختلف خراش‌دهی اثری بر جوانه‌زنی بذرها نداشت، آنها قادر خواب فیزیکی می‌باشند. پوشش میوه شیزوکارپ مانع از جوانه‌زنی بذرها در تیمارهای مختلف شد. در نتیجه پوشش میوه در بردارنده بذرها تضمین کننده بقاء آنها در شرایط نامساعد و افزایش دهنده پراکنش بذرهاست و هنگامی که آن‌ها توسط عوامل محیطی چون باد و نزولات آسمانی از پوشش

¹ Mericarps

- Baskin, J. M., & Baskin, C. C. (2004).** A classification system for seed dormancy. *Seed Science Research*, 14(1), 1–16. <https://doi.org/10.1079/SSR2003150>
- Baskin, J. M., & Baskin, C. C. (1990).** Seed germination ecology of poison hemlock, *Conium maculatum*. *Canadian Journal of Botany*, 68(9), 2018–2024. <https://doi.org/10.1139/b90-264>
- Bradford, K. J. Y., & Nonogaki, H. (2007).** *Seed development, dormancy and germination*. Blackwell Publishing.
- Cerabolini, B., De Andreis, R., Ceriani, R. M., Pierce, S., & Raimondi, B. (2004).** Seed germination and conservation of endangered species from the Italian Alps: *Physoplexis comosa* and *Primula glaucescens*. *Biological Conservation*, 117(3), 351–356. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2003.12.011>
- Chauhan, R., Singh, S., Pandey, S. S., Kumar, A., Kumari, M., Kumar, A., Thakur, A., & Singh, S. (2023).** Alleviation of seed dormancy in kala zeera (*Bunium persicum*) through chilling and phytohormones. *Seed Science and Technology*, 51(2), 181–187. <https://doi.org/10.15258/sst.2023.51.2.03>
- Delaram, M., & Haeri, A. (2011).** The effect of *Echinophora platyloba* on the premenstrual syndrome [Original]. *Pejouhesh dar Pezeshki (Research in Medicine)*, 34(4), 219–224. [In Persian] <http://pejouhesh.sbu.ac.ir/article-1-806-en.html>
- Eisvand, H. R., Maddah Arefi, H., & Tvakol-Afshari, R. (2005).** Study of dormancy breakage and germination in seeds of *Astragalus siliquosus*. *Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research*, 13(1), 67–84. [In Persian] <https://doi.org/10.22092/ijfpbgr.2005.115217>
- Ellis, R., & Roberts, E. (1981).** The quantification of ageing and survival in orthodox seeds. *Seed Science and Technology*, 9(2).
- Emami, S., & Aghazari, F. (2010).** Iranian endemic phanerogams. *Iranian Journal of Pharmaceutical Research (Supplement 2)*, 62–63.
- Esmaeili, G., Ghani, A., Jabbarifar, S. M., & Hemmati, N. (2021).** Germination enhancement and primary establishment of three medicinal plants. *Journal of Rangeland Science*, 11(2), 182–195.
- Gülgürüz, G., Kırmızı, S., Arslan, H., & Sakar, F. S. (2011).** Dormancy and germination in *Stachys germanica* L. subsp. *bithynica* (Boiss.) Bhattacharjee seeds: Effects of short-time moist chilling and plant growth regulators. *Flora-Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants*, 206(11), 943–948. <https://doi.org/10.1016/j.flora.2011.07.003>
- Hilhorst, H., & Karssen, C. (1992).** Seed dormancy and germination: The role of abscisic acid and gibberellins and the importance of hormone mutants. *Plant Growth Regulation*, 11, 225–238. <https://doi.org/10.1007/BF00024561>
- Kelly, K., Van Staden, J., & Bell, W. (1992).** Seed coat structure and dormancy. *Plant Growth Regulation*, 11, 201–209. <https://doi.org/10.1007/BF00024559>
- Khan, M. H., Dar, N. A., Alie, B. A., Mir, G. H., Fayaz, U., Khan, A., & Chung, Y. S. (2023).** Plant growth hormones and micro-tuberization in breaking the seed dormancy of *Bunium persicum* (Boiss.) Fedts. *Plants*, 12(17), 3163. <https://doi.org/10.3390/plants12173163>
- Koyuncu, F. (2005).** Breaking seed dormancy in black mulberry (*Morus nigra* L.) by cold stratification and exogenous application of gibberellic acid. *Acta Biologica Cracoviensis Series Botanica*, 47(2), 23–26.
- Majid, A., Mohaddesse, M., Mahdi, D., Mahdi, S., Sanaz, S., & Kassaiyan, N. (2010).** Overview on *Echinophora platyloba*, a synergistic anti-fungal agent candidate. *Journal of Yeast and Fungal Research*, 1(5), 88–94. <https://doi.org/10.5897/JYFR.9000040>
- Mozafarian, V. (1998).** *The culture of the names of Iranian plants* (2nd ed.). Farhang Moasser. [In Persian]
- Maguire, J. D. (1962).** Speed of germination: Aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor. *Crop Science*, 2(1), 25–30. <https://doi.org/10.2135/cropsci1962.0011183X000200020033x>
- Nikolaeva, M. G. (1985).** *Reference book on dormant seed germination*. Izd-vo "Nauka," Leningradskoe otdelenie.
- Pilevar, Z., Hosseini, H., Hajimehdipoor, H., Shahraz, F., Alizadeh, L., Khaneghah, A. M., & Mahmoudzadeh, M. (2017).** The anti-*Staphylococcus aureus* effect of combined *Echinophora platyloba* essential oil and liquid smoke in beef. *Food Technology and Biotechnology*, 55(1), 117. <https://doi.org/10.17113/ftb.55.01.17.4633>
- Rawnsley, R., Lane, P., Brown, P., & Groom, T. (2006).** Occurrence and severity of the weeds *Anthriscus caucalis* and *Torilis nodosa* in pyrethrum. *Australian Journal of Experimental Agriculture*, 46(5), 711–716. <https://doi.org/10.1071/EA04240>
- Rosbakh, S., Phartyal, S. S., & Poschlod, P. (2020).** Seed germination traits shape community assembly along a hydroperiod gradient. *Annals of Botany*, 125(1), 67–78. <https://doi.org/10.1093/aob/mcz139>
- Rouhi, H., Shakarami, K., & Afshari, R. T. (2010).** Seed treatments to overcome dormancy of waterlily tulip (*Tulipa kaufmanniana* Regel). *Australian Journal of Crop Science*, 4(9), 718–721.

- Rout, S., Beura, S., Khare, N., Patra, S. S., & Nayak, S. (2017).** Effect of seed pre-treatment with different concentrations of gibberellic acid (GA3) on seed germination and seedling growth of *Cassia fistula* L. *Journal of Medicinal Plants Studies*, 5(6), 135–138.
- Sadraei, H., Asghari, G., & Yaghobei, K. (2003).** Study of the effect of hydro-alcoholic and essential oil of *Echinophora platyloba* on rat isolated ileum contractions in vitro.
- Salehi-Eskandari, B., Hesami, R., Salimi, A., & Schat, H. (2024).** Adaptation to lead in a Pb/Zn-mine population of *Marrubium cuneatum*. *Flora*, 152460. <https://doi.org/10.1016/j.flora.2024.152460>
- Salehi-Eskandari, B., Ghaderian, S. M., Ghasemi, R., & Schat, H. (2017).** Optimization of seed germination in an Iranian serpentine endemic, *Fortuynia garcini*. *Flora*, 231, 38–42. <https://doi.org/10.1016/j.flora.2017.04.005>
- Salehi-Eskandari, B., & Kaviani, M. (2021).** The evaluation of methods on dormancy breaking and some characters of germination in four species of *Astragalus* sp. *Iranian Journal of Seed Science and Technology*, 9(4), 99–110. [In Persian] <https://doi.org/10.22092/ijsst.2020.127475.1287>
- Sharafati-Chaleshtori, R., Rafieian-Kopaei, M., Mortezaei, S., Sharafati-Chaleshtori, A., & Amini, E. (2012).** Antioxidant and antibacterial activity of the extracts of *Echinophora platyloba* DC. *African Journal of Pharmacy and Pharmacology*, 6(37), 2692–2695. <https://doi.org/10.5897/AJPP12.931>
- Sharifi, M., & Pouresmael, M. (2006).** Breaking seed dormancy in *Bunium persicum* by stratification and chemical substances. *Asian Journal of Plant Sciences*. <http://www.ansinet.org/ajps>
- Sofi, P. A., Zeerak, N. A., & Singh, P. (2009).** Kala zeera (*Bunium persicum* Bioss.): A Kashmirian high-value crop. *Turkish Journal of Biology*, 33(3), 249–258. <https://doi.org/10.3906/biy-0803-18>
- Tabatabaeian Javad, & Kadkhodaee Azam. (2019).** The effect of dormancy breaking treatments on seed germination of *Kelussia odoratissima* Mozaff (Kohrang). *Iranian Journal of Seed Science and Technology*, 8(1), 201–212. [In Persian] <https://doi.org/10.22034/ijsst.2018.116895.1156>
- Yamauchi, Y., Ogawa, M., Kuwahara, A., Hanada, A., Kamiya, Y., & Yamaguchi, S. (2004).** Activation of gibberellin biosynthesis and response pathways by low temperature during imbibition of *Arabidopsis thaliana* seeds. *The Plant Cell*, 16(2), 367–378. <https://doi.org/10.1105/tpc.018143>
- Zhang, L., Xu, C., Liu, H., Tao, J., & Zhang, K. (2023).** Seed dormancy and germination requirements of *Torilis scabra* (Apiaceae). *Agronomy*, 13(5), 1250. <https://doi.org/10.3390/agronomy13051250>